


Appunti di Meccanica Quantistica 2

Università degli Studi di Torino

Anno Accademico 2025-2026

Prof.ssa Maria Luisa Frau, appunti di Paolo Rocchietti March¹



¹paolo.rocchiettimarc@edu.unito.it

Indice

Postulati della Meccanica Quantistica	4
1 Introduzione e costruzione della meccanica classica	4
2 Postulato 0 della Meccanica Quantistica	4
2.1 Spazi di Hilbert	4
2.2 Distribuzioni temperate e spazi di Hilbert	6
3 Postulato 0.1 della Meccanica Quantistica	7
3.1 Osservabili	7
3.2 Autovettori e autovalori	8
3.3 Sistemi Completi di Osservabili Commutanti	10
3.4 Esempio noto: la buca di potenziale finita 1D	10
3.5 Risultati generali sui potenziali	13
3.6 Lo stato fondamentale	15
4 Prodotto diretto tra Spazi di Hilbert	18
4.1 Costruzione dello spazio prodotto	18
4.2 Base dello spazio prodotto	18
4.3 Operatori sullo spazio prodotto	19
4.4 Esempio: lo spin di una particella in 3 dimensioni	20
5 Postulato 1 della Meccanica Quantistica	20
5.1 Valor medio di un'osservabile	21
5.2 Stati misti e matrice densità	21
6 Postulato 2 della Meccanica Quantistica	24
6.1 Il collasso della funzione d'onda	24
7 Postulato 3 della Meccanica Quantistica	26
7.1 Schema di Schrödinger	27
7.2 Schema di Heisenberg	27
7.3 Costanti del moto	28

Formalismo dei <i>Path Integral</i>	29
8 Introduzione e prime definizioni	29
8.1 Il propagatore	29
8.2 Primo legame con l'azione	31
8.3 Il propagatore della particella libera 1D	31
9 Il propagatore di un'Hamiltoniana con potenziale	33
9.1 Equivalenza con l'equazione di Schrödinger	35
10 Limite semiclassico	36
10.1 Metodo discreto	36
10.2 Metodo del <i>Path Integral</i>	38
10.3 Esempio: l'effetto Bohm-Aharonov	39
11 Calcolo di propagatori	40
11.1 Particella libera	40
11.2 L'oscillatore armonico	41
11.3 Determinanti funzionali	43
12 Rotazione di Wick e meccanica statistica	45
12.1 Esempio: potenziale armonico	46
Approssimazione WKB	47
13 Regime WKB	47
13.1 Soluzione perturbativa al primo ordine	48
14 Potenziali con un punto di inversione	49
14.1 Potenziali crescenti	49
14.2 Potenziali decrescenti	53
15 Potenziali con due punti di inversione	54

Postulati della Meccanica Quantistica

1 Introduzione e costruzione della meccanica classica

In questa prima parte del corso si formalizzano alcuni concetti già visti nel corso di Meccanica Quantistica I, partendo dai postulati fondamentali su cui si basa la teoria.

Per costruire la teoria della meccanica quantistica è necessario basarsi sulle risposte alle seguenti domande:

1. **Come si può descrivere lo stato di un sistema fisico a un tempo $t = t_0$ fissato?**
2. **Fissato lo stato, come si può predire il risultato della misura di una sua osservabile fisica?**
3. **Noto lo stato a $t = t_0$, come si può determinare lo stato del sistema a $t > t_0$?**

Per capire perché queste tre domande bastano a definire la teoria, si considerano prima le risposte della meccanica classica (nel formalismo hamiltoniano):

1. Per un sistema a n gradi di libertà (dof), lo stato del sistema a $t = t_0$ è definito da $2n$ coordinate nello spazio delle fasi $\{p_0^\alpha, q_0^\alpha\}$;
2. Ogni osservabile fisica Q è funzione reale delle coordinate canoniche $Q = F(q^\alpha, p^\alpha)$, il valore della funzione nel punto dello spazio delle fasi è il valore della osservabile;
3. L'evoluzione temporale è governata dalle equazioni di Hamilton, che hanno come soluzioni curve nello spazio delle fasi dipendenti dallo stato in $t = t_0$: $q^\alpha(t, q_0^\alpha, p_0^\alpha)$, $p^\alpha(t, q_0^\alpha, p_0^\alpha)$

Sostituendo lo spazio delle fasi con quello delle velocità, si definisce analogamente la teoria nel formalismo lagrangiano.

2 Postulato 0 della Meccanica Quantistica

Lo stato di un sistema fisico a $t = t_0$ è rappresentato da un raggio nello spazio di Hilbert separabile associato al sistema.

2.1 Spazi di Hilbert

Si descrive ora più precisamente cosa si intende per spazi di Hilbert, definendo anche più rigorosamente gli stati normalizzabili "alla Dirac".

Si consideri uno spazio vettoriale E definito sul campo complesso $\mathbb{C}$: esso si dice unitario se è dotato di un prodotto scalare $(\cdot, \cdot)$; ogni spazio unitario è anche metrico rispetto alla distanza $d(a, b) = \sqrt{(a - b, a - b)}$ e questa distanza induce una topologia simile a quella di $\mathbb{R}^n$.

Con questa topologia si può definire l'usuale nozione di limite di successioni e si può dimostrare il seguente teorema

Teorema, continuità del prodotto scalare:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \rightarrow \forall b \in E, \lim_{n \rightarrow \infty} (b, a_n) = (b, l)$$

Dimostrazione: Preso $b \in E$, si consideri $(b, a_n) - (b, l) = (b, a_n - l)$: per la disuguaglianza di Schwartz, $|(b, a_n - l)|^2 \leq (b, b)(a_n - l, a_n - l)$, ma $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - l, a_n - l) = 0$, dunque $\lim_{n \rightarrow \infty} (b, a_n - l) = 0$, **QED**.

Un altro concetto molto utile per la formulazione della Meccanica quantistica è quello di spazio duale:

Def. Dato E spazio vettoriale, il suo *duale* è $E^* := \{ \hat{b} : E \rightarrow \mathbb{C} / \hat{b} \text{ è lineare e continuo} \}$

Poiché E è uno spazio unitario, gli elementi di E^* si possono identificare con $\hat{b} = (b, \cdot)$, dove $\hat{b}(a) = (b, a) \forall a \in E$.

Da qui in poi si userà la **notazione di Dirac**, indicando gli elementi di E^* con $\hat{b} := \langle b |$ ("bra"), quelli di E con $a = |a\rangle$ ("ket") e i prodotti scalari con $(a, b) := \langle a | b \rangle$ ("bra-(c)-ket").

Quanto descritto finora vale per spazi vettoriali di dimensione sia finita, sia infinita, ma per procedere a trattarli ugualmente bisogna definire una classe *well-behaved* di spazi a dimensione infinita.

Def. Uno spazio vettoriale si dice *separabile* se ammette sottoinsiemi $\{|e_i\rangle\}$ completi ed enumerabili², che può essere scelta ortonormale. Questo garantisce che

$$\forall |v\rangle \in E, \exists c_i \in \mathbb{C} \text{ t.c. } \sum_i |c_i|^2 = \langle v | v \rangle \leftrightarrow \sum_i c_i |e_i\rangle = |v\rangle \leftrightarrow \sum_i |e_i\rangle \langle e_i| = \mathbb{I}$$

che sono relazioni banalmente verificate per spazi a dimensione finita.

Def. Una successione $|a\rangle_n$ si dice di Cauchy se

$$\forall \epsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } \forall n, m > n_0, d(|a\rangle_n - |a\rangle_m) < \epsilon$$

Oss. Ogni successione convergente è una successione di Cauchy, ma il viceversa non è sempre garantito.

Def. Uno spazio metrico si dice *completo* se ogni successione di Cauchy è una successione convergente.

Si può finalmente dare la definizione di spazio di Hilbert

Def. Uno spazio unitario e completo si dice **spazio di Hilbert**.

L'esempio principale di spazio di Hilbert è $L^2(a, b)$, cioè l'insieme delle funzioni quadrato-sommabili sull'intervallo $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$, dotato del prodotto scalare $\langle f | g \rangle := \int_a^b dx f^*(x) g(x)$.

Già durante il corso di meccanica quantistica I si sono incontrate però delle soluzioni dell'equazione di Schrödinger *non* appartenenti a $\mathcal{H}$ utilizzate però come "base generalizzata" dello spazio: si cerca ora di formalizzare questo processo.

²Non è la più generale definizione di separabilità, ma in questo contesto basta.

2.2 Distribuzioni temperate e spazi di Hilbert

Def. Lo spazio delle funzioni di prova è

$$S := \left\{ f(x)/f \in C^\infty \wedge \lim_{|x| \rightarrow \infty} x^p \frac{d^n f}{dx^n} = 0, \forall p, n \in \mathbb{N} \right\}$$

Si dice che $f(x)$ è rapidamente decrescente, cioè che essa e tutte le sue derivate decrescano a infinito più rapidamente di ogni potenza.

Oss. Si può dimostrare che S è denso in $L^2(\mathbb{R})$, cioè che $\forall$ intorno di $|f\rangle \in L^2(\mathbb{R})$, esiste almeno una $|g\rangle \in S$.

Def. Lo spazio delle distribuzioni temperate è

$$S' := \{T : S \rightarrow \mathbb{C}/T \text{ è lineare e continua}\}$$

Il numero $\langle T|g\rangle \in \mathbb{C}$ denota l'azione di $\langle T| \in S'$ su $|g\rangle \in S$.

L'azione di T si comporta come un prodotto scalare, infatti

- È lineare per definizione: $\langle T|f + g\rangle = \langle T|f\rangle + \langle T|g\rangle$;
- È continua per definizione: $\left\langle T \left| \lim_{n \rightarrow \infty} g_n \right. \right\rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle T|g_n\rangle$, con il limite di funzioni di S a primo membro.

L'insieme S' contiene anche funzioni nel senso usuale: ogni funzione $T(x)$ localmente integrabile e a crescita algebrica finita (cioè che a infinito al più diverge come un polinomio) definisce una distribuzione $\langle T|$ (detta *regolare*) definita da $\langle T|g\rangle := \int_{-\infty}^{\infty} dx T^*(x)g(x)$ ³.

L'esempio del contrario è la famosa δ di Dirac: è infatti una distribuzione definita da $\langle \delta|f\rangle := f(0)$, $\forall f \in S$; l'espressione $\int_{-\infty}^{\infty} dx \delta(x)f(x) = f(0)$ è un abuso di notazione, perché non esiste alcuna funzione $\delta(x)$.

Come si è visto nel corso di Metodi I, si può però aggirare il problema delle distribuzioni non regolari notando che vale il seguente teorema:

Teorema: $\forall T \in S', \exists \{T_n\}$, successione di distribuzioni regolari, tale che $\lim_{n \rightarrow \infty}^{deb.} T_n = T$

Ricordando la definizione di limite debole:

Def. Data $T \in S'$ e $\{T_n\}$ successione di distribuzioni regolari, si dice che

$$\lim_{n \rightarrow \infty}^{deb.} T_n = T \leftrightarrow \forall g \in S, \lim_{n \rightarrow \infty} \langle T_n|g\rangle = \langle T|g\rangle$$

In questo modo, si possono utilizzare successioni di distribuzioni regolari per trattare di distribuzioni più generali (si veda la trattazione della δ di Dirac nel corso di Metodi I).

In conclusione, per trattare gli stati non normalizzabili è necessario introdurre sia S , sia S' , dando la seguente definizione

Def. La terna (di Gel'Fand) $S \subset \mathcal{H} \subset S'$, con S denso in $\mathcal{H}$ e S' spazio delle distribuzioni temperate su S , si dice **spazio di Hilbert equipaggiato**.

³Questo processo ricorda l'identificazione degli elementi dello spazio duale

3 Postulato 0.1 della Meccanica Quantistica

Ogni quantità misurabile del sistema fisico è associata a un'osservabile, cioè un operatore autoaggiunto con dominio denso in $\mathcal{H}$. Gli autovettori (propri o generalizzati) dell'osservabile formano una base ortonormale per $\mathcal{H}$

Per comprendere questa definizione e formalizzarla è necessario definire alcuni concetti sugli operatori e sui loro autovettori.

3.1 Osservabili

Un operatore quantistico è una funzione $A : \mathcal{D}_A \subset \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ continua, dove $\mathcal{D}_A$ è il dominio dell'operatore A .

Def. L'operatore aggiunto di A è l'unico operatore $A^\dagger$ tale che $\forall |v\rangle \in \mathcal{D}_A, \forall |u\rangle \in \mathcal{D}_{A^\dagger}$ vale

$$\langle u | (A |v\rangle) = [\langle v | (A^\dagger |u\rangle)]^*$$

Def. Un operatore A si dice autoaggiunto se $A = A^\dagger$ e $\mathcal{D}_A = \mathcal{D}_{A^\dagger}$

Oss. È una definizione più stringente della hermiticità, come è chiaro dal seguente esempio:

Esempio Si consideri $A = -i \frac{d}{dx}$ nello spazio $\mathcal{H} = L^2(a, b)$: questo operatore è sempre hermitiano, ma non è sempre autoaggiunto, infatti

$$\langle f | A |g\rangle = \int_a^b dx f^*(x) \left(-i \frac{d}{dx} \right) g(x) = -i g(x) f(x) \Big|_a^b + \int_a^b dx \left(i \frac{d}{dx} \right) f^*(x) g(x)$$

è pari a $[\langle g | A^\dagger |f\rangle]^*$ solo se sia $f(x)$ sia $g(x)$ sono periodiche su (a, b) .

L'operatore è dunque autoaggiunto⁴ in $\mathcal{D}_A = \{f : (a, b) \rightarrow \mathbb{C} \text{ periodiche}\}$, per (a, b) finito.

Il concetto di osservabile si può estendere anche alle distribuzioni temperate⁵:

Def. Dato A con $\mathcal{D}_A \subset S$, si definisce l'azione di A su $\langle T | \in S'$ come $A : S' \rightarrow S'$ tale che

$$(\langle T | A) |g\rangle := \langle T | (A |g\rangle), \forall |g\rangle \in S \text{ t.c. } A |g\rangle \in S$$

Oss. Se si considera il caso in cui T è una funzione, la definizione è coerente con quella di prodotto scalare tra *bra* e *ket*.

Oss. Da questa definizione si può anche definire l'espressione $\langle g | A |T\rangle$ nel modo seguente:
 $[\langle T | A^\dagger |g\rangle]^* := \langle g | A |T\rangle$

⁴Questo esempio non è precisissimo, per una trattazione perfetta si vedano le dispense del prof. Sciuto, pp. 156-157.

⁵Anche se esse non rappresentano propriamente stati fisici, come si vedrà in seguito

3.2 Autovettori e autovalori

Dato un operatore autoaggiunto A , si consideri ora l'equazione agli autovalori

$$A|a\rangle = a|a\rangle$$

Prima di dare la definizione di valori regolari e autovalori di A , si consideri la seguente quantità, sempre definita:

$$C := \inf_{|\psi\rangle \in \mathcal{D}_A} \frac{\|(A - a\mathbb{I})|\psi\rangle\|}{\| |\psi\rangle \|} \geq 0$$

Def. $a \in \mathbb{R}$ si dice punto regolare di A se $C > 0$.

Def. $a \in \mathbb{R}$ si dice autovalore di A se $C = 0$

Poiché C è un estremo inferiore si distinguono due casi:

- C è anche il minimo: in questo caso a è un **autovalore proprio** di A ed $\exists |a\rangle \in \mathcal{D}_A$ tale che $A|a\rangle = a|a\rangle$, detto **autovettore proprio**.
- C non è il minimo: in questo caso a è un **autovalore generalizzato** di A e l'autovettore corrispondente $|a\rangle \notin \mathcal{D}_A$ è detto **autovettore generalizzato**.

L'insieme degli autovalori propri è detto **spettro discreto di A** $Spd(A)$.

L'insieme degli autovalori generalizzati è detto **spettro continuo di A** $Spc(A)$.

L'importanza degli spettri di un operatore è evidenziata dal seguente risultato, detto appunto *teorema spettrale*.

Teorema spettrale

Dato un operatore A autoaggiunto, le soluzioni dell'equazione $A|a\rangle = a|a\rangle$ sono un insieme **completo**.

$\forall f \in S$ si definiscono

- I coefficienti $f_i := \langle a_i | f \rangle$, con $|a_i\rangle$ autovettori propri corrispondenti agli autovalori $a_i \in Spd(A)$;
- La funzione $f(a) := \langle a | f \rangle$, con $|a\rangle$ autovettori generalizzati corrispondenti agli autovalori $a \in Spc(A)$.

Si può scrivere $\forall f, g \in S$

$$\langle f | g \rangle = \sum_i f_i^* g_i + \int_{Spd(A)} da f^*(a) g(a) := \oint_{Sp(A)} da f^*(a) g(a) , \text{ prodotto scalare}$$

$$|f\rangle = \oint_{Sp(A)} da f(a) |a\rangle , \text{ rappresentazione di } |f\rangle$$

$$\oint_{Sp(A)} |a\rangle \langle a| = \mathbb{I} , \text{ relazione di completezza dello spettro}$$

Il problema di questi risultati è che valgono solo per i vettori $|f\rangle \in S$, ma possono essere generalizzati ricordando che S è denso in $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R})$: questo implica che

$$\forall |\psi\rangle \in \mathcal{H}, \exists \{|\psi_n\rangle\} \subset S \text{ t.c. } \lim_{n \rightarrow \infty} |\psi_n\rangle = |\psi\rangle$$

Un'altra nozione utile è quella di *limite in media quadratica*

Def. Limite in media quadratica di una successione di funzioni di prova definita su $I \subset \mathbb{R}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty}^{m.q.} \psi_n(x) = \psi(x) \leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_I dx |\psi_n(x) - \psi(x)|^2 = 0$$

Oss. L'integrale è alla Lebesgue ed è quindi definito a meno di funzioni quasi ovunque nulle: questo non dà però ambiguità, in quanto i prodotti scalari non variano al variare del rappresentante della classe di equivalenza ed essi sono l'unica parte della teoria che fa predizioni fisiche.

Date queste definizioni, si considerano ora le relazioni del teorema spettrale con $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$: per lo spettro discreto non ci sono problemi, in quanto $\langle a_i | \psi \rangle$ è sempre un prodotto scalare in $\mathcal{H}$. Per lo spettro continuo invece $\psi(a) = \langle a | \psi \rangle$ non è ben definita, perché è l'azione della distribuzione $\langle a |$ su un vettore di $\mathcal{H}$: si definisce dunque $\psi(a) := \lim_{n \rightarrow \infty}^{m.q.} \langle a | \psi_n \rangle$, con $\{|\psi_n\rangle\} \subset S$ successione che converge a $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$.

Con queste accortezze, si può utilizzare l'intero spettro di un operatore A come base per lo spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ di un sistema fisico.

Esempio 1 L'operatore posizione in 1D X .

La sua equazione agli autovalori è $X|x_0\rangle = x_0|x_0\rangle$: proiettandola nella sua rappresentazione nello spazio delle coordinate si ottiene

$$\langle x | X | x_0 \rangle = x_0 \langle x | x_0 \rangle \rightarrow x \langle x | x_0 \rangle = x_0 \langle x | x_0 \rangle$$

x_0 è un parametro, quindi $\langle x | x_0 \rangle := f(x)$; nessuna funzione di L^2 soddisfa $xf(x) = x_0f(x)$, ma la $\delta(x - x_0)$ di Dirac, come limite in media quadratica, sì.

Dunque gli autovettori di X sono generalizzati e la loro rappresentazione nello spazio delle coordinate è $\langle x_0 | x \rangle = \delta(x - x_0)$, inoltre lo spettro è il continuo $x_0 \in \mathbb{R}$.

Vale la relazione di completezza $1 = \int_{-\infty}^{\infty} dx |x\rangle \langle x|$ e dunque i prodotti scalari possono essere rappresentati come $\langle f | g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \langle f | x \rangle \langle x | g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx f^*(x)g(x)$

Esempio 2 L'operatore numero d'onda in 1D K

L'operatore K è quell'operatore che ha come rappresentazione nello spazio delle coordinate $\langle x | K | x' \rangle = \delta(x' - x) (-i \frac{d}{dx})$; la sua equazione agli autovalori è

$$K|k\rangle = k|k\rangle \rightarrow \langle x | K | k \rangle = k \langle x | k \rangle \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} dx' \langle x | K | x' \rangle \langle x' | k \rangle = k \langle x | k \rangle$$

che per la definizione di K e identificando $\langle x | k \rangle := f_k(x)$ diventa

$$-i \frac{df_k}{dx} = k f_k(x) \leftrightarrow f_k(x) = N e^{ikx}$$

$f_k(x)$ è un autovettore generalizzato e lo spettro è continuo ($k \in \mathbb{R}$): $f_k(x)$ può essere normalizzato a $f_k(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx}$, in modo che $\langle k | k' \rangle = \delta(k - k')$.

Per il teorema spettrale, $|f\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dk \langle k | f \rangle |k\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dk f(k) |k\rangle$ e si può ricavare, ricordando la relazione di completezza, che

$$f(x) = \langle x|f \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dk \langle x|k \rangle \langle k|f \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dk e^{-ikx} f(k)$$

3.3 Sistemi Completi di Osservabili Commutanti

Uno dei concetti più importanti per risolvere problemi di meccanica quantistica è quello di Sistema Completo di Osservabili Commutanti (SCOC), cioè un insieme di operatori $\{A_1, \dots, A_n\}$ tutti commutanti tra di loro e tali che $\forall B$ t.c. $[B, A_i] = 0$, $B = f(A_1, A_2, \dots, A_n)$: il massimo numero di operatori commutanti n è il numero di gradi di libertà del sistema quantistico.

Detti A_i gli operatori del SCOC di un sistema quantistico, $\exists \{|\alpha\rangle\}$ set di autostati comuni a tutti gli A_i : ciascun vettore $|\alpha\rangle$ può essere univocamente identificato dai suoi n autovalori α_i , con $A_i |\alpha\rangle = \alpha_i |\alpha\rangle$, come conseguenza del seguente teorema.

Teorema, gli autospazi simultanei del SCOC hanno dimensione 1.

Dimostrazione Si assuma, per assurdo, che $|v_1\rangle, |v_2\rangle$ (base dell'autospazio degenerare) abbiano gli stessi autovalori α_i per gli operatori A_i e si definisca l'operatore B indipendente dal SCOC t.c. $B|v_1\rangle = |v_2\rangle$ e $B|v_2\rangle = |v_1\rangle$: allora $A_i B|v_1\rangle = A_i |v_2\rangle = \alpha_i |v_2\rangle$ e $BA_i |v_1\rangle = \alpha_i |v_2\rangle$ e similmente con $|v_2\rangle$; questo significa che nell'autospazio degenerare $[B, A_i] = 0$, dunque che $B = F(A_1, \dots, A_n)$ e che $B|v_1\rangle = f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) |v_1\rangle = |v_2\rangle$, che è assurdo, in quanto $|v_1\rangle, |v_2\rangle$ sono linearmente indipendenti.

Dunque $\nexists |v_1\rangle, |v_2\rangle$ linearmente indipendenti con stessi α_i , cioè non c'è degenerazione. **QED**

Da qui in avanti si denoterà $|\alpha\rangle = |\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\rangle$.

Oss. Poiché il sistema è completo, $\oint d\alpha_1 \dots d\alpha_n |\alpha_1, \dots, \alpha_n\rangle \langle \alpha_1, \dots, \alpha_n| = \mathbb{I}$

3.4 Esempio noto: la buca di potenziale finita 1D

Come riepilogo delle nozioni formali appena fornite, si considera ora il noto esempio della buca rettangolare finita, definita dal potenziale

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } |x| > a \\ V_0 & \text{se } |x| < a \end{cases}$$

con $a > 0$ e $V_0 < 0$. Poiché $V(x)$ è indipendente dal tempo, considero l'equazione di Schrödinger stazionaria

$$H|\psi\rangle = E|\psi\rangle \rightarrow \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \rightarrow \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V(x))\psi = 0$$

Per notazione, si definiscono I, II, III gli intervalli $(-\infty, -a]$, $[-a, a]$, $[a, \infty)$.

La risoluzione dell'equazione differenziale si divide in 3 casi, a seconda del valore di E :

- **$E > 0$**

Definiti $k_I^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$ e $k_{II}^2 = \frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}$, si ha che l'equazione differenziale è

$$\begin{cases} \psi'' + k_I^2 \psi = 0 & |x| > a \\ \psi'' + k_{II}^2 \psi = 0 & |x| < a \end{cases}$$

che porta alla soluzione

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ik_I x} + Be^{-ik_I x} & x < -a \\ Ce^{ik_{II} x} + De^{-ik_{II} x} & x \in [-a, a] \\ Fe^{ik_I x} + Ge^{-ik_I x} & x > a \end{cases}$$

con $A, B, C, D, F, G \in \mathbb{C}$ costanti. Imponendo la continuità di ψ e ψ' in $-a$ e a , si trovano 4 equazioni lineari con 6 incognite: il sistema è sempre risolubile a meno di due parametri liberi e indipendenti dal valore di E , V_0 .

Questo evidenzia che per $E > 0$ lo spettro di H è continuo, con $E \in \mathbb{R}^+$, ma anche che è presente una degenerazione di grado 2 (per i due parametri liberi): deve dunque esistere un operatore che commuti con H , e questo è l'operatore parità Π , che ha come autospazi gli insiemi delle funzioni pari o dispari; questa distinzione tra gli autovettori di H è evidente scrivendo gli esponenziali complessi come somme di seni e coseni

$$Ae^{ik_I x} + Be^{-ik_I x} = a_1 \cos(k_I x) + a_2 \sin(k_I x) \quad x < -a$$

che possono produrre funzioni a parità definita; il SCOC è dunque $\{H, \Pi\}$ e gli stati del sistema possono essere identificati dal *ket* $|E, \pm\rangle$, dove $\pm$ indica la parità dell'autofunzione.

Questo risultato è generale, per il seguente teorema

Teoremino Dati due stati $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$ tali che $H|\psi_i\rangle = E|\psi_i\rangle$, con $[H, \Pi] = 0$, si possono sempre costruire autostati di H simmetrici o antisimmetrici.

Dim. Considero $|\pm\rangle := |\psi_i\rangle \pm \Pi|\psi_i\rangle$:

$\Pi|\pm\rangle = \Pi|\psi_i\rangle \pm \Pi^2|\psi_i\rangle = \Pi|\psi_i\rangle \pm |\psi_i\rangle = \pm|\pm\rangle$, cioè $|\pm\rangle$ è, rispettivamente, simmetrico o antisimmetrico; inoltre $H|\pm\rangle = H|\psi_i\rangle \pm H\Pi|\psi_i\rangle = E(|\psi_i\rangle \pm \Pi|\psi_i\rangle) = E|\pm\rangle$ **QED**

Un altro modo comune di risolvere la degenerazione è indicare se la particella incida sulla buca da destra o da sinistra, ponendo, rispettivamente, $A = 0$ o $G = 0$.

- $0 \leq E \leq V_0$ Classicamente le zone *I* e *III* sono proibite, ma, come è noto, non lo sono quantisticamente: l'equazione differenziale diventa

$$\begin{cases} \psi'' - \beta^2 \psi = 0 & |x| > a \\ \psi'' + k^2 \psi = 0 & |x| < a \end{cases}$$

con $\beta^2 = \frac{-2mE}{\hbar^2} > 0$ e $k^2 = \frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2} > 0$.

Come è noto, le soluzioni in $|x| > a$ sono del tipo $\psi(x) = Ae^{\beta x} + Be^{-\beta x}$ e, per garantire che $\psi(x)$ sia almeno una distribuzione regolare, bisogna annullare i termini che divergono, cioè l'esponenziale positivo (negativo) per $x > 0$ ($x < 0$). La soluzione è dunque

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{\beta x} & x < -a \\ Ce^{ikx} + De^{-ikx} & -a < x < a \\ Ge^{-\beta x} & x > a \end{cases}$$

Che può essere riscritta in termini di funzioni pari o dispari, come specificato prima:

$$\psi_P(x) = \begin{cases} Ae^{\beta x} \\ B \cos(kx) \\ Ae^{-\beta x} \end{cases} \quad \psi_D(x) = \begin{cases} Ce^{\beta x} & x < -a \\ D \sin(kx) & -a < x < a \\ -Ce^{-\beta x} & x > a \end{cases}$$

Le condizioni di continuità di $\psi(x)$ e $\psi'(x)$ sono due sistemi lineari a due equazioni e due incognite: se il sistema non è singolare ($\det M_{\text{coeff}} \neq 0$), l'unica soluzione è $\psi(x) \equiv 0$, soluzione non ammissibile, mentre se è singolare le condizioni sui determinanti sono, rispettivamente per ψ_P e ψ_D , $k \tan(ka) = \beta$ e $k \cot(ka) = \beta$.

Queste condizioni sono facilmente risolubili numericamente definendo le quantità

$$\begin{aligned} \xi &= ka \\ \eta &= \beta a \\ r^2 &= \frac{-2m}{\hbar^2} V_0 = \xi^2 + \eta^2 \end{aligned}$$

e diventano

$$\begin{cases} \xi \tan(\eta) = \eta \\ \xi^2 + \eta^2 = r^2 \end{cases} \quad \begin{cases} \xi \cot(\eta) = \eta \\ \xi^2 + \eta^2 = r^2 \end{cases}$$

Nelle figure 3.1 e 3.2 sono rappresentate le soluzioni dei sistemi.




Fig. 3.1: Soluzioni per le autofunzioni pari




Fig. 3.2: Soluzioni per le autofunzioni dispari

Questi sistemi hanno un insieme discreto e finito di soluzioni e questo quantizza l'energia.

Oss. Come si nota dalla figura 3.1, lo stato fondamentale è pari ed è l'unico che esiste per ogni valore di r , cioè di V_0 . Queste caratteristiche sono generali, come si vedrà in seguito.

- $E < V_0$ Classicamente questo caso è completamente proibito; quantisticamente la soluzione è fatta da soli esponenziali reali

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{\beta_I x} & x < -a \\ Be^{\beta_{II} x} + De^{-\beta_{II} x} & -a < x < a \\ Ge^{-\beta_I x} & x > a \end{cases}$$

A differenza del caso precedente, il sistema imposto dalle condizioni di continuità non può mai essere singolare, quindi questo caso **non è possibile** nemmeno nella meccanica quantistica.

Ricapitolando, l'hamiltoniana di una buca finita di potenziale ha sia spettro discreto $Spd \subset [V_0, 0]$ sia spettro continuo $Spc = [0, \infty)$.

3.4.1 Casi limite

Si trattano ora tre casi limite del problema appena risolto.

- **Buca infinita**

Per $V_0 \rightarrow -\infty$, si ha solo spettro discreto ed esso diventa infinito:

la condizione $\xi^2 + \eta^2 = \frac{-2m}{\hbar^2} V_0 \rightarrow \infty$ e, in questo limite, le soluzioni dei sistemi sono gli asintoti di $\tan(x)$ e $\cot(x)$, cioè $\xi = n\pi$, la relazione $\xi^2 + \eta^2 = r^2$ diventa

$$n^2 \pi^2 = a^2(k^2 + \beta^2) = \frac{2ma^2}{\hbar^2}(E - V_0) \rightarrow E_n - V_0 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

- $V_0 \rightarrow 0$

In questo limite, $r^2 \rightarrow 0$ ed esiste un unico stato legato pari, con $\xi \rightarrow 0$ e $\eta \rightarrow 0$:

$\eta = \xi \tan(\xi) \approx \xi^2$ e dunque $\eta^2 + \eta = r^2 \rightarrow \eta \approx r^2$; ricordando le definizioni di queste quantità si trova $E = \frac{-2ma^2}{\hbar^2} V_0^2$

- $V(x) = -\delta(x)$

Per avere una delta di Dirac, non basta far tendere la profondità a ∞ e la larghezza a 0, ma serve che l'area sia costante: si definisce $V_0 = \frac{-A}{2a}$ e $\lim_{a \rightarrow 0} V(x) = -A\delta(x)$.

$r^2 = \frac{-2m}{\hbar^2} a^2 V_0^2 = \frac{mA}{\hbar^2} a \rightarrow 0$ per $a \rightarrow 0$: si possono utilizzare i limiti del caso precedente e trovare che c'è un solo stato legato con energia $E = \frac{-2ma^2}{\hbar^2} V_0^2 = \frac{-m}{2\hbar^2} A^2$

3.5 Risultati generali sui potenziali

3.5.1 Potenziale attrattivo

Si dice potenziale attrattivo un potenziale $V(\vec{x})$ tale che

$$\lim_{|\vec{x}| \rightarrow \infty} V(\vec{x}) = 0, \quad V(\vec{x}) < 0$$

Per i potenziali di questo tipo valgono i seguenti risultati

- $E < 0 \rightarrow \psi \in L^2(\mathbb{R}^3)$, cioè $\psi(\vec{x}) \underset{|\vec{x}| \rightarrow \infty}{\sim} e^{-\beta|\vec{x}|}$.

Infatti l'equazione di Schrödinger $\frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi = E\psi$ è asintoticamente equivalente a $\nabla^2 \psi - \beta^2 \psi \sim 0$, che ha come soluzione proprio $\psi(\vec{x}) \underset{|\vec{x}| \rightarrow \infty}{\sim} e^{-\beta|\vec{x}|}$; essendo ψ quadrato-sommabile, $E \in Spd(H)$

Si ha inoltre che $\forall \epsilon > 0, \exists V \subset \mathbb{R}^3$ t.c. $\int_V d^3x |\psi|^2 = 1 - \epsilon$, come conseguenza della quadrato-sommabilità di ψ .

- $E > 0 \rightarrow \psi$ di particella libera.

Infatti la soluzione asintotica dell'equazione di Schrödinger è $\psi(\vec{x}) \underset{|\vec{x}| \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}}$, che non è normalizzabile, dunque $E \in Spc(H)$

3.5.2 Potenziali limitati inferiormente

Si consideri un'Hamiltoniana di un sistema di N particelle

$$H = \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m_i} + V(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N)$$

Teorema

Se il potenziale è limitato inferiormente, cioè $\exists V_0$ t.c. $V > V_0 \forall \vec{x}_i \in \mathbb{R}^{3N}$, allora lo spettro energetico è limitato inferiormente, $\exists E_{min} > V_0$.

Dimostrazione, Spd(H)

$\forall |\psi\rangle \in \mathcal{H}$, $\langle \psi | H | \psi \rangle = \langle \psi | T | \psi \rangle + \langle \psi | V | \psi \rangle$.

Per T vale:

$$\langle \psi | T | \psi \rangle = \sum_{i=0}^N \frac{1}{2m_i} \langle \psi | p_i^\dagger p_i | \psi \rangle = \sum_{i=0}^N \frac{1}{2m_i} \|p_i | \psi \rangle\|^2 > 0$$

Per V vale:

$$\langle \psi | V | \psi \rangle = \int dx dy \langle \psi | x \rangle \langle x | V | y \rangle \langle y | \psi \rangle = \int dx V(x) |\psi|^2 \geq V_0 \langle \psi | \psi \rangle = V_0$$

dove si è indicato con x, y l'insieme di tutte le $3N$ coordinate.

Si ha dunque che $\langle H \rangle > V_0$ **QED**

Dimostrazione, Spc(H)

Si consideri ora $\langle \psi | (H - E) | \psi \rangle > V_0 - E := C$ per il risultato precedente; per assurdo, si assuma $E < V_0 \rightarrow C > 0$.

Allora $\langle \psi | (H - E) | \psi \rangle = \langle \psi | (H - E) | \psi \rangle \leq \| |\psi\rangle \| \| (H - E) | \psi \rangle \|$ e si ha

$$\| |\psi\rangle \| \| (H - E) | \psi \rangle \| > C \rightarrow \frac{\| (H - E) | \psi \rangle \|}{\| |\psi\rangle \|} > \frac{C}{\| |\psi\rangle \|^2} = C > 0$$

Prendendo l'Inf di questa espressione si trova $\inf_{|\psi\rangle \in \mathcal{H}} \frac{\| (H - E) | \psi \rangle \|}{\| |\psi\rangle \|} > \bar{C} > 0$

Ciò la definizione di E punto regolare per H , si ha dunque che se $E < V_0$, allora $E \notin Sp(H)$.

QED

3.5.3 Spettri energetici limitati inferiormente

Il caso di spettri energetici non limitati inferiormente non ha significato fisico, in quanto il sistema tenderà sempre a raggiungere lo stato fondamentale (quando possibile): se questo ha energia "infinitamente negativa", cioè se $Sp(H)$ non è limitato inferiormente, la particella "cade in un buco" e, per osservarla, sarebbe necessaria energia infinita.

Si cerca ora di determinare se esistano potenziali non limitati inferiormente che però generino spettri limitati: un esempio ben noto è il potenziale di Coulomb $V(r) = \frac{-e}{4\pi\epsilon_0 r}$, che genera lo spettro energetico dell'atomo di idrogeno, limitato inferiormente dall'energia di Rydberg.

Si consideri il caso di una particella in 3 dimensioni soggetta a un potenziale radiale del tipo

$$V(r) = \frac{-\alpha}{r^n}$$

e si supponga che esista uno stato legato per $r \rightarrow 0$ e che la particella si trovi in un intervallo dell'ordine di $r_0 \sim \Delta r$: per il principio di indeterminazione si ha $\Delta p \sim p \sim \frac{\hbar}{r_0}$ e dunque

$$\langle H \rangle = \frac{1}{2m} \langle p^2 \rangle - \frac{\alpha}{r_0^n} \sim \frac{\hbar^2}{2mr_0^2} - \frac{\alpha}{r_0^n}$$

Intuitivamente, se $\langle H \rangle$ ha un minimo per qualche r_0 , lo spettro è limitato inferiormente:

$$\frac{\partial}{\partial r_0} \langle H \rangle = \frac{-\hbar^2}{mr_0^3} - \frac{n\alpha}{r_0^{n+1}} = 0 \rightarrow r_0^{n-2} = \frac{-mn\alpha}{\hbar^2}$$

che non ha soluzione per $n = 2$; la derivata seconda $\partial_{r_0}^2 \langle H \rangle$ è positiva in $r_0 = \frac{-mn\alpha}{\hbar^2}$ se e solo se $n = 1$.

Dunque solo i potenziali con $n = 1$ hanno significato fisico.

Un'intuizione per comprendere il perché esistano spettri limitati con potenziali non limitati è la seguente: quando la particella rischia di "cadere nel buco" e la sua distanza dall'origine diminuisce, essa si agita sempre di più per il principio di Heisenberg e, se l'attrazione del potenziale non è troppo forte, l'energia cinetica e potenziale raggiungono un equilibrio; sono proprio l'esistenza di $\hbar$ e dell'indeterminazione che permettono questo equilibrio, cioè la stabilità della materia.

3.6 Lo stato fondamentale

Prese hamiltoniane con spettro limitato inferiormente, lo stato fondamentale (o vuoto), cioè quello con energia $E_0 = \min\{Sp(H)\}$, ha alcune importanti proprietà.

Si introducono prima due lemmi, utili per le dimostrazioni successive

Lemma 1 Se il potenziale $V(x)$ è reale, allora le autofunzioni di H possono essere prese reali.

Dimostrazione $H\psi(x) = E\psi(x) \rightarrow H\psi^*(x) = E\psi^*(x)$, le combinazioni

$$\begin{aligned}\psi_+(x) &= \frac{1}{2}(\psi(x) + \psi^*(x)) = \text{Re}(\psi) \\ \psi_-(x) &= \frac{-i}{2}(\psi(x) - \psi^*(x)) = \text{Im}(\psi)\end{aligned}$$

sono autofunzioni reali di H . **QED**

Lemma 2 La funzione d'onda dello stato fondamentale $\psi_0(x)$ di energia E_0 non ha mai zeri.
Dimostrazione (1D) per assurdo, suppongo che $\exists x_0$ tale che $\psi_0(x_0) = 0$: questo zero deve essere semplice, poichè in caso contrario $\psi_0(x) \equiv 0$ e la soluzione non è fisica; dunque $\left. \frac{d\psi_0}{dx} \right|_{x_0} \neq 0$ e vale che

$$\begin{cases} \psi_0(x) > 0 & \text{se } x < x_0 \\ \psi_0(x) < 0 & \text{se } x > x_0 \end{cases}$$

o viceversa.

Si consideri ora $\varphi(x) := |\psi_0(x)|$:

$$\langle \varphi | H | \varphi \rangle = \int dE dE' \langle \varphi | E \rangle \langle E | H | E' \rangle \langle E' | \varphi \rangle = \int dE E |\langle \varphi | E \rangle|^2 > E_0 \int dE |\langle \varphi | E \rangle|^2 = E_0$$

dove si è usata la completezza dello spettro di H nel primo e nell'ultimo passaggio.

Si ha inoltre

$$\langle \varphi | H | \varphi \rangle = \frac{1}{2m} \|p|\varphi\rangle\|^2 + \langle \varphi | V | \varphi \rangle = \int dx \frac{\hbar^2}{2m} |\varphi'(x)|^2 + V(x) |\varphi(x)|^2$$

ma, per definizione di $\varphi(x)$, $|\varphi(x)| = |\psi_0(x)|$ e $|\varphi'(x)| = |\psi'_0(x)|$, quindi

$$\langle \varphi | H | \varphi \rangle = E_0$$

Queste affermazioni sono in contraddizione, quindi $\nexists x_0$ **QED**.

Si enuncia ora un importante teorema:

Teorema Lo stato fondamentale non è mai degenere

Dimostrazione per assurdo, suppongo che esistano ψ_1, ψ_2 autostati linearmente indipendenti di H con autovalore E_0 : fissato $x_0 \in \mathbb{R}$, considero la combinazione lineare

$$\psi(x) = N[\psi_1(x_0)\psi_2(x) - \psi_2(x_0)\psi_1(x)]$$

che ha sempre energia E_0 ; o il punto x_0 è uno zero di $\psi(x)$, che è assurdo per il Lemma 2, o la funzione è identicamente nulla, che significa che $\psi_1 \propto \psi_2$, che è assurdo perché ψ_1, ψ_2 sono linearmente indipendenti. **QED**

Oss. questo teorema implica non solo che lo stato fondamentale non ha mai nodi, ma anche che gli stati eccitati ne abbiano: considerando il primo stato eccitato $\psi_1(x)$, deve valere che $0 = \langle \psi_0 | \psi_1 \rangle = \int dx \psi_0^*(x) \psi_1(x)$, che non è possibile se $\psi_1(x)$ non si annulla almeno una volta; analogamente si ragiona per $\psi_2(x)$ e si trova che l' n -esimo stato eccitato deve avere almeno n nodi.

Corollario Lo stato fondamentale è autostato di tutti gli operatori che commutano con H .

Dimostrazione Dato $F/[H, F] = 0$, si ha

$$HF|\psi_0\rangle = FH|\psi_0\rangle = E_0 F|\psi_0\rangle$$

che significa che anche lo stato $F|\psi_0\rangle$ ha autovalore E_0 , dunque per il teorema $F|\psi_0\rangle \propto |\psi_0\rangle$, cioè $F|\psi_0\rangle = \lambda|\psi_0\rangle$ **QED**

Oss. questo è un risultato molto importante, perché asserisce che lo stato fondamentale di H presenta le stesse simmetrie di H che, in altre parole, significa che **in Meccanica Quantistica non esiste la rottura spontanea di simmetria**, quando i gradi di libertà sono finiti.

Questo non è vero in meccanica classica, si prenda come esempio il cosiddetto potenziale a *sombrero*, che è una funzione pari: i moti con energia minima sono banali (la particella rimane ferma o a destra o a sinistra del picco centrale della funzione) e non presentano parità, in altre parole **viene rotta la simmetria di parità del potenziale**.




Fig. 3.3: Potenziale $V(x) = x^4 - x^2$, un esempio di potenziale a *sombrero*

In meccanica quantistica, invece, lo stato fondamentale di un potenziale del genere può fare *tunneling* e, per il teorema precedente, **deve** essere pari.

Un altro esempio manifesto di questo risultato è lo stato fondamentale dell'atomo di idrogeno: l'hamiltoniana coulombiana è invariante per rotazioni attorno a un qualunque asse, infatti lo stato fondamentale $\psi_{100}(r, \theta, \varphi)$ ha simmetria sferica (poiché la ha l'armonica sferica $Y_0^0(\theta, \varphi)$)

La rottura spontanea di simmetria è possibile invece in teorie quantistiche a *infiniti* gradi di libertà, cioè nelle teorie di campo quantistiche.

4 Prodotto diretto tra Spazi di Hilbert

Nel corso di Meccanica Quantistica 1 si sono incontrati degli stati dipendenti da più numeri quantici, legati agli autovalori di un SCOC: in particolare ci sono due diverse situazioni

- Gli autovalori del SCOC **non sono indipendenti** tra loro, come nel caso di j, m dei momenti angolari;
- Gli autovalori del SCOC **sono indipendenti** tra loro, come il numero quantico di spin s e il numero quantico dell'energia n .

Nel secondo caso, i gradi di libertà si possono considerare indipendenti, cioè gli autovettori appartengono a spazi di Hilbert *diversi*.

In seguito è presentata la trattazione formale di questo concetto.

4.1 Costruzione dello spazio prodotto

Def. Dati due vettori in spazi di Hilbert $|a\rangle_1 \in \mathcal{H}_1, |b\rangle_2 \in \mathcal{H}_2$, il *prodotto diretto* (o tensoriale) $|a\rangle_1 \otimes |b\rangle_2 := |c\rangle_\otimes$ è un'applicazione lineare e continua dell'insieme di omomorfismi $\text{Hom}(\mathcal{H}_1^*, \mathcal{H}_2) \sim \text{Hom}(\mathcal{H}_2^*, \mathcal{H}_1)$.

Questo significa che il prodotto tensoriale è, contemporaneamente

- $|c\rangle_\otimes : \mathcal{H}_1^* \rightarrow \mathcal{H}_2$, cioè tale che ${}_1\langle d|c\rangle_\otimes := ({}_1\langle d|a\rangle_1) |b\rangle_2 \in \mathcal{H}_2$;
- $|c\rangle_\otimes : \mathcal{H}_2^* \rightarrow \mathcal{H}_1$, cioè tale che ${}_2\langle e|c\rangle_\otimes := ({}_2\langle e|b\rangle_2) |a\rangle_1 \in \mathcal{H}_1$.

Bisogna inoltre richiedere che $\otimes$ sia associativo rispetto alle strutture lineari di $\mathcal{H}_1$ e di $\mathcal{H}_2$: $(\lambda |a\rangle_1 + \mu |b\rangle_1) \otimes |c\rangle_2 = \lambda |a\rangle_1 \otimes |c\rangle_2 + \mu |b\rangle_1 \otimes |c\rangle_2$ e viceversa.

Si noti però che $|c\rangle_\otimes$ non è uno spazio vettoriale, poiché non è detto che esistano due vettori $|\alpha\rangle_1, |\beta\rangle_2$ tali che $|a\rangle_1 \otimes |b\rangle_2 + |c\rangle_1 \otimes |d\rangle_2 = |\alpha\rangle_1 \otimes |\beta\rangle_2$: il fine è di costruire un nuovo spazio di Hilbert, dunque le combinazioni lineari di prodotti tensoriali dovranno essere aggiunte "a forza" nello spazio che si vuole creare.

Lo spazio prodotto è unitario rispetto al prodotto scalare $_\otimes\langle c_1|c_2\rangle_\otimes := ({}_1\langle a_1|a_2\rangle_1)({}_2\langle b_1|b_2\rangle_2)$, che gli conferisce una struttura metrica e topologica, come già discusso.

L'ultimo requisito da soddisfare è la completezza: come per la struttura vettoriale, si aggiungono allo spazio tutti i limiti delle successioni e delle serie di Cauchy in modo da renderlo completo.

Def. Lo spazio prodotto diretto (o tensoriale) di due spazi di Hilbert $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ è l'insieme dei prodotti tensoriali dei loro elementi, unito alle loro combinazioni lineari e ai limiti di successioni e serie di Cauchy. Si scrive $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ ed è uno spazio di Hilbert.

4.2 Base dello spazio prodotto

Il generico elemento di $\mathcal{H}$, per la completezza dello spazio, si può scrivere come

$$|v\rangle = \sum_k^\infty \Lambda_k |a_k\rangle_1 \otimes |b_k\rangle_2$$

con Λ_k coefficienti complessi; scelte delle basi per $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$, si può scrivere

$$|a_k\rangle_1 = \sum_i c_{ki} |i\rangle_1 \text{ e } |b_k\rangle_2 = \sum_j d_{kj} |j\rangle_2$$

e allora si ha

$$|v\rangle = \sum_{k,i,j} \Lambda_k c_{ki} d_{kj} |i\rangle_1 \otimes |j\rangle_2 := \sum_{i,j} \lambda_{ij} |i\rangle_1 \otimes |j\rangle_2$$

con $\lambda_{ij} := \sum_k \Lambda_k c_{ki} d_{kj}$

La base è dunque $|i\rangle_1 \otimes |j\rangle_2$ ed è ortonormale e completa per costruzione, infatti

$$\{|i\rangle \otimes |j\rangle\} \{|k\rangle \otimes |l\rangle\} = \delta_{ik} \delta_{jl}$$

4.3 Operatori sullo spazio prodotto

Un operatore su $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 = \mathcal{H}$ è definito come su un qualunque spazio di Hilbert, ma può essere "ridotto" a un operatore su uno dei due spazi iniziali;

Denotando con $|il\rangle := |i\rangle_1 \otimes |l\rangle_2$ la base di $\mathcal{H}$, la rappresentazione di un operatore F su $\mathcal{H}$ rispetto alla base è

$$F = F\mathbb{I} = \sum_{i,j,l,m} |il\rangle \langle il| F |jm\rangle \langle jm| := \sum_{i,j,l,m} |il\rangle F_{il,jm} \langle jm|$$

dove $F_{il,jm} \in \mathbb{C}$ sono i coefficienti che definiscono l'operatore rispetto alla base.

Dato l'operatore F e due vettori $|\alpha\rangle_1, |\beta\rangle_1 \in \mathcal{H}_1$, si definisce un operatore su $\mathcal{H}_2$ nel seguente modo:

$${}_1\langle\alpha| F |\beta\rangle_1 = \sum_{i,l,j,m} ({}_1\langle\alpha|i\rangle_1) |l\rangle_2 F_{il,jm} \langle m|_2 ({}_1\langle j|\beta\rangle_1) := \sum_{l,m} |l\rangle_2 \hat{F}_{lm} \langle m|_2$$

che è un operatore su $\mathcal{H}_2$, dove $\hat{F}_{lm} := \sum_{i,j} ({}_1\langle\alpha|i\rangle_1) F_{il,jm} ({}_1\langle j|\beta\rangle_1)$ è la rappresentazione dell'operatore rispetto alla base di $\mathcal{H}_2$

Esempio La traccia di un operatore su $\mathcal{H}_1$ è

$$Tr_1(F) := \sum_k {}_1\langle k| F |k\rangle_1 = \sum_{l,m} |l\rangle_2 \left(\sum_k F_{kl,km} \right) \langle m|_2$$

ed è un operatore su $\mathcal{H}_2$

Un altro modo di costruire operatori sullo spazio prodotto è definire il prodotto tensoriale tra operatori:

Def. Dati A_1, A_2 operatori su $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$, il loro prodotto tensoriale $A_1 \otimes A_2 = B$ è un operatore su $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ tale che

$$B(|a\rangle_1 \otimes |b\rangle_2) := A_1 |a\rangle_1 \otimes A_2 |b\rangle_2$$

Oss. Per definire operatori che agiscono solo su uno dei due spazi, basta moltiplicarli per l'identità: $B = \mathbb{I} \otimes A_2 \rightarrow B(|a\rangle_1 \otimes |b\rangle_2) = |a\rangle_1 \otimes A_2 |b\rangle_2$

4.4 Esempio: lo spin di una particella in 3 dimensioni

L'esempio più importante di spazio di Hilbert prodotto è dato dal grado di libertà di spin, che, nella meccanica quantistica non relativistica, deve essere postulato (mentre emerge dalla formulazione di Dirac).

$\vec{S}$ è un operatore vettoriale che segue l'algebra del momento angolare $[S_i, S_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}S_k$; dalla teoria del momento angolare si trova che, scelto il SCOC $\{S^2, S_z\}$, gli autovalori degli autostati simultanei sono

$$\begin{cases} S^2 |s, s_z\rangle = \hbar^2 s(s+1) |s, s_z\rangle & s = \frac{n}{2}, n \in \mathbb{Z} \\ S_z |s, s_z\rangle = \hbar s_z |s, s_z\rangle & s_z = -s, -s+1, \dots, 0, \dots, s-1, s \end{cases}$$

lo spazio di Hilbert dei gradi di libertà di spin è dunque uno spazio vettoriale di dimensione $2s+1$ basato sul campo complesso: $\mathcal{H}_{\text{spin}} = \mathbb{C}^{2s+1}$.

Visto che questi operatori non "vedono" la parte spaziale, lo spazio di Hilbert totale di una particella con spin s in 3 dimensioni è

$$\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^3) \otimes \mathbb{C}^{2s+1}$$

Scelta come base $\{|\vec{x}, s_z\rangle = |\vec{x}\rangle \otimes |s_z\rangle\}^6$, si può scrivere il generico stato del sistema

$$|\psi\rangle = \sum_{s_z=-s}^s \int d^3\vec{x} |\vec{x}, s_z\rangle \langle \vec{x}, s_z | \psi \rangle := \sum_{s_z=-s}^s \int d^3\vec{x} \psi_{s_z}(\vec{x}) |\vec{x}, s_z\rangle$$

dunque

$$\langle \vec{x} | \psi \rangle = \psi(\vec{x}) = \sum_{s_z=-s}^s \psi_{s_z}(\vec{x}) |s_z\rangle = \begin{pmatrix} \psi_s(\vec{x}) \\ \vdots \\ \psi_{-s}(\vec{x}) \end{pmatrix}$$

che è detta funzione d'onda vettoriale.

5 Postulato 1 della Meccanica Quantistica

I possibili risultati della misura di un osservabile F sono solo i suoi autovalori $\{f_i\}$. Ciascun autovalore ha una probabilità $\mathcal{P}_\psi(f_i)$ dipendente dallo stato del sistema.

Questo è detto, per ovvii motivi, postulato della misura.

Per definire queste probabilità bisogna distinguere 3 casi:

- $f_i \in \text{Spd}(F)$ **non degeneri**

Dato l'autostato (normalizzato) $|f_i\rangle$ e uno stato $|\psi\rangle$, si **definisce**

$$\mathcal{P}_\psi(f_i) := |\langle f_i | \psi \rangle|^2 = \langle \psi | f_i \rangle \langle f_i | \psi \rangle := \langle \psi | P_{f_i} | \psi \rangle$$

dove $P_{f_i} := |f_i\rangle \langle f_i|$ è il **proiettore** sullo stato $|f_i\rangle$

⁶con $|s_z = s\rangle = e_1$ e $|s_z = -s\rangle = e_{2s+1}$ elementi della base standard di $\mathbb{C}^{2s+1}$

- $\mathbf{f}_i \in \mathbf{Spd}(\mathbf{F})$ **degenere** Si supponga che l'autovalore f_i abbia una degenerazione di grado n_i : si può sempre costruire una base per l'autospazio degenere $\{|f_i, \alpha_\mu\rangle\}$, con $\mu = 1, 2, \dots, n_i$;

Si **definisce** dunque

$$\mathcal{P}_\psi(f_i) := \sum_{\mu=1}^{n_i} |\langle f_i, \alpha_\mu | \psi \rangle|^2 = \langle \psi | \left(\sum_{\mu=1}^{n_i} |f_i, \alpha_\mu\rangle \langle f_i, \alpha_\mu| \right) | \psi \rangle := \langle \psi | P_{f_i} | \psi \rangle$$

avendo opportunamente ridefinito il proiettore.

- $\mathbf{f} \in \mathbf{Spc}(\mathbf{F})$

Nel caso di spettro continuo, si definisce una **densità di probabilità** nel modo seguente:

$$\mathcal{P}_\psi(f, f + \Delta f) := \int_f^{f+\Delta f} df \langle \psi | P_f | \psi \rangle$$

dove $P_f := |f\rangle \langle f|$ (nel caso non degenere).

5.1 Valor medio di un'osservabile

Data un'osservabile F e uno stato normalizzato $|\psi\rangle$, il suo valor medio è il numero

$$\langle F \rangle_\psi = \langle \psi | F | \psi \rangle := \sum_i f_i \mathcal{P}_\psi(f_i) = \sum_i f_i |\langle f_i | \psi \rangle|^2$$

un modo più generico di scrivere la stessa quantità, come sarà chiaro tra poco, è il seguente:

$$\langle \psi | F | \psi \rangle = \sum_i \langle \psi | i \rangle \langle i | F | \psi \rangle = \sum_i \langle i | F | \psi \rangle \langle \psi | i \rangle = \text{Tr}(F P_\psi)$$

con $\{|i\rangle\}$ base ONC qualunque, in quanto la traccia di un operatore è invariante per cambio di base.

Similmente si può ricavare che $\mathcal{P}_\psi(f_i) = \text{Tr}(P_{f_i} P_\psi)$.

5.2 Stati misti e matrice densità

Prima di procedere con la trattazione del postulato della misura, è necessario introdurre il concetto di **stato misto**.

Def. Uno stato misto è una miscela di stati quantistici puri $|\psi_k\rangle$ tale che la probabilità classica di trovare uno degli stati $|\psi_k\rangle$ sia ω_k , con

$$\sum_{k=1}^N \omega_k = 1.$$

Si consideri ora un'osservabile F : il valore medio di F sarà la media classica dei valori medii:

$$\sum_{k=1}^N \omega_k \langle \psi_k | F | \psi_k \rangle = \sum_{k=1}^N \omega_k \text{Tr}(F P_k) = \text{Tr} \left(F \sum_{k=1}^N \omega_k |\psi_k\rangle \langle \psi_k| \right) := \text{Tr}(F \rho) := \langle F \rangle_\rho$$

Def. L'operatore $\rho := \sum_{k=1}^N \omega_k |\psi_k\rangle \langle \psi_k|$ si dice **matrice densità** e rappresenta lo stato misto.

Oss. La matrice densità di uno stato puro è il caso banale $\rho_\psi = |\psi\rangle \langle \psi|$: questo rende più chiara la notazione $\langle F \rangle_\psi = \text{Tr}(F P_\psi) = \text{Tr}(F \rho_\psi)$

5.2.1 Proprietà della matrice densità

1. Hermiticità $\rho = \rho^\dagger$;
2. $\text{Tr}(\rho) = \sum_k \omega_k \text{Tr}(P_k) = \sum_k \omega_k \sum_i \langle i | \psi_k \rangle \langle \psi_k | i \rangle = \sum_k \omega_k = 1$;
3. Autovettori e autovalori $\rho |\psi_l\rangle = \sum_k \omega_k \langle \psi_k | \psi_l \rangle |\psi_k\rangle = \omega_l |\psi_l\rangle$, che è ovvio, in quanto ρ è diagonale nella base $\{|\psi_k\rangle\}$;
4. $\forall |v\rangle \in \mathcal{H}, \langle v | \rho | v \rangle = \sum_k \omega_k \langle v | \psi_k \rangle \langle \psi_k | v \rangle = \sum_k \omega_k |\langle v | \psi_k \rangle|^2 \geq 0$;
5. Idempotenza $\rho^2 = \rho$, quindi $\text{Tr}(\rho^2) = \text{Tr}(\rho) = 1$.

I risultati della misura dell'osservabile F sono sempre gli autovalori f_i , pesati con la probabilità sia classica ω_k sia quantistica $\mathcal{P}_{\psi_k}(f_i)$:

$$\mathcal{P}_\rho(f_i) := \langle P_{f_i} \rangle_\rho = \text{Tr}(P_{f_i} \rho) = \sum_{k=1}^N \omega_k \mathcal{P}_{\psi_k}(f_i) \in \mathbb{R}$$

Esempio Quale è la differenza tra uno stato puro e uno stato misto?

Si consideri un operatore A con spettro discreto $\{a_i\}$ e due stati quantistici

$$|\psi\rangle = \sum_i a_i |a_i\rangle \quad \text{e} \quad \rho = \sum_i \omega_i |a_i\rangle \langle a_i|, \quad \text{con } \omega_i = |c_i|^2$$

Dalla misura di A si trovano risultati identici:

$$\mathcal{P}_\psi(a_i) = \langle \psi | P_{a_i} | \psi \rangle = |\langle a_i | \psi \rangle|^2 = |c_i|^2 = \omega_i$$

$$\mathcal{P}_\rho(a_i) = \text{Tr}(P_{a_i} \rho) = \text{Tr} \left(\sum_j \omega_j (|a_i\rangle \langle a_i|) (|a_j\rangle \langle a_j|) \right) = \sum_j \omega_j \langle a_j | a_i \rangle \langle a_i | a_j \rangle = \omega_i$$

Se però si considera un operatore B tale che $[A, B] \neq 0$, le probabilità di misurare un suo autovalore b sono:

$$\mathcal{P}_\rho(b) = \text{Tr}(P_b \rho) = \text{Tr} \left(\sum_k \omega_k |a_k\rangle \langle a_k| b \langle b| \right) = \sum_k \omega_k |\langle a_k | b \rangle|^2$$

mentre

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_\psi(b) &= \langle \psi | P_b | \psi \rangle = \sum_i \sum_j c_i^* c_j \langle a_i | b \rangle \langle b | a_j \rangle = \sum_{i=j} [\dots] + \sum_{i>j} [\dots] + \sum_{i<j} [\dots] = \\ &= \sum_i |c_i|^2 |\langle a_i | b \rangle|^2 + \sum_{i>j} c_i^* c_j \langle a_i | b \rangle \langle b | a_j \rangle + c_j^* c_i \langle a_j | b \rangle \langle b | a_i \rangle = \\ &= \sum_i \omega_i |\langle a_i | b \rangle|^2 + 2 \text{Re} \left(\sum_{i>j} c_i^* c_j \langle a_i | b \rangle \langle b | a_j \rangle \right) \end{aligned}$$

La differenza tra queste probabilità può essere intesa nel seguente modo: la miscela di stati puri ρ non comprende le fasi dei coefficienti di probabilità $\arg(c_i)$, mentre lo stato puro ψ sì; nella probabilità associata a ρ c'è solo il prodotto tra la probabilità classica e quella quantistica, in quella associata a ψ c'è anche un termine dato dall'interferenza tra le fasi dei coefficienti c_i .

Un altro modo per vedere questa differenza è considerare la matrice densità associata a ψ $\rho_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|$: essa non è diagonale nella base di autostati di A , infatti

$$\rho_\psi = |\psi\rangle\langle\psi| = \sum_i \sum_j c_i c_j^* |a_i\rangle\langle a_j|$$

mentre la matrice $\rho = \sum_k |c_k|^2 |a_k\rangle\langle a_k|$ lo è, quindi in ρ_ψ sono contenute più informazioni, cioè le fasi dei c_i .

Oss. Gli elementi diagonali di una matrice densità ρ si chiamano *popolazioni*, mentre quelli non diagonali si chiamano *coerenze*, dunque ρ si dice **sovrapposizione coerente** di stati, mentre ρ_ψ si dice **sovrapposizione incoerente** di stati.

5.2.2 Esempio: la polarizzazione della luce

Classicamente, la polarizzazione della luce è definita dal vettore campo elettrico

$$\mathbf{E}(z, t) = \begin{pmatrix} E_1 \cos(kz - \omega t + \alpha_1) \\ E_2 \sin(kz - \omega t + \alpha_2) \end{pmatrix} = \sqrt{E_1^2 + E_2^2} \operatorname{Re} \left[\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} e^{i(kz - \omega t)} \right]$$

con $a_i = \frac{E_i}{\sqrt{E_1^2 + E_2^2}} e^{i\alpha_i}$ tali che $|a_1|^2 + |a_2|^2 = 1$.

Se $\frac{a_2}{a_1} \in \mathbb{R}$, la polarizzazione è lineare in direzione $\theta = \operatorname{atan}\left(\frac{a_2}{a_1}\right)$; se invece $\frac{a_2}{a_1} = \pm i$, la polarizzazione è circolare.

In teoria quantistica dei campi, i fotoni sono particelle con $s = 1$ e il loro spazio di Hilbert sarebbe a $2s + 1 = 3$ dimensioni, se non fosse che, essendo *massless*, essi possiedono simmetria solo attorno all'asse del proprio momento, riducendo così la dimensione a 2.

Lo stato di un fotone può dunque essere descritto come un vettore $|\psi\rangle \in \mathcal{H} = \mathbb{C}^2$. Una possibile base di questo spazio è $\{|x\rangle, |y\rangle\}$, che rappresentano (rispettivamente) la polarizzazione lungo x e y e un qualunque stato puro del fotone può essere rappresentato in questa base come

$$|\psi\rangle = a_1 |x\rangle + a_2 |y\rangle, \text{ con } a_1, a_2 \in \mathbb{C} \text{ e } |a_1|^2 + |a_2|^2 = 1$$

La sua rappresentazione come matrice densità è invece

$$\rho_\psi = |\psi\rangle\langle\psi| = \begin{pmatrix} |a_1|^2 & a_1 a_2^* \\ a_2 a_1^* & |a_2|^2 \end{pmatrix}$$

Come prima, la polarizzazione è lineare di angolo $\theta = \operatorname{atan}(a_2/a_1)$ se $a_2/a_1 \in \mathbb{R}$ ed è in generale ellittica se $a_2/a_1 \notin \mathbb{R}$.

Questi stati puri hanno delle naturali rappresentazioni come matrici densità:

$$\theta = \pi/4 \rightarrow \rho_{\pi/4} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Circolare} \rightarrow \rho_{\odot} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix}$$

Per rappresentare la luce *non* polarizzata, si utilizzano stati misti.

Esempio Un fotone che ha la stessa probabilità di essere polarizzato lungo x e lungo y è descritto da

$$\rho = \frac{1}{2} (|x\rangle \langle x| + |y\rangle \langle y|)$$

che, nella base $\{|x\rangle, |y\rangle\}$ non è altro che $\rho = \frac{1}{2}\mathbb{I}$.

Si consideri inoltre lo stato puro

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|x\rangle + |y\rangle)$$

come si era visto, la probabilità di trovare la luce polarizzata lungo x è la medesima:

$$\mathcal{P}_{\rho}(x=1) = \text{Tr}(\rho P_x) = \text{Tr}\left(\frac{1}{2}\mathbb{I}|x\rangle \langle x|\right) = \frac{1}{2}$$

$$\mathcal{P}_{\psi}(x=1) = \text{Tr}(|\psi\rangle \langle \psi| x) \langle x| = \langle \psi|x\rangle \langle x|\psi\rangle = \frac{1}{2}$$

Ma se invece si calcola la probabilità di trovare la luce polarizzata a $\theta = \frac{\pi}{4}$ si trova

$$\mathcal{P}_{\psi}(\theta = \pi/4) = \text{Tr}\left(|\psi\rangle \langle \psi| \left|\frac{\pi}{4}\right\rangle \left\langle\frac{\pi}{4}\right|\right) = 1 \quad (\text{poiché } |\psi\rangle = \left|\frac{\pi}{4}\right\rangle)$$

$$\mathcal{P}_{\rho}(\theta = \pi/4) = \text{Tr}(\rho P_{\frac{\pi}{4}}) = \frac{1}{2}\text{Tr}(P_{\frac{\pi}{4}}) = \frac{1}{2}$$

questo vale $\forall\theta$, in quanto la traccia di un proiettore è sempre 1.

6 Postulato 2 della Meccanica Quantistica

La misura con precisione assoluta di tutte le osservabili che compongono un SCOC mette il sistema in un loro autostato simultaneo di dimensione 1.

6.1 Il collasso della funzione d'onda

Questo postulato è la versione più generale della definizione di collasso della funzione d'onda: nel caso di SCOC composto da una sola osservabile A , significa che la misura di A **modifica lo stato del sistema e lo pone nell'autostato normalizzato di A associato all'autovalore misurato**

$$|\psi\rangle \rightarrow \frac{P_{a_i} |\psi\rangle}{\|P_{a_i} |\psi\rangle\|}$$

cioè se, dopo la prima misura, si misura nuovamente l'osservabile A si ottiene **SEMPRE** lo stesso risultato a_i .

Esempio Sia dato un sistema fisico con SCOC $\{A, B\}$ e lo stato

$$|\psi\rangle = \sum_{k,n} c_{kn} |a_k, b_n\rangle$$

Se una misura di A restituisce il valore a_i , lo stato diventa (a meno di normalizzazioni)

$$|\psi\rangle \rightarrow P_{a_i} |\psi\rangle = \sum_{k,n} c_{kn} \sum_m |a_i, b_m\rangle \langle a_i, b_m | a_k, b_n\rangle = \sum_m c_{im} |a_i, b_m\rangle := |\psi'\rangle$$

dove si è utilizzato il fatto che $\langle a_i, b_m | a_k, b_n\rangle = \delta_{ik} \delta_{mn}$.

Se poi su questo stato si misura B e la misura restituisce il valore b_l , lo stato diventa

$$|\psi'\rangle \rightarrow P_{b_l} |\psi'\rangle = \sum_m c_{im} \sum_j |a_j, b_l\rangle \langle a_j, b_l | a_i, b_m\rangle = c_{il} |a_i, b_l\rangle$$

che è, a meno di normalizzazioni, un autostato simultaneo del SCOC, elemento dell'autospazio comune di dimensione 1.

Tutto questo ragionamento è analogo per gli stati misti, con la differenza che la misura di A su ρ comporta la trasformazione

$$\rho \rightarrow \frac{P_{a_i} \rho P_{a_i}}{\text{Tr}(P_{a_i} \rho P_{a_i})} := \rho'$$

che mantiene la "normalizzazione" di ρ , cioè $\text{Tr}(\rho') = 1$

Esempio, stato misto Si consideri la stessa situazione dell'esempio precedente, dato però lo stato misto

$$\rho = \sum_{\alpha} \omega_{\alpha} |\psi_{\alpha}\rangle \langle \psi_{\alpha}|$$

Dopo una misura di A che restituisce a_i lo stato diventa

$$\begin{aligned} \rho \rightarrow P_{a_i} \rho P_{a_i} &= \sum_{\alpha} \omega_{\alpha} \sum_{m,n} |a_i, b_m\rangle \langle a_i, b_m | \psi_{\alpha}\rangle \langle \psi_{\alpha} | a_i, b_n\rangle \langle a_i, b_n| = \\ &= \sum_{\alpha} \omega_{\alpha} \sum_{m,n} c_{im}^{(\alpha)} c_{in}^{(\alpha)*} |a_i, b_m\rangle \langle a_i, b_m| := \rho' \end{aligned}$$

E se, similmente a prima, una successiva misura di B restituisce b_l si trova

$$\begin{aligned} \rho' \rightarrow P_{b_l} \rho' P_{b_l} &= \sum_{\alpha} \omega_{\alpha} \sum_{m,n} c_{im}^{(\alpha)} c_{in}^{(\alpha)*} \sum_{k,j} |a_j, b_l\rangle \langle a_j, b_l | a_i, b_m\rangle \langle a_i, b_n | a_k, b_l\rangle \langle a_k, b_l| = \\ &= \sum_{\alpha} |c_{il}^{(\alpha)}|^2 |a_i, b_l\rangle \langle a_i, b_l| := d_{il} |a_i, b_l\rangle \langle a_i, b_l| \end{aligned}$$

che è, a meno di normalizzazioni, uno stato puro che è autostato simultaneo del SCOC.

Oss. Il postulato 2 fornisce sia un modo di costruire autostati di operatori, come già visto, sia un metodo per costruire stati misti.

Dato un sistema con SCOC 1-dimensionale $\{A\}$, si preparino N stati fisici identici

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |a_i\rangle$$

e si effettui su uno di essi una misura di A :

$$|\psi\rangle \rightarrow \frac{c_i |a_i\rangle}{\|c_i |a_i\rangle\|} = e^{i\varphi_i} |a_i\rangle \sim |a_i\rangle$$

la probabilità di misurare a_i è $\mathcal{P}_\psi(a_i) = |c_i|^2 := \omega_i$: se si svolge questo procedimento su tutti i sistemi e si considera la sovrapposizione dei risultati, si trova lo stato misto

$$\rho = \sum_k |c_k|^2 |a_k\rangle \langle a_k|$$

Questo procedimento costruisce uno stato incoerente proprio perché le *coerenze* dello stato iniziale sono date dalle fasi dei c_i , che sono state cancellate da questo procedimento.

Problema Come si può "misurare con precisione assoluta"?

In meccanica classica, questo non è *mai* possibile, in quanto i valori di ogni osservabile sono continui.

In meccanica quantistica è invece possibile *solo se* l'osservabile misurata ha **spettro discreto** e l'apparato sperimentale ha risoluzione minore della distanza tra ciascuna coppia di autovalori consecutivi.

Per le osservabili con spettro continuo non è invece possibile, perché la risoluzione sperimentale non è mai abbastanza fine da "costringere" il sistema esattamente in un solo autostato.

Oss. Questo è il motivo profondo per cui gli autostati dello spettro continuo di un'osservabile non sono elementi dello spazio di Hilbert del sistema, ma sono comunque basi generalizzate di esso: se una misura di posizione in 1D restituisce $x = (4.0 \pm 0.1)\text{fm}$, lo stato del sistema è una sovrapposizione continua di autostati di X ed è normalizzabile; viceversa, se la precisione fosse infinita, lo stato non sarebbe normalizzabile e non si potrebbe definire una distribuzione di probabilità.

7 Postulato 3 della Meccanica Quantistica

Si enuncia infine il postulato dell'evoluzione temporale.

Dato un sistema fisico con Hamiltoniana H e un tempo iniziale t_0 , l'operatore evoluzione temporale è l'unico operatore $U(t_0, t)$ soluzione dell'equazione differenziale di Schrödinger

$$i\hbar \frac{d}{dt} U(t, t_0) = H(t) U(t, t_0)$$

con condizione iniziale $U(t_0, t_0) = \mathbb{I}$.

Dato uno stato $|\psi\rangle$ a $t = t_0$, il valore medio di un'osservabile F al tempo $t > t_0$ è

$$\langle F \rangle_\psi(t) := \langle \psi | U^\dagger(t, t_0) F U(t, t_0) | \psi \rangle$$

L'operatore $U(t, t_0)$ è quindi l'ultimo tassello del puzzle: come esplicitato nel postulato, permette di fare predizioni sul valore medio delle osservabili nel tempo.

Oss. $U(t, t_0)$ è unitario: si considerino infatti l'equazione di Schrödinger e la sua hermitiana coniugata

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{dU}{dt} &= HU \rightarrow U^\dagger i\hbar \frac{dU}{dt} = U^\dagger HU \\ -i\hbar \frac{dU^\dagger}{dt} &= U^\dagger H \rightarrow -i\hbar \frac{dU^\dagger}{dt} U = U^\dagger HU \end{aligned}$$

Sottraendo membro a membro si ottiene

$$i\hbar \left(U^\dagger \frac{dU}{dt} + \frac{dU^\dagger}{dt} \right) = 0 \leftrightarrow \frac{d}{dt} (U^\dagger U) = 0 \leftrightarrow U^\dagger U = \text{cost.}$$

Ricordando che $U(t_0, t_0) = \mathbb{I} = U^\dagger(t_0, t_0)$, si ha che

$$U(t, t_0)U^\dagger(t, t_0) = \mathbb{I} \quad \forall t$$

Se $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$, la forma esplicita di $U(t, t_0)$ è facile da ricavare:

$$\frac{dU}{dt} = -\frac{i}{\hbar} H U \leftrightarrow \int_{U(t_0, t_0)}^{U(t_0, t)} \frac{dU}{U} = -\frac{i}{\hbar} H \int_{t_0}^t d\tau \leftrightarrow U(t, t_0) = \exp \left\{ -\frac{i}{\hbar} H(t - t_0) \right\}$$

Dove, dato un operatore A ,

$$e^A := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} A^n$$

Ci sono due schemi interpretativi dell'evoluzione temporale del valor medio di un'osservabile che però **non** portano a conseguenze fisiche diverse, in quanto l'unica parte della teoria che ha significato fisico è la previsione dei valori medi.

7.1 Schema di Schrödinger

Nello schema di Schrödinger si utilizza il concetto di *stato dipendente dal tempo*

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &:= U(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle \\ \rho(t) &= \sum_k \omega_k |\psi_k(t)\rangle \langle \psi_k(t)| = U(t, t_0) \rho(t_0) U^\dagger(t, t_0) \end{aligned}$$

Poiché $UU^\dagger = \mathbb{I}$, $\langle \psi(t) | \psi(t) \rangle = \langle \psi(t_0) | \psi(t_0) \rangle$.

Gli autostati degli operatori *non* evolvono nel tempo, ma i coefficienti di Fourier sì:

$$A |a_i\rangle = a_i |a_i\rangle, \quad |\psi(t)\rangle = \sum_i |a_i\rangle \langle a_i | \psi(t) \rangle = \sum_i c_i(t) |a_i\rangle$$

7.2 Schema di Heisenberg

Nello schema di Heisenberg, invece, l'evoluzione temporale è associata alle osservabili

$$A(t) := U^\dagger(t, t_0) A(t_0) U(t, t_0)$$

Gli autostati al contrario di prima evolvono nel tempo

$$A(t_0) |a(t_0)\rangle = a |a(t_0)\rangle \rightarrow U^\dagger A(t_0) U U^\dagger |a(t_0)\rangle = a U^\dagger |a(t_0)\rangle \rightarrow A(t) |a(t)\rangle = a |a(t)\rangle$$

dove si è definito $|a(t)\rangle := U^\dagger(t, t_0) |a(t_0)\rangle$.

7.3 Costanti del moto

Similmente alla meccanica Hamiltoniana, dove se $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$,

$$\{H, F\}_{PB} = 0 \leftrightarrow \frac{dF}{dt} = 0$$

anche in meccanica quantistica vale che, se H è indipendente dal tempo,

$$\langle \psi | e^{\frac{i}{\hbar}H(t-t_0)} F e^{-\frac{i}{\hbar}H(t-t_0)} | \psi \rangle = \langle \psi | F U^\dagger U | \psi \rangle = \langle \psi | F | \psi \rangle \leftrightarrow \frac{d}{dt} \langle F \rangle_\psi(t) = 0$$

dove si è utilizzato il fatto che

$$[U, F] = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{i}{\hbar}(t-t_0) \right)^n \frac{1}{n!} [H^n, F] = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\left(-\frac{i}{\hbar}(t-t_0) \right)^n \frac{1}{n!} \left(\sum_{k=1}^{n-1} a_{k,n} H^{n-k-1} [H, F] H^k \right) \right] = 0$$

se e solo se $[H, F] = 0$.

Oss. Gli autostati dell'energia conservano tutte le osservabili: se H è indipendente dal tempo, per gli autostati dell'energia si ha

$$H | \psi \rangle = E | \psi \rangle \rightarrow | \psi(t) \rangle = U(t, t_0) | \psi \rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}E(t-t_0)} | \psi \rangle \rightarrow \langle \psi | U^\dagger F U | \psi \rangle = \langle \psi | F | \psi \rangle \quad \forall t, F$$

Formalismo dei *Path Integral*

8 Introduzione e prime definizioni

Questa seconda parte del corso è dedicata al formalismo dei *path integral* di Feynman: si tratta di un framework equivalente a quello considerato finora, ma che ha i vantaggi di essere Lagrangiano, rendendo più semplice un'estensione relativistica, e di essere facilmente estendibile a una teoria con infiniti gradi di libertà, cioè a una teoria di campo.

Questa formulazione fu proposta da Feynman⁷ nel 1948, sulla base di alcune osservazioni di Dirac.

L'idea fondante è trovare la probabilità di transizione di una funzione d'onda ψ tra due punti dello spazio delle configurazioni e tra due tempi $(q_a, t_a) \rightarrow (q_b, t_b)$ ⁸: in meccanica classica questo è semplice, in quanto esiste un'unica curva di moto $q(t)$ che collega i due punti, mentre in meccanica quantistica, come si vedrà in seguito, è necessario considerare *tutti* i possibili cammini che collegano i due punti e integrare al variare di essi con diversi pesi.

8.1 Il propagatore

Il concetto fondamentale di questa formulazione è quello di **propagatore** (o kernel), che è strettamente legato all'operatore evoluzione temporale $U(t_b, t_a)$.

Si consideri un sistema a f gradi di libertà con hamiltoniana H e uno stato $|\psi(t_a)\rangle$: lo stato evoluto a un generico tempo $t_b > t_a$ è

$$|\psi(t_b)\rangle = U(t_b, t_a) |\psi(t_a)\rangle$$

con $U(t_b, t_a)$ che soddisfa

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t_b} U = H_b U \leftrightarrow S_b U = 0$$

dove $S_b := i\hbar \frac{\partial}{\partial t_b} - H_b$ è l'operatore differenziale di Schrödinger.

Scrivendo lo stato evoluto nello spazio delle posizioni, si ottiene

$$\langle q_b | \psi(t_b) \rangle := \psi(q_b, t_b) = \langle q_b | U(t_b, t_a) | \psi(t_a) \rangle$$

sfruttando la completezza delle posizioni $|q\rangle$ si ottiene

$$\psi(q_b, t_b) = \int d^f q \langle q_b | U(t_b, t_a) | q \rangle \langle q | \psi(t_a) \rangle = \int d^f q \langle q_b | U(t_b, t_a) | q \rangle \psi(q_a, t_a) \quad (8.1)$$

Def. Il propagatore di Schrödinger tra (q_a, t_a) e (q_b, t_b) è

$$K(q_b, t_b, q_a, t_a) = K(b, a) := \langle q_b | U(t_b, t_a) | q_a \rangle$$

cioè l'elemento di matrice di $U(t_b, t_a)$ corrispondente alle posizioni q_a e q_b .

Oss. Il valore di $\psi(q_b, t_b)$ dipende dal valore di $\psi(q, t_a)$ in *tutto* lo spazio fisico: il fronte d'onda a un tempo $t_b > t_a$ dipende da tutto il fronte d'onda precedente, convoluto con una funzione che ne descrive l'evoluzione temporale; questo è molto simile al principio di Huygens-Fresnel per la descrizione della propagazione delle onde nel tempo.

⁷Articolo originale [link]

⁸In questa parte degli appunti si denoteranno con q, p l'insieme di tutte le coordinate canoniche del sistema, sono da intendersi come q^μ, p^μ

Oss. Il propagatore $K(b, a)$ soddisfa l'equazione di Schrödinger, infatti

$$S_b U = 0 \leftrightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t_b} \langle q_b | U | q_a \rangle - \langle q_b | H_b U | q_a \rangle = 0$$

inserendo la completezza delle posizioni nel secondo addendo si ottiene

$$\langle q_b | H_b U | q_a \rangle = \int d^f q \langle q_b | H | q \rangle \langle q | U | q_a \rangle = \int d^f q H(q, t) \delta^f(q - q_b) \langle q | U | q_a \rangle = H_b K(b, a)$$

e si trova che

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t_b} K(b, a) - H_b K(b, a) = 0 \leftrightarrow S_b K(b, a) = 0$$

Si definisce inoltre *propagatore ritardato* la funzione $G(b, a) = K(b, a)\Theta(t_b - t_a)$, necessaria in quanto il propagatore non è ben definito per $t_b < t_a$.

Ripasso: funzioni di Green

Dato un operatore differenziale L_X , la sua funzione di Green è una funzione $G(x)$ tale che

$$L_X G(x) = \delta(x)$$

La proprietà fondamentale di $G(x)$ è

$$L_X f(x) = g(x) \leftrightarrow f(x) = (G * g)(x)$$

dove $*$ è la convoluzione tra funzioni

$$(G * g)(x) := \int_{-\infty}^{\infty} dy G(y) g(x - y)$$

Si può dimostrare che $G(b, a)$ è la funzione di Green dell'operatore S_b :

$$\begin{aligned} S_b G &= S_b K(b, a)\Theta(t_b - t_a) = i\hbar \frac{\partial K}{\partial t_b} \Theta + i\hbar K \frac{\partial \Theta}{\partial t_b} - H_b K \Theta = \\ &= H_b K \Theta + i\hbar K(b, a) \delta(t_b - t_a) - H_b K \Theta = i\hbar \langle q_b | U(t_b, t_b) | q_a \rangle \delta(t_b - t_a) = \\ &= i\hbar \delta^f(q_b - q_a) \delta(t_b - t_a) \end{aligned}$$

Oss. Il significato fisico del propagatore può essere visto considerando una particella confinata in un punto q al tempo $t = 0$: la funzione d'onda evoluta nel punto x al tempo $t > 0$ sarà

$$\psi(x, t) = \int d^f \bar{q} K(x, t, \bar{q}, 0) \delta^f(\bar{q} - q) = K(x, t, q, 0)$$

Proprietà Il propagatore ha una importante proprietà che risulterà fondamentale in seguito. Il propagatore di un hamiltoniana indipendente dal tempo tra due posizioni q_a , q_b può essere scritto in termini di quelli tra q_a , q_1 e q_1 , q_b , tali che $t_a < t_1 < t_b$:

$$K(b, a) = \langle q_b | \exp \left\{ \frac{-i}{\hbar} H(t_b - t_1 + t_1 - t_a) \right\} | q_a \rangle = \int dq_c^f \langle q_b | U(t_b, t_1) | q_1 \rangle \langle q_1 | U(t_1, t_a) | q_a \rangle$$

Iterando per N istanti di tempo t_i tali che $t_a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = t_b$ si ottiene che

$$K(b, a) = \int \prod_{i=1}^{N-1} dq_i \prod_{j=0}^N \langle q_{j+1} | U(t_{j+1}, t_j) | q_j \rangle \quad (8.2)$$

che significa che il propagatore dipende, equivalentemente a prima, da tutti i possibili cammini tra tutti i possibili punti intermedi tra q_a e q_b .

8.2 Primo legame con l'azione

Prima di ricavare esplicitamente il propagatore di una particella libera, è comodo fare due piccoli conti.

Si supponga, senza perdere di generalità, che il propagatore associato a una hamiltoniana della forma $H = T + V$ sia della forma

$$K(x, t, q, 0) = e^{\frac{i}{\hbar} S(x, t, q, 0)}$$

con S funzione complessa: si impone l'equazione di Schrödinger per K

$$i\hbar \frac{\partial K}{\partial t} = -\frac{\partial S}{\partial t} e^{\frac{i}{\hbar} S}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 K}{\partial x^2} + VK = e^{\frac{i}{\hbar} S} \left[-\frac{1}{\hbar^2} \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)^2 + \frac{i}{\hbar} \frac{\partial^2 S}{\partial t^2} + V \right]$$

e si ottiene

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)^2 - \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 S}{\partial x^2} + V(x) = -\frac{\partial S}{\partial t}$$

che, per $\hbar \rightarrow 0$, è l'**equazione di Hamilton-Jacobi** per l'azione classica S .

Questa relazione inizia a far intuire che esiste un legame profondo tra l'azione S e il propagatore.

Il secondo conto è ricavare il valore dell'azione classica S sulla curva di moto della particella libera: la lagrangiana è $L = \frac{1}{2} m \dot{q}^2$, le equazioni del moto sono $m\ddot{q} = 0$ e le curve di moto sono $q(t) = vt + q_0$. Dati due istanti di tempo $t_2 > t_1$, l'azione è

$$S_{cl} = \int_{t_1}^{t_2} dt L(q, \dot{q}) = \int_{t_1}^{t_2} dt \frac{1}{2} m \dot{q}^2 = \frac{1}{2} m v^2 (t_2 - t_1) = \frac{m(q_2 - q_1)^2}{2(t_2 - t_1)} \quad (8.3)$$

dove $q_i = q(t_i)$ e ovviamente $v = \frac{q_2 - q_1}{t_2 - t_1}$.

8.3 Il propagatore della particella libera 1D

L'hamiltoniana del problema è $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m}$: gli autostati di $\hat{p}$ sono anche autostati di H , dunque si ha

$$\hat{H} |p\rangle = \frac{p^2}{2m} |p\rangle$$

Si consideri ora il propagatore tra le posizioni q', q e i tempi $t' > t$:

$$K(q', t', q, t) = \langle q' | U(t', t) | q \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dp \langle q' | p \rangle \langle p | e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t' - t)} | q \rangle =$$

$$= \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} dp \exp \left\{ -\frac{i}{\hbar} \frac{p^2}{2m} (t' - t) \right\} e^{\frac{i}{\hbar} p(q' - q)}$$

questo integrale non converge nel senso ordinario, quindi è necessario un trucchetto per risolverlo, detto *rotazione di Wick*: si definisce il tempo euclideo⁹ $\tau := it$ e, per comodità, si definiscono $\Delta\tau = (\tau' - \tau)$, $\Delta q = (q' - q)$, ottenendo

$$K = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} dp \exp \left\{ \frac{-1}{\hbar} \left(\frac{p^2}{2m} \Delta\tau - ip\Delta q \right) \right\}$$

Si procede ora con il calcolo dell'integrale di tipo gaussiano completando il quadrato

$$p^2 \frac{\Delta\tau}{2m} - ip\Delta q - \frac{m}{2} \frac{\Delta q^2}{\Delta\tau} + \frac{m}{2} \frac{\Delta q^2}{\Delta\tau} = \left(p \sqrt{\frac{\Delta\tau}{2m}} - \frac{i\Delta q}{2} \sqrt{\frac{2m}{\Delta\tau}} \right)^2 + \frac{m}{2} \frac{\Delta q^2}{\Delta\tau}$$

ed effettuando il cambio di variabile $x = p \sqrt{\frac{\Delta\tau}{2m}} - \frac{i\Delta q}{2} \sqrt{\frac{2m}{\Delta\tau}} \rightarrow dp = \sqrt{\frac{2m}{\Delta\tau}} dx$:

$$K = \frac{1}{2\pi\hbar} \sqrt{\frac{2m}{\Delta\tau}} \exp \left\{ -\frac{1}{\hbar} \frac{m}{2} \frac{\Delta q^2}{\Delta\tau} \right\} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-\frac{x^2}{\hbar}} = \sqrt{\frac{m}{2\pi\hbar\Delta\tau}} \exp \left\{ -\frac{1}{\hbar} \frac{m}{2} \frac{\Delta q^2}{\Delta\tau} \right\}$$

Riconvertendo dal tempo euclideo a quello ordinario si ottiene che

$$K(q', t', q, t) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar (t' - t)}} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \frac{m}{2} \frac{(q' - q)^2}{t' - t} \right\} = \frac{1}{\mathcal{N}} e^{\frac{i}{\hbar} S_{cl}[q]} \quad (8.4)$$

denotando con $\mathcal{N} = \sqrt{\frac{2\pi i \hbar (t' - t)}{m}}$ e con $S_{cl}[q]$ il valore dell'azione sulla "curva di moto" che congiunge q e q' .

È ora chiaro il legame con l'azione classica (8.3) e la funzione d'onda evoluta è data da (8.1):

$$\psi(q', t') = \frac{1}{\mathcal{N}} \int dq \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} S_{cl}[q] \right\} \psi(q, t)$$

cioè un integrale che somma i valori della funzione d'onda iniziale su tutto lo spazio pesati con il valore dell'azione classica calcolata sul cammino che congiunge q a q' .

Nella sezione successiva si vedrà che si può applicare un ragionamento simile per Hamiltoniane con potenziale.

⁹Si chiama così perché in relatività speciale e generale rende la metrica di Minkowski euclidea $-dt^2 + dx^2 \rightarrow d\tau^2 + dx^2$

9 Il propagatore di un'Hamiltoniana con potenziale

Si consideri ora un sistema fisico a d gradi di libertà con Hamiltoniana H del tipo

$$H = \sum_{\alpha=1}^d \frac{p_{\alpha}^2}{2m} + V(q_{\alpha})$$

Il propagatore tra (q, t) e (q', t') è

$$K(q', t', q, t) = \langle q' | U(t', t) | q \rangle = \langle q' | \exp \left\{ \frac{-i}{\hbar} H(t' - t) \right\} | q \rangle$$

come per la particella libera, si tenta di aggiungere la relazione di completezza di $|p\rangle$

$$K(q', t', q, t) = \int d^d p \langle q' | p \rangle \langle p | \exp \left\{ \frac{-i}{\hbar} H(t' - t) \right\} | q \rangle$$

A questo punto però si presenta un problema non indifferente: l'elemento di matrice $\langle p | U | q \rangle$ non è facilmente determinabile come si è fatto in precedenza, perché i termini non lineari dell'espansione dell'esponenziale non sono riordinabili (essendo infiniti).

Bisogna dunque procedere diversamente, si divide l'intervallo di tempo $t' - t$ in N intervalli di lunghezza Δt e si sfrutta la proprietà (8.2) per scrivere il propagatore

$$K = \int \prod_{i=1}^{N-1} d^d q_i \prod_{j=0}^N \langle q_{j+1} | U(t_{j+1}, t_j) | q_j \rangle$$

con $t_0 = t < t_1 < \dots < t_N = t'$, $q_0 = q$, $q_N = q'$ e $t_{j+1} - t_j = \Delta t$.

Se $\Delta t \rightarrow 0$, si può linearizzare l'espressione di $U(t_{j+1}, t_j)$ e procedere come per la particella libera:

$$\begin{aligned} \langle q_{j+1} | U(t_{j+1}, t_j) | q_j \rangle &\sim \langle q_{j+1} | \mathbb{I} - \frac{i}{\hbar} \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{q}) \right) \Delta t | q_j \rangle = \\ &= \int d^d p_j \langle q_{j+1} | p_j \rangle \langle p_j | \mathbb{I} - \frac{i}{\hbar} \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{q}) \right) \Delta t | q_j \rangle = \\ &= \int d^d p_j \langle q_{j+1} | p_j \rangle \left[1 - \frac{i}{\hbar} \Delta t \left(\frac{p_j^2}{2m} + V(q_j) \right) \right] \langle p_j | q_j \rangle = \\ &= \int \frac{d^d p_j}{(2\pi\hbar)^d} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \Delta t \left(\frac{p_j(q_{j+1} - q_j)}{\Delta t} - H(p_j, q_j) \right) \right\} \end{aligned}$$

dove si è ritornati alla forma esponenziale nell'ultimo passaggio.

Reinserendo questa espressione nel calcolo del propagatore, si ottiene infine

$$\boxed{K(q', t', q, t) = \int \prod_{j=1}^{N-1} d^d q_j \prod_{k=0}^{N-1} \frac{d^d p_k}{(2\pi\hbar)^d} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \sum_{i=0}^{N-1} \Delta t \left(\frac{p_i(q_{i+1} - q_i)}{\Delta t} - H(p_i, q_i) \right) \right\}} \quad (9.1)$$

Oss. Questa espressione discretizzata per K è un integrale su tutti i possibili punti intermedi tra lo stato iniziale e finale nello *spazio delle fasi* del sistema.

Si denota ora $\dot{q}_i := \frac{q_{i+1} - q_i}{\Delta t}$ e si considera il limite continuo $n \rightarrow \infty$: l'argomento dell'esponenziale è una somma alla Riemann, che diventa un integrale sul tempo, mentre l'integrale sui punti intermedi diventa l'integrale su tutti i possibili *cammini* nello spazio delle fasi e la sua misura di integrazione si denota con $\mathcal{D}q\mathcal{D}p$

$$K(q', t', q, t) = \int \mathcal{D}q\mathcal{D}p \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \int_t^{t'} dt (p\dot{q} - H) \right\}$$

Questa espressione può essere ulteriormente semplificata per Hamiltoniane della forma qui considerata: l'argomento della sommatoria nell'esponenziale in (9.2) diventa

$$p_i \dot{q}_i - \frac{p_i^2}{2m} - V(q_i)$$

si completa il quadrato

$$p_i \dot{q}_i - \frac{p_i^2}{2m} = -\frac{1}{2m} (p_i - m\dot{q}_i)^2 + \frac{m}{2} \dot{q}_i^2 := -\frac{\bar{p}_i^2}{2m} + \frac{m}{2} \dot{q}_i^2$$

e la parte dipendente dai p_i di (9.2) diventa

$$I = \int \prod_{k=0}^{N-1} \frac{d^d \bar{p}_k}{(2\pi\hbar)^d} \exp \left\{ \sum_{i=0}^{N-1} \frac{-i}{2m\hbar} \bar{p}_i^2 \Delta t \right\} = \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi\hbar} \exp \left\{ \frac{-i}{2m\hbar} p^2 \Delta t \right\} \right)^{Nd}$$

che è uno degli integrali calcolati per la particella libera e vale

$$I = \left(\frac{m}{2\pi i \hbar \Delta t} \right)^{Nd/2} = \left(\frac{1}{\mathcal{N}} \right)^{Nd}$$

Inserendo questo risultato nell'espressione di K si trova

$$\boxed{K(q', t', q, t) = \frac{1}{\mathcal{N}^d} \int \prod_{i=1}^{N-1} \frac{d^d q_i}{\mathcal{N}^d} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \sum_{i=0}^{N-1} \Delta t \left(\frac{1}{2} m \dot{q}_i^2 - V(q_i) \right) \right\}} \quad (9.2)$$

Passando al continuo e ignorando le normalizzazioni (che, come si vedrà, sarà facile fissare caso per caso), si trova l'espressione del propagatore nel formalismo dei *path integral*

$$\boxed{K(q', t', q, t) = \int \mathcal{D}q \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \int_t^{t'} dt L(q(t), \dot{q}(t)) \right\} = \int \mathcal{D}q \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} S[q] \right\}} \quad (9.3)$$

Oss. Questa definizione di K ne evidenzia esattamente il legame con l'azione e i cammini: il valore di K è l'integrale su tutti i possibili cammini che uniscono q' e q , pesati con *il valore dell'azione sul cammino*.

9.1 Equivalenza con l'equazione di Schrödinger

La potenza di questa formalizzazione della meccanica quantistica è anche nel fatto che essa è equivalente all'equazione di Schrödinger ed è postulato alternativo a essa.

Si consideri il propagatore tra due istanti di tempo distanti $\epsilon \rightarrow 0$ tra loro: poiché non è necessario suddividere l'intervallo in parti infinitesime, esso vale

$$K(x, \epsilon, y, 0) = \sqrt{\frac{m}{2\pi\hbar\epsilon}} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \left(\frac{1}{2} m \dot{y}^2 - V(y) \right) \epsilon \right\}$$

per $\epsilon \rightarrow 0$, $V(y) \sim V(x)$ e $\dot{y} \sim \frac{x-y}{\epsilon}$, dunque si ha

$$K = \sqrt{\frac{m}{2\pi\hbar\epsilon}} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \left(\frac{1}{2} m \frac{(x-y)^2}{\epsilon} - V(x)\epsilon \right) \right\}$$

Dunque, applicando (8.1)

$$\psi(x, \epsilon) = \sqrt{\frac{m}{2\pi\hbar\epsilon}} e^{-\frac{i}{\hbar} V(x)\epsilon} \int_{-\infty}^{\infty} dy \exp \left\{ \frac{im}{2\hbar} \frac{(x-y)^2}{\epsilon} \right\} \psi(y, 0)$$

ponendo $z = \sqrt{\frac{m}{\hbar}}(x-y) \rightarrow dz = -\sqrt{\frac{m}{\hbar}} dy$ e poi $\alpha = i\epsilon$ (rotazione di Wick), si ottiene

$$\begin{aligned} \psi(x, \epsilon) &= \sqrt{\frac{1}{2\pi i \epsilon}} e^{-\frac{i}{\hbar} V(x)\epsilon} \int_{-\infty}^{\infty} dz e^{\frac{i}{2\epsilon} z^2} \psi \left(x - \sqrt{\frac{\hbar}{m}} z, 0 \right) = \\ &= \sqrt{\frac{1}{2\pi \alpha}} e^{-\frac{\alpha}{\hbar} V(x)} \int_{-\infty}^{\infty} dz e^{-\frac{z^2}{2\alpha}} \left(\psi(x, 0) + \frac{\hbar}{2m} z^2 \psi''(x, 0) + O(z^3) \right) \end{aligned}$$

si noti che l'espansione in potenze di z è dovuta al fatto che $z \rightarrow 0$ se $\epsilon \rightarrow 0$.

Integrando esplicitamente e riscrivendo in termini di ϵ si ottiene

$$\psi(x, \epsilon) = e^{-\frac{i}{\hbar} V(x)\epsilon} \left(\psi(x, 0) + \frac{i\epsilon\hbar}{2m} \psi''(x, 0) \right)$$

Sviluppando sia il lato sinistro sia l'esponenziale a destra in potenze di ϵ si trova

$$\begin{aligned} \psi(x, 0) + \epsilon \left. \frac{\partial \psi}{\partial t} \right|_{t=0} &= \left(1 - \frac{i\epsilon}{\hbar} V(x) + O(\epsilon^2) \right) \left(\psi(x, 0) + \frac{i\epsilon\hbar}{2m} \psi''(x, 0) + O(\epsilon^2) \right) \\ \psi(x, 0) + \epsilon \left. \frac{\partial \psi}{\partial t} \right|_{t=0} &= \psi(x, 0) - \frac{i}{\hbar} \epsilon \left(V(x) \psi(x, 0) - \frac{\hbar^2}{2m} \psi''(x, 0) \right) + O(\epsilon^2) \end{aligned}$$

eguagliando i termini di prim'ordine in ϵ si ottiene infine

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, 0) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x, 0)$$

10 Limite semiclassico

Come si può conciliare il formalismo dei *Path Integral* con l'unicità del cammino classico?

Se si considera il semplice caso 1D, il propagatore è un integrale su tutte le curve di moto che uniscono il punto iniziale e finale, pesate con una fase $\exp \left\{ \frac{i}{\hbar} S[q] \right\}$: intuitivamente, nel limite classico $S[q] \gg \hbar$, una deformazione a estremi fissi di una qualunque curva di moto $q(t) \rightarrow q'(t) = q(t) + \delta q(t)$ non cambia in maniera sostanziale l'azione, ma modifica parecchio la fase nel calcolo del propagatore

$$S[q'] \approx S[q], \text{ ma } \frac{S[q']}{\hbar} \gg \frac{S[q]}{\hbar}$$

dunque la fase cambia violentemente al variare di $q(t)$ e, per il lemma di Riemann, tutti i contributi da cammini "abbastanza lontani" da quello classico si cancellano tra di loro.

Nel caso in cui però si deformi il cammino classico $q_{cl}(t)$, su cui vale $\delta S = 0$, esiste un suo intorno in cui i contributi non si annullano; precisamente si cerca l'ordine di grandezza di δq tale che

$$\frac{S[q_{cl}]}{\hbar} \approx \frac{S[q_{cl} + \delta q(t)]}{\hbar}$$

sviluppando il secondo membro in potenze di $\delta q(t)$ si trova

$$\frac{S[q']}{\hbar} = \frac{S[q_{cl}] + \frac{1}{2} S''[q_{cl}] \delta^2 q + O(\delta^3 q)}{\hbar}$$

che approssima bene il primo membro quando

$$\frac{\delta^2 q}{\hbar} \ll 1 \Leftrightarrow \delta q \sim \sqrt{\hbar}$$

si ha dunque che, al primo ordine di approssimazione, i cammini che danno un contributo non nullo sono in un "intorno di raggio $\sqrt{\hbar}$ " rispetto a q_{cl} .

Per formalizzare questa approssimazione, si considera lo sviluppo asintotico di (9.3) in potenze di $\hbar \rightarrow 0$.

Oss. A rigor di precisione, non ha senso considerare il limite di una costante fisica: far tendere $\hbar$ a 0 è un modo formale di considerare azioni $S \gg \hbar$.

10.1 Metodo discreto

Per sviluppare in potenze di $\hbar$ si considera dapprima l'espressione discretizzata (9.2) per K (per semplicità si considera anche $d = 1$)

$$K(q', t', q, t) = \frac{1}{\mathcal{N}} \int \prod_{i=1}^{N-1} \frac{dq_i}{\mathcal{N}} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \sum_{i=0}^{N-1} \Delta t L(q_i, q_{i+1}) \right\} \Big|_{t_i}$$

e, posto $L = \frac{m}{2} \left(\frac{q_{i+1} - q_i}{\Delta t} \right)^2 - V(q_i)$, si cerca la successione $\{q_i\}$ che rende stazionaria l'azione:

$$\begin{aligned} \frac{\partial S}{\partial q_i} &= \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{m}{2} \left(\frac{q_{i+1} - q_i}{\Delta t} \right)^2 - V(q_i) \right) + \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{m}{2} \left(\frac{q_i - q_{i-1}}{\Delta t} \right)^2 \right) = \\ &= m \left(-\frac{q_{i+1} - q_i}{\Delta t^2} + \frac{q_i - q_{i-1}}{\Delta t^2} \right) - \frac{\partial V}{\partial q_i} = 0 = \frac{m}{\Delta t} (-\dot{q}_i + \dot{q}_{i-1}) \end{aligned}$$

Si identificano le derivate discrete

$$\frac{q_{i+1} - q_i}{\Delta t} = \dot{q}_i \quad \frac{\dot{q}_i - \dot{q}_{i-1}}{\Delta t} = \ddot{q}_i$$

e si trova

$$\frac{\partial S}{\partial q_i} = 0 \leftrightarrow m\ddot{q}_i + \frac{\partial V}{\partial q_i} = 0$$

che ha la forma dell'equazione di Newton della meccanica classica.

È sistema di N O.D.E. con soluzione $q_{0,i}$, che è la successione di $\{q_i\}$ corrispondente al cammino classico: si considerino ora le deformazioni ω_i tali che

$$q_i = q_{0,i} + \omega_i, \text{ con } \omega_0 = \omega_N = 0$$

l'azione sul cammino deformato vale

$$\begin{aligned} S[q_i] &= S[q_{i,0} + \omega_i] = S[q_{i,0}] + \left. \frac{\partial S}{\partial q_k} \right|_{q_{0,i}} \omega_i + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 S}{\partial q_l \partial q_m} \right|_{q_{0,i}} \omega_l \omega_m + O(\omega^3) = \\ &= S_{cl} + 0 + X_{lm} \omega_l \omega_m + O(\omega^3) = S_{cl} + S_2 + S_{\geq 3} \end{aligned}$$

dove si è indicata con X_{lm} la forma quadratica associata all'Hessiana di S valutata sul cammino classico e con S_2 il risultato di tale forma applicata alla deformazione.

Risostituendo nell'integrale con il cambio di variabile $q_i = q_{0,i} + \omega_i \rightarrow dq_i = d\omega_i$ si ha

$$K = \frac{1}{\mathcal{N}} \int \prod_{k=1}^{N-1} \frac{d\omega_k}{\mathcal{N}} e^{\frac{i}{\hbar} S_{cl}} e^{\frac{i}{\hbar} S_2} e^{\frac{i}{\hbar} S_{\geq 3}} = \frac{1}{\mathcal{N}} e^{\frac{i}{\hbar} S_{cl}} \int \prod_{k=1}^{N-1} \frac{d\omega_k}{\mathcal{N}} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \omega_i X_{ij} \omega_j \right\} \left(1 + \frac{i}{\hbar} S_{\geq 3} \right)$$

Oss. Per il teorema di Schwarz la forma X_{ij} è simmetrica e dunque esiste una matrice unitaria P tale che $X = P D P^T$ con D diagonale: si può dunque scrivere che $\omega_i X_{ij} \omega_j = \omega^T P D P^T \omega := x^T D x = \lambda_i x_i^2$ con il cambio di variabile $P^T x = \omega$ (come vettori), che non produce cambiamenti nella misura di integrazione, in quanto $|\det(J)| = |\det(P^T)| = 1$; si ha inoltre che $\det(X) = \det(D)$.

L'osservazione precedente ci permette di considerare solo i casi in cui $S_2 = X_k \omega_k^2$, senza perdere di generalità: in questo particolare caso l'integrale è fattorizzabile come il prodotto di N integrali

$$K = \frac{1}{\mathcal{N}} \prod_{k=1}^{N-1} \frac{A_k}{\mathcal{N}}, \quad A_k = \int_{-\infty}^{\infty} d\omega_k \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} X_k \omega_k^2 \right\} \left(1 + \frac{i}{\hbar} S_{\geq 3} \right)$$

Su ciascuno degli A_k si applica il metodo della fase stazionaria per ottenerne lo sviluppo asintotico in potenze di $\hbar$: il termine dominante si trova trascurando $\frac{i}{\hbar} S_{\geq 3}$ e con il cambio di variabile $\omega_k = \rho_k e^{i\frac{\pi}{4}}$

$$A_k \underset{\hbar \rightarrow 0}{\sim} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega_k \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} X_k \omega_k^2 \right\} = e^{i\frac{\pi}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} d\rho_k \exp \left\{ -\rho_k^2 \frac{X_k}{\hbar} \right\} = \sqrt{\frac{i\hbar\pi}{X_k}}$$

da cui si trova l'espressione per K

$$K = \frac{(i\pi\hbar)^{\frac{N-1}{2}}}{\mathcal{N}^N} e^{\frac{i}{\hbar} S_{cl}} \prod_{k=1}^{N-1} \sqrt{\frac{1}{X_k}}$$

poiché X è diagonale, $\prod X_k = \det(X)$ e poiché, come già detto, il determinante è invariante per cambio di coordinate unitario, questo risultato è generale

$$\boxed{K(q', t', q, t) \underset{\hbar \rightarrow 0}{\sim} \mathcal{M} e^{\frac{i}{\hbar} S_{cl}} (\det(X))^{-\frac{1}{2}} (1 + O(\hbar))} \quad (10.1)$$

Dove $\mathcal{M}$ è una costante di normalizzazione.

Oss.1 Nel caso di Lagrangiane del tipo $L = T - V$, i termini di $S_{\geq 3}$ dipendono solamente dal potenziale V .

Oss.2 Per continuare l'approssimazione a ordini superiori di $\hbar$ basta procedere nel calcolo di A_k considerando l'ordine ω^3 ; tali ordini, come è noto dalla teoria degli sviluppi asintotici, producono termini del tipo $A_k \underset{\hbar \rightarrow 0}{\sim} \sqrt{\frac{i\hbar\pi}{X_k}} (1 + \alpha\hbar + O(\hbar^2))$

10.2 Metodo del *Path Integral*

Si mostra ora come sia possibile giungere allo stesso risultato utilizzando il formalismo degli integrali di cammino, cioè partendo da (9.3): si ricavano le curve di moto classiche dal principio di minima azione

$$\begin{aligned} S[q] &= \int_{t_a}^{t_b} dt L(q, \dot{q}), \quad \delta S = 0 \leftrightarrow \int_{t_a}^{t_b} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} + \frac{\partial L}{\partial q} \delta q = \\ &= \frac{\partial L}{\partial q} \delta q \Big|_{t_a}^{t_b} - \int_{t_a}^{t_b} dt \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} \right) \delta q = 0 \leftrightarrow \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0 \end{aligned}$$

che sono le equazioni di Eulero-Lagrange, con soluzione $q_0(t)$. Si introduce ora una perturbazione a estremi fissi $\omega(t)$ e si calcola l'azione su $q(t) = q_0(t) + \omega(t)$ espandendo la lagrangiana in potenze di ω :

$$L(q, \dot{q}) = L(q_0, \dot{q}_0) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^2} \dot{\omega}^2 + \frac{\partial^2 L}{\partial q \partial \dot{q}} \omega \dot{\omega} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 L}{\partial q^2} \omega^2 + O(\omega^3)$$

da cui si trova che

$$\begin{aligned} S[q] &= S[q_0] + \frac{1}{2} \int_{t_a}^{t_b} dt \left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^2} \dot{\omega}^2 + 2 \frac{\partial^2 L}{\partial q \partial \dot{q}} \omega \dot{\omega} + \frac{\partial^2 L}{\partial q^2} \omega^2 \right) + S_{\geq 3} = \\ &= S_{cl} + \frac{1}{2} \int_{t_a}^{t_b} dt (\dot{\omega} A \dot{\omega} + 2 \omega B \dot{\omega} + \omega C \omega) + S_{\geq 3} \end{aligned}$$

usando l'identità $\dot{\omega} A \dot{\omega} = \frac{d}{dt} (\omega A \dot{\omega}) - \omega \dot{A} \dot{\omega} - \omega A \ddot{\omega}$ e integrando per parti si ottiene

$$S[q] = S_{cl} + \frac{1}{2} \int_{t_a}^{t_b} dt \omega D \omega + S_{\geq 3} := S_{cl} + S_2[\omega] + S_{\geq 3}$$

dove l'operatore D è pari a $D = -\dot{A} \frac{d}{dt} - \omega A \frac{d^2}{dt^2} + 2B \frac{d}{dt} + C$.

Sostituendo infine in (9.3), si trova

$$K(q_b, t_b, q_a, t_a) = \int \mathcal{D}q \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} S[q] \right\} = e^{\frac{i}{\hbar} S_{cl}} \int \mathcal{D}\omega \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \int_{t_a}^{t_b} dt \omega D \omega \right\} \left(1 + \frac{i}{\hbar} S_{\geq 3} \right)$$

Trascurando i termini di ordine superiore si trova, come in precedenza

$$\boxed{K(q_b, t_b, q_a, t_a) \underset{\hbar \rightarrow 0}{\sim} e^{\frac{i}{\hbar} S_{cl}} (\det(D))^{-\frac{1}{2}} (1 + O(\hbar))}$$

10.3 Esempio: l'effetto Bohm-Aharonov




Fig. 10.1: Setup sperimentale

Un interessante esempio di problema facilmente risolubile con i *path integral* è una variazione del famoso esperimento delle due fenditure: si costringe una particella carica a passare attraverso due fenditure macroscopicamente distanti e, come è noto, si osserva su uno schermo la figura di interferenza.

Si consideri ora un campo magnetico localizzato tra le fenditure, di modo che il suo effetto sia praticamente nullo nella zona dei cammini classici della particella, come in figura 10.1: si osserva sperimentalmente che la figura di interferenza cambia al variare del campo magnetico B .

Vista la distanza tra le fenditure, anche nel limite semiclassico il campo non "tocca" la funzione d'onda della particella, ma l'evidenza sperimentale afferma diversamente.

Per comprendere il motivo di questo effetto non locale del campo magnetico è necessario fare un po' di conti.

Si consideri, come in figura, una particella di carica q che parte dal punto $x_a \in \mathbb{R}^3$ al tempo t_a e raggiunge il punto x_b al tempo t_b : per semplicità si pone

$$\psi(x_a, t_a) = \delta^3(x - x_a) \rightarrow K(x_b, t_b, x_a, t_a) = \psi(x_b, t_b)$$

Il campo magnetico B è costante, quindi si sceglie il gauge $\varphi = 0$, $A(x, t) = A(x)$ e la lagrangiana del sistema è

$$L(x, \dot{x}, A) = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{q}{c}\dot{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{A} = L_0 + L_B$$

dove L_0 è la lagrangiana della particella libera.

L'azione corrispondente è (ponendo $\frac{q}{c} = 1$)

$$S = S_0 + \frac{q}{c} \int_{t_a}^{t_b} \dot{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{A} = S_0 + \int_{\gamma} d\mathbf{x} \cdot \mathbf{A}$$

A differenza della trattazione precedente, in questo caso ci sono due cammini classici possibili: il propagatore totale, nell'approssimazione semiclassica, è la somma del propagatore relativo al cammino γ_I e di quello relativo al cammino γ_{II} :

$$K(x_b, t_b, x_a, t_a) = K_I + K_{II}$$

L'approssimazione semiclassica implica che

$$K_i = e^{\frac{i}{\hbar}S_{cl,i}} \int \mathcal{D}\omega \exp \left\{ \frac{i}{\hbar}S_{2,i}[\omega] \right\}$$

con $i = I, II$

Poiché L_B dipende linearmente da $\dot{\mathbf{x}}$, essa contribuisce solo in $S_{cl,i}$ e non alle perturbazioni di ordine ≥ 2 in $S_{2,i}$: il propagatore per il cammino γ_i vale dunque

$$K_i = \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \int_{\gamma_i} d\mathbf{x} \cdot \mathbf{A} \right\} K_{0,i}$$

dove $K_{0,i}$ è il propagatore della particella libera sul cammino γ_i .
Si trova dunque che il propagatore per questo sistema fisico è

$$K(x_b, t_b, x_a, t_a) = \psi(x_b, t_b) = \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \int_{\gamma_I} d\mathbf{x} \cdot \mathbf{A} \right\} \psi_{0,I}(x_b, t_b) + \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \int_{\gamma_{II}} d\mathbf{x} \cdot \mathbf{A} \right\} \psi_{0,II}(x_b, t_b)$$

raccogliendo una fase globale $\theta = \frac{1}{\hbar} \int_{\gamma_I} d\mathbf{x} \cdot \mathbf{A}$, si trova che

$$\psi(x_b, t_b) = e^{i\theta} \left(\psi_{0,I}(x_b, t_b) + \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \oint_{\gamma_{II}-\gamma_I} d\mathbf{x} \cdot \mathbf{A} \right\} \psi_{0,II}(x_b, t_b) \right)$$

e si riconosce immediatamente la circuitazione di $\mathbf{A}$ che, per il teorema di Stokes, è pari al flusso del campo magnetico Φ_B attraverso la superficie con bordo $\gamma_{II} - \gamma_I$.

Reinserendo $\frac{q}{c}$, si trova infine che

$$\boxed{\psi(x_b, t_b) = e^{i\frac{q}{c}\theta} \left(\psi_{0,I}(x_b, t_b) + \exp \left\{ \frac{iq}{\hbar c} \Phi_B \right\} \psi_{0,II}(x_b, t_b) \right)}$$

La variazione della figura di interferenza è dunque da attribuirsi al flusso di $\mathbf{B}$ che produce un effetto non locale.

Oss. È qui evidente che la quantità *non* gauge-invariante $\mathbf{A}$ contribuisce solo con una (trascurabile) fase globale, mentre ciò che produce effetti osservabili è il flusso di $\mathbf{B}$, che è gauge-invariante.

Oss. I valori per cui il campo magnetico non cambia la figura di interferenza sono quelli tali che $\frac{q}{\hbar c} \Phi_B = 2n\pi \leftrightarrow \Phi_B = n \frac{2\pi\hbar c}{q}$, cioè i multipli interi del magnetone di Bohr μ_B ¹⁰.

11 Calcolo di propagatori

In questa sezione si calcolano i propagatori della particella libera e dell'oscillatore armonico quantistico.

11.1 Particella libera

Poiché la particella libera non ha termini quadratici nella sua azione, la risoluzione in approssimazione semiclassica è quella esatta

$$K(x_b, t_b, x_a, t_a) = \frac{1}{\mathcal{N}} e^{iS_{cl}} = \frac{1}{\mathcal{N}} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \frac{m}{2} \frac{(x_b - x_a)^2}{t_b - t_a} \right\}$$

¹⁰O almeno così afferma Sciuto: peccato che $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$, da chiarire.

Un modo per ricavare la normalizzazione $\mathcal{N}$ è il seguente: sapendo che l'azione lungo una curva costante $x_a = 0 \rightarrow x_b = 0$ è nulla e che il fattore di normalizzazione $\mathcal{N}$ è funzione solo di $t_b - t_a$, si ha

$$K(0, t_b, 0, t_a) = \frac{1}{\mathcal{N}(t_b - t_a)}$$

per le proprietà del propagatore, questo è pari a

$$\begin{aligned} K(0, t_b, 0, t_a) &= \int dx_c K(0, t_b, x_c, t_c) K(x_c, t_c, 0, t_a) = \int dx_c \frac{\exp\left\{\frac{im}{2\hbar} \frac{x_c^2}{t_b - t_c}\right\}}{\mathcal{N}(t_b - t_c)} \frac{\exp\left\{\frac{im}{2\hbar} \frac{x_c^2}{t_c - t_a}\right\}}{\mathcal{N}(t_c - t_a)} = \\ &= \frac{1}{\mathcal{N}(t_b - t_c)\mathcal{N}(t_c - t_a)} \int_{-\infty}^{\infty} dx_c e^{i\alpha x_c^2} = \frac{1}{\mathcal{N}(t_b - t_c)\mathcal{N}(t_c - t_a)} \sqrt{\frac{\pi}{-i\alpha}} \end{aligned}$$

dove $\alpha = \frac{m}{2\hbar} \left(\frac{1}{t_b - t_c} + \frac{1}{t_c - t_a} \right) = \frac{m}{2\hbar} \frac{t_b - t_a}{(t_b - t_c)(t_c - t_a)}$ e dunque

$$\frac{\mathcal{N}(t_b - t_c)\mathcal{N}(t_c - t_a)}{\mathcal{N}(t_b - t_a)} = \sqrt{\frac{2\pi i \hbar}{m}} \sqrt{\frac{(t_b - t_c)(t_c - t_a)}{(t_b - t_a)}} \leftrightarrow \mathcal{N}(\Delta t) = \sqrt{\frac{2\pi i \hbar \Delta t}{m}}$$

Oss. Il calcolo di questa costante tornerà utile per fissare quelle dei problemi non liberi.

11.2 L'oscillatore armonico

Si ricava ora il propagatore dell'oscillatore armonico quantistico, con lagrangiana

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

con estremi $(x_a, t_a = 0)$ e $(x_b, t_b = T)$, con $T \geq 0$ generico; si calcola per prima cosa l'azione sul cammino classico: l'equazione del moto è $x(t) = Ae^{i\omega t} + Be^{-i\omega t}$ e si impongono le condizioni al contorno $x(0) = x(T)$, che impongono

$$\begin{cases} A = \frac{x_b - x_a e^{-i\omega T}}{e^{i\omega T} - e^{-i\omega T}} \\ B = \frac{x_a e^{i\omega T} - x_b}{e^{i\omega T} - e^{-i\omega T}} \end{cases}$$

Sostituendo $x(t)$ e $\dot{x}(t)$ nell'espressione di L si trova

$$L(t) = \frac{m}{2} (\dot{x}^2(t) - \omega^2 x^2(t)) = -m\omega^2 (A^2 e^{i2\omega t} + B^2 e^{-i2\omega t})$$

l'azione classica è dunque

$$S_{cl} = \int_0^T dt L(t) = -m\omega^2 A^2 \int_0^T dt e^{i2\omega t} - m\omega^2 B^2 \int_0^T dt e^{-i2\omega t} = \frac{im\omega}{2} [A^2(e^{i2\omega T} - 1) - B^2(e^{-i2\omega T} - 1)]$$

Sostituendo le condizioni su A, B si trova

$$S_{cl} = \frac{m\omega}{2} \frac{1}{\sin(\omega T)} [(x_a^2 + x_b^2) \cos(\omega T) - 2x_a x_b]$$

Si considerano ora le perturbazioni z sul cammino classico fino al secondo ordine

$$S[x(t) + z] = S_{cl} + S_2[z]$$

con

$$S_2[z] = \frac{m}{2} \int_0^T dt (\dot{z}^2 - \omega^2 z^2)$$

Oss. La lagrangiana è quadratica sia in x , sia in $\dot{x}$, quindi non sono presenti termini $S_{\geq 3}$.

Si trova dunque

$$K(x_b, T, x_a, 0) = \mathcal{M} e^{\frac{i}{\hbar} S_{cl}} \int \mathcal{D}z \exp \left\{ \frac{im}{2\hbar} \int_0^T dt (\dot{z}^2 - \omega^2 z^2) \right\} := \mathcal{M} e^{\frac{i}{\hbar} S_{cl}} I$$

Come visto nel caso generico, si deve ora scrivere la forma quadratica associata a $S_2[z]$ integrando per parti:

$$\int_0^T dt \dot{z}^2 = z \dot{z} \Big|_0^T - \int_0^T dt z \ddot{z} \rightarrow S_2[z] = -\frac{m}{2} \int_0^T dt z X z$$

con $X = \frac{d^2}{dt^2} + \omega^2$.

Per calcolare $S_2[z]$ si può usare un trucco analitico (usato anche da Feynman): poiché $z(t)$ è integrata su $[0, T]$, si può assumere che essa sia una funzione di periodo T , e, con l'aggiunta della condizione $z(0) = z(T) = 0$, essa si può espandere in serie di Fourier come

$$z(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi t}{T}$$

Oss. La funzione $\sin \frac{n\pi t}{T}$ è autofunzione di X di autovalore $\lambda_n = \frac{-n^2\pi^2}{T^2} + \omega^2$

Dunque

$$\int_0^T dt z X z = \sum_{m,n=1}^{\infty} a_n a_m \left(-\frac{\pi^2 n^2}{T^2} + \omega^2 \right) \int_0^T dt \sin \frac{m\pi t}{T} \sin \frac{n\pi t}{T} = -\frac{T}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \left(\frac{\pi^2 n^2}{T^2} - \omega^2 \right)$$

dove si è utilizzato che l'insieme $\left\{ \frac{2}{T} \sin \frac{n\pi t}{T} \right\}_n$ è un sistema ONC per $L^2(0, T)$.

Oss. La misura dell'integrale I è $\mathcal{D}z$, ma la scelta di un $z(t)$ è del tutto equivalente alla scelta della successione dei suoi coefficienti di Fourier a_n , dunque, per qualche M , si può scrivere

$$\mathcal{D}z = M \prod_{n=1}^{\infty} da_n$$

Alla luce di ciò, la correzione semiclassica del propagatore vale

$$I = M \int \prod_{n=0}^{\infty} da_n \exp \left\{ \frac{-imT}{4\hbar} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi^2 n^2}{T^2} - \omega^2 \right) \right\} = M \prod_{n=1}^{\infty} I_n$$

dove gli integrali I_n si possono valutare con il metodo della fase stazionaria effettuando il cambio di variabile $\rho_n = e^{i\frac{\pi}{4}} a_n$

$$I_n = e^{i\frac{\pi}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} d\rho_n \exp \left\{ \frac{-mT}{4\hbar} \left(\frac{\pi^2 n^2}{T^2} - \omega^2 \right) \rho_n^2 \right\} = \sqrt{\pi} \left(\frac{4i\hbar}{mT} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{\pi^2 n^2}{T^2} - \omega^2 \right)^{-\frac{1}{2}}$$

Assorbendo le costanti in M , si trova che

$$I = M \left[\prod_{n=1}^{\infty} \frac{\pi^2 n^2}{T^2} - \omega^2 \right]^{-\frac{1}{2}} = M \left[\prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi^2 n^2}{T^2} \right) \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{\omega^2 T^2}{\pi^2 n^2} \right) \right]^{-\frac{1}{2}}$$

Oss. Se si pone $\omega = 0$, ciò che rimane è $M \prod \left(\frac{\pi^2 n^2}{T^2} \right)$, ma in tal caso la lagrangiana degenera in quella di una particella libera: da questo confronto è chiaro che $M \prod \left(\frac{\pi^2 n^2}{T^2} \right) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar T}}$

Si calcola ora

$$P(\omega T) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{\omega^2 T^2}{\pi^2 n^2} \right)$$

Si osserva che la funzione P ha zeri in $\omega T = \pm\pi, \pm 2\pi, \dots$ ed è analitica su $\mathbb{C}$: l'unica funzione con queste caratteristiche è

$$P(\omega T) = \frac{\sin(\omega T)}{\omega T}$$

Un altro modo per stimare questo prodotto è considerare la rappresentazione

$$\frac{1}{z\Gamma(z)} = e^{\gamma z} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{n} \right) e^{-\frac{z}{n}} = \frac{1}{\Gamma(z+1)}$$

e utilizzarla per scrivere

$$\frac{1}{\Gamma(1+z)\Gamma(1-z)} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2} \right)$$

da cui si ottiene il risultato cercato ricordando che

$$\frac{1}{\Gamma(1+z)\Gamma(1-z)} = \frac{1}{z} \frac{1}{\Gamma(z)\Gamma(1-z)} = \frac{1}{z} \frac{\sin(\pi z)}{\pi}$$

Si ha dunque che

$$I = \sqrt{\frac{m\omega}{2\pi i \hbar \sin(\omega T)}}$$

e infine che

$$K(x_b, T, x_a, 0) = e^{\frac{i}{\hbar} S_{cl}} \sqrt{\frac{m\omega}{2\pi i \hbar \sin(\omega T)}}$$

11.3 Determinanti funzionali

Come visto dalla relazione (10.1), un altro modo di stimare l'approssimazione semiclassica di propagatori quantistici è trovare il determinante della forma quadratica X associata a $S_2[z]$.

Si prende sempre come esempio l'oscillatore armonico, con

$$X = \frac{d^2}{dt^2} + \omega^2$$

Per evitare difficoltà con la fase, si effettua una rotazione di Wick $t = -i\tau$, che manda

$$X \rightarrow X_e = -\frac{d^2}{d\tau^2} + \omega^2$$

Dunque l'integrale della sezione precedente diventa

$$I = \int \mathcal{D}z \exp \left\{ -\frac{m}{2\hbar} \int_0^{T_e} d\tau z \left(-\frac{d^2}{d\tau^2} + \omega^2 \right) z \right\}$$

Come detto in precedenza, $\det(X_e) = \prod \lambda(X_e)$ e per X_e vale che

$$X_e \sin \frac{\pi n \tau}{T_e} = \left(\frac{\pi^2 n^2}{T_e^2} + \omega^2 \right) \sin \frac{\pi n \tau}{T_e}$$

Il determinante è dunque

$$\det(X_e) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi^2 n^2}{T_e^2} + \omega^2 \right) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{T_e^2}{\pi^2 n^2} \right) \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{\omega^2 T_e^2}{\pi^2 n^2} \right)$$

Oss. Con questa visione è chiaro che $\det\left(-\frac{d^2}{d\tau^2}\right) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{T_e^2}{\pi^2 n^2}\right)$: questo è il determinante funzionale della forma quadratica associata alla particella libera.

Tornando dalla rotazione, $T_e = iT$ e il calcolo delle produttorie è il medesimo della sezione precedente.

11.3.1 Regolarizzazione con funzione zeta

In questo e molti altri problemi di fisica teorica, ci si imbatte in oggetti matematici non convergenti e, per trovare un significato al loro risultato, è necessario regolarizzarli.

Si prenda come esempio l'appena citato determinante funzionale per la particella libera

$$\det(X) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{T^2}{\pi^2 n^2} \right)$$

questa produttoria è divergente, ma, sfruttando la continuazione analitica della ζ di Riemann, è possibile associare a essa un risultato finito.

Detti λ_n gli autovalori di X si consideri la funzione

$$\zeta_X(s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n^s}$$

La sua derivata è

$$\zeta'_X(s) = \frac{d}{ds} \left(\sum_{n=1}^{\infty} e^{-s \ln(\lambda_n)} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{\lambda_n^s} \ln(\lambda_n) \rightarrow \zeta'_X(0) = -\sum_{n=1}^{\infty} \ln(\lambda_n)$$

e dunque $\det(X) = e^{-\zeta'_X(0)}$

Sostituendo gli autovalori $\lambda_n = \frac{T^2}{\pi^2 n^2}$ si trova

$$\zeta_X(s) = \left(\frac{T}{\pi} \right)^{2s} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2s}} = \left(\frac{T}{\pi} \right)^{2s} \zeta(2s)$$

La sua derivata in zero vale

$$\zeta'_X(0) = \left(\frac{T}{\pi} \right)^{2s} \left[2 \ln \left(\frac{T}{\pi} \right) \zeta(2s) + 2\zeta'(2s) \right] \Big|_{s=0} = 2 \ln \left(\frac{T}{\pi} \right) \zeta(0) + 2\zeta'(0)$$

ricordando che, per continuazione analitica, $\zeta(0) = -\frac{1}{2}$ e $\zeta'(0) = \ln(2\pi)\zeta(0)$, si trova infine

$$\zeta'_X(0) = -\ln(2T) \rightarrow \det(X) = 2T$$

che è il risultato atteso a meno di costanti di normalizzazione.

12 Rotazione di Wick e meccanica statistica

La rotazione di Wick, introdotta in precedenza come un trucco matematico per risolvere integrali, ha un'altra importante applicazione che mette in relazione il propagatore quantistico con la funzione di partizione di un problema statistico.

Si consideri un'hamiltoniana indipendente dal tempo: l'operatore evoluzione temporale è

$$U(t, 0) = e^{-\frac{i}{\hbar} H t}$$

Si effettua ora una rotazione di Wick $t = -i\tau$ e si considera la traccia di U

$$\text{Tr}(U(\tau, 0)) = \int dq \langle q | e^{-\frac{\tau}{\hbar} H} | q \rangle := \int dq K(q, -i\tau, q, 0)$$

La funzione di partizione per un sistema statistico in equilibrio con hamiltoniana H è invece

$$Z = \text{Tr}(e^{\beta H})$$

Si può dunque identificare il fattore β con

$$\beta := \frac{1}{k_b T} = \frac{\tau}{\hbar} \rightarrow T = \frac{\hbar}{k_b \tau}$$

[CONSIDERAZIONI SUL LIMITE CLASSICO CHIEDI A MLF]

Questa corrispondenza è particolarmente utile perché il limite classico della meccanica statistica quantistica può essere trovato sia per $\hbar \rightarrow 0$ sia per $T \rightarrow \infty$ [????????????]:

$$Z = \int dp dq \langle q | p \rangle \langle p | e^{-\frac{1}{\hbar} H \tau} | q \rangle \xrightarrow{\hbar \rightarrow 0} \int dq dp e^{-\beta H} = Z_{cl}$$

Per calcolarne le approssimazioni semiclassiche in potenze di $\hbar$ si possono utilizzare quelle del propagatore già discusse, utilizzando però la versione euclidea dell'azione:

$$\frac{i}{\hbar} S = \frac{i}{\hbar} \int_0^t dt \left[\frac{1}{2} m \left(\frac{dq}{dt} \right)^2 - V(q) \right] \xrightarrow{t=-i\tau} -\frac{1}{\hbar} \int_0^\tau d\tau \left[\frac{1}{2} m \left(\frac{dq}{d\tau} \right)^2 + V(q) \right] := \frac{-1}{\hbar} S_e$$

che non è altro che l'azione calcolata con il tempo euclideo τ .

Dunque si ha, considerando cammini $q(\tau)$ tali che $q(0) = q(\hbar\beta)$,

$$Z = \int dq \int \mathcal{D}q e^{-\frac{1}{\hbar} S_e[q]}$$

la cui approssimazione semiclassica è

$$Z = \int dq e^{-\frac{1}{\hbar} S_{e,cl}} \int \mathcal{D}x \exp \left\{ -\frac{1}{\hbar} S_{e,2}[x] \right\}$$

12.1 Esempio: potenziale armonico

Come sempre, si considera il potenziale armonico come esempio: la sua azione euclidea classica tra $(q, 0)$ e (q, t) è

$$S_{e,cl} = -iS_{cl} = -im\omega q^2 \frac{\cos(\omega t) - 1}{\sin(\omega t)} = im\omega q^2 \tan\left(\frac{\omega t}{2}\right) \Big|_{t=-i\tau} = m\omega q^2 \tanh\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

Poiché il *path integral* delle deformazioni quadratiche è indipendente da q si calcola

$$\int_{-\infty}^{\infty} dq e^{-\frac{1}{\hbar} S_{e,cl}} = \int_{-\infty}^{\infty} dq \exp\left\{\frac{-m\omega}{\hbar} \tanh\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) q^2\right\} = \sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega \tanh\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}}$$

e, separatamente, la correzione quadratica

$$S_{e,2} = \frac{m}{2} \int_0^\tau d\tau \left(\frac{d^2x}{d\tau^2} + \omega^2 x^2 \right) = \frac{m}{2} \int_0^\tau d\tau x X_e x$$

con $X_e = -\frac{d^2}{d\tau^2} + \omega^2$.

Il *path integral* è, a meno di normalizzazioni, pari a $(\det(X_e))^{-\frac{1}{2}}$:

$$\det(X_e) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi^2 n^2}{\tau^2} + \omega^2 \right) = \frac{1}{\mathcal{N}_e} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{\omega^2 \tau^2}{\pi^2 n^2} \right)$$

dove $\mathcal{N}_e$ è la solita normalizzazione della particella libera scritta con il tempo euclideo.

Come in precedenza, il risultato della produttoria si deduce dal fatto che essa, come funzione di $\omega\tau$, non ha poli e ha zeri in $\omega\tau = \pm i\pi, \pm 2i\pi, \dots$: l'unica funzione con queste caratteristiche è

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{\omega^2 \tau^2}{\pi^2 n^2} \right) = \frac{\sinh(\omega\tau)}{\omega\tau}$$

Si trova dunque che

$$Z = \sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega \tanh\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}} \sqrt{\frac{m}{2\pi\hbar\tau}} \sqrt{\frac{\omega\tau}{\sinh(\omega\tau)}} = \frac{1}{2 \sinh\left(\frac{\omega\hbar\beta}{2}\right)}$$

che, come per il propagatore, è il risultato esatto del problema (non essendoci termini dipendenti dalla terza potenza delle deformazioni). Un altro modo per giungere a questo risultato è calcolare direttamente la traccia, sfruttando gli autostati di H :

$$\text{Tr}(e^{-\beta H}) = \sum_{n=0}^{\infty} \langle n | e^{-\beta H} | n \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega (n + \frac{1}{2})} = e^{-\frac{\omega\hbar\beta}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\omega\hbar\beta n} = \frac{e^{-\frac{\omega\hbar\beta}{2}}}{1 - e^{-\omega\hbar\beta}} = \frac{1}{2 \sinh\left(\frac{\omega\hbar\beta}{2}\right)}$$

Oss. In questo caso è stato possibile utilizzare un modo diretto per risolvere il problema, ma nella maggioranza dei casi non sono noti gli autovalori in energia di H e questo metodo non è applicabile.

Approssimazione WKB

L'approssimazione WKB (Wentzel–Kramers–Brillouin) è un metodo di risoluzione per equazioni differenziali del second'ordine, che qui sarà applicata all'equazione di Schrödinger.

13 Regime WKB

Nel capitolo precedente si è considerato il limite semiclassico $\hbar \rightarrow 0$, qui si cerca un altro regime: si consideri, senza perdere di generalità, una funzione d'onda scritta in termini di una funzione complessa $S(\mathbf{x}, t)$

$$\psi(\mathbf{x}, t) := e^{\frac{i}{\hbar}S(\mathbf{x}, t)}$$

Imponendo l'equazione di Schrödinger dipendente dal tempo si trova che

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{x}, t) &= \frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\mathbf{x}, t) + V(\mathbf{x}) \psi(\mathbf{x}, t) \\ &\quad \updownarrow \\ -\frac{\partial S}{\partial t} &= \frac{1}{2m} (\nabla S)^2 - \frac{i\hbar}{2m} \nabla^2 S + V(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

che, nel limite $\hbar \rightarrow 0$, si riduce all'equazione di Hamilton-Jacobi per l'azione classica S : più precisamente, questo limite è equivalente a considerare il modulo del termine proporzionale a $\hbar$ trascurabile rispetto all'altro termine dipendente da S nel lato destro dell'equazione

$$|\hbar \nabla^2 S| \ll |\nabla S|^2 \leftrightarrow \frac{|\hbar \nabla^2 S|}{|\nabla S|^2} \ll 1$$

utilizzando la relazione classica $\mathbf{p} = \nabla S$ si trova che ciò vale per

$$\frac{|\hbar \nabla \cdot \mathbf{p}|}{|\mathbf{p}|^2} \ll 1$$

che vuol dire

- $|\nabla \cdot \mathbf{p}|$ piccolo, cioè **impulso lentamente variabile**;
- $|\mathbf{p}|^2$ piccolo, cioè **impulso piccolo**.

Se si considera ora il caso di H unidimensionale e indipendente dal tempo e si pone $S(x, t) = -Et + W(x)$

$$\psi(x, t) = e^{-\frac{i}{\hbar}S(x, t)} := e^{-\frac{i}{\hbar}Et} A e^{\frac{i}{\hbar}W(x)} := e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \psi(x)$$

si trova, sostituendo nell'equazione di Schrödinger indipendente dal tempo,

$$H\psi = E\psi \leftrightarrow \frac{1}{2m} (W')^2 - \frac{i\hbar}{2m} W'' + V(x) - E = 0$$

che è detta equazione di Hamilton-Jacobi ridotta.

Il suo limite classico si trova, similmente a prima, quando

$$\left| \frac{\hbar W''}{(W')^2} \right| \ll 1 \leftrightarrow \left| \frac{\hbar p'}{p^2} \right| \ll 1$$

Se si pone $\hbar = 0$, dall'equazione si trova

$$(W'(x))^2 = 2m[E - V(x)] := p^2(x) \rightarrow p' = \frac{-m}{\sqrt{2m(E - V(x))}} \frac{\partial V}{\partial x} = \frac{-m}{\pm p} \frac{\partial V}{\partial x}$$

e il limite classico diventa

$$\left| \frac{\hbar p'}{p^2} \right| = \left| \frac{\hbar m \frac{\partial V}{\partial x}}{p^3} \right| \ll 1$$

che significa **potenziale lentamente variabile** e **impulso piccolo**.

13.1 Soluzione perturbativa al primo ordine

Per trovare soluzioni semiclassiche, si risolve perturbativamente, espandendo $W(x)$ in potenze di $\hbar$:

$$W(x) = W_0(x) + \hbar W_1(x) + \hbar^2 W_2(x) + \dots$$

Imponendo questa forma nell'equazione di Hamilton-Jacobi ridotta ed eguagliando i termini dello stesso ordine in $\hbar$, all'ordine 0 si ritrova l'equazione classica

$$\frac{1}{2m}(W'_0)^2 + V(x) - E = 0$$

con soluzione $W'_0 := p(x) \in \mathbb{R}$, mentre al primo ordine si trova

$$\frac{1}{2m}(2W'_1 W'_0) - \frac{i}{2m} W''_0 = 0 \leftrightarrow W'_1(x) = \frac{i W''_0}{2 W'_0}$$

Oss. In tutti gli ordini, si trova un'equazione differenziale lineare rispetto alla funzione da trovare, con coefficienti dipendenti dagli ordini precedenti (noti), che è sempre risolubile.

In questo corso si tratterà solamente dell'approssimazione al primo ordine: la soluzione dell'ordine 0, nel caso in cui $E > V(x)$, è

$$W'_0 = \pm \sqrt{2m(E - V(x))} := p(x) \rightarrow W_0(x) = \pm \int_{x_0}^x dx' p(x') = \pm \int_{x_0}^x dx' \sqrt{2m(E - V(x))}$$

dove x_0 è un qualsiasi punto in cui vale il regime di approssimazione considerato.

Da questa soluzione si trova che

$$W'_1(x) = \frac{i}{2} \frac{p'(x)}{p(x)} = \frac{i}{2} \frac{d}{dx} \ln \left(\frac{p(x)}{p_0} \right) = i \frac{d}{dx} \ln \sqrt{\frac{p(x)}{p_0}} \rightarrow W_1(x) = i \ln \sqrt{\frac{p(x)}{p_0}}$$

Sostituendo nell'espressione di $\psi(x) = e^{\frac{i}{\hbar} W(x)}$ si trova

$$\psi(x) = \exp \left\{ \pm i \int_{x_0}^x dx' \frac{p(x')}{\hbar} \right\} \cdot \exp \left\{ - \ln \sqrt{\frac{p(x)}{p_0}} \right\}$$

infine, ridefinendo $k(x) := \frac{p(x)}{\hbar}$

$$\psi(x) = \frac{C}{\sqrt{k(x)}} \exp \left\{ \pm i \int_{x_0}^x dx' k(x') \right\}$$

Oss. La densità di probabilità associata a $\psi(x, t)$ è proporzionale a quella classica:

$$|\psi(x, t)|^2 dx = \frac{dx}{k(x)} = \hbar \frac{dx}{p(x)} = m\hbar \frac{dx}{v(x)} = m\hbar dt \rightarrow |\psi(x, t)|^2 \propto \frac{dt}{dx}$$

La soluzione generale dell'equazione di Schrödinger stazionaria è una combinazione lineare delle due soluzioni linearmente indipendenti

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{k(x)}} \left(a \exp \left\{ i \int_{x_0}^x dx' k(x') \right\} + b \exp \left\{ -i \int_{x_0}^x dx' k(x') \right\} \right) \quad (13.1)$$

che può essere riscritta come

$$\psi(x) = \frac{A}{\sqrt{k(x)}} \sin \left(\int_{x_0}^x dx' k(x') + \delta \right) \quad (13.2)$$

Nel caso in cui invece $E < V(x)$, si definisce la funzione $\beta(x) = \sqrt{2m(V(x) - E)}$ tale che $\beta^2(x) = -k^2(x)$ e si giunge, similmente, a

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{\beta(x)}} \left(c \exp \left\{ \int_{x_0}^x dx' \beta(x') \right\} + d \exp \left\{ - \int_{x_0}^x dx' \beta(x') \right\} \right) \quad (13.3)$$

14 Potenziali con un punto di inversione

Si considera ora la soluzione al primo ordine WKB di problemi con potenziali lentamente variabili e strettamente monotoni: il problema da risolvere nell'intorno dei punti di inversione classici è che nella regione limitrofa a essi *non* vale l'approssimazione WKB, in quanto $p \approx 0$. Per risolvere questo limite del metodo WKB si cercano delle soluzioni nell'intorno dei punti di inversione tali da poter essere promosse a continuazioni analitiche delle soluzioni WKB, definite "lontano" dai punti di inversione.

14.1 Potenziali crescenti

Si consideri un potenziale $V(x)$ strettamente crescente e si supponga che il sistema abbia energia E : esisterà un unico punto a tale che $V(a) = E$, con $V'(a) > 0$.

Come accennato, si cerca ora la soluzione dell'equazione di Schrödinger nell'intorno di a :

$$V(x) = V(a) + V'(a)(x - a) + O((x - a)^2) \underset{x \rightarrow a}{\sim} E + V'(a)(x - a)$$

Nella regione $x < a$, si ha che $E > V(x)$ e l'EDS diventa

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V(x))\psi(x) = \frac{d^2\psi}{dx^2} - \frac{2mV'(a)}{\hbar^2}(x - a)\psi(x)$$

utilizzando la variabile adimensionale $z = \left(\frac{2mV'(a)}{\hbar^2} \right)^{\frac{1}{3}} (x - a)$, essa diventa

$$\frac{d^2\psi}{dz^2} - z\psi(z) = 0$$

che è l'equazione di Airy; imponendo l'ansatz

$$\psi(z) = \int_{\gamma} dt e^{zt} U(t)$$

con γ curva arbitraria, l'equazione si riduce a

$$\int_{\gamma} dt (t^2 - z) e^{zt} U(t) = 0$$

Integrando per parti l'addendo dipendente da z si trova

$$- \int_{\gamma} dt z e^{zt} = -e^{zt} U(t) \Big|_{\partial\gamma} + \int_{\gamma} dt e^{zt} U'(t)$$

Si suppone ora che $U(t)$ e γ siano tali che il termine di bordo si annulli: in questo caso l'equazione di Airy si riduce a una ODE del primo ordine a variabili separabili

$$\int_{\gamma} dt e^{zt} (t^2 U(t) + U'(t)) = 0 \leftrightarrow t^2 U(t) = -\frac{dU}{dt}$$

che ha soluzione

$$U(t) = K_0 e^{-\frac{1}{3}t^3} \rightarrow \psi(z) = \int_{\gamma} dt \exp \left\{ zt - \frac{1}{3}t^3 \right\}$$

Affinchè il termine di bordo si annulli $\forall z$ deve valere che

$$e^{-\frac{1}{3}t^3} \rightarrow 0 \leftrightarrow \operatorname{Re} \left(\frac{1}{3}t^3 \right) \rightarrow \infty \leftrightarrow |t| \rightarrow +\infty \wedge \cos(3 \arg(t)) > 0$$

La condizione sulla fase di t è soddisfatta nelle zone evidenziate in rosso in figura 14.1.




Fig. 14.1: Rappresentazione del piano t per la soluzione dell'equazione di Airy: in rosso, la curva corrispondente a $Ai(z)$

Poiché le zone "permesse" sono 3, esistono due soluzioni linearmente indipendenti, le cui γ sono indipendenti: la soluzione cercata è quella corrispondente alla γ rappresentata in rosso, detta $Ai(z)$.

Parametrizzando $\gamma(\tau) = i\tau - \epsilon$, si ha

$$\psi(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} d\tau e^{iz\tau + \frac{i}{3}\tau^3} = 2i \int_0^{+\infty} d\tau \cos\left(z\tau + \frac{i}{3}\tau^3\right) := 2\pi i Ai(z)$$

Questa è dunque la soluzione intorno a $z = 0 \rightarrow x = a$: per utilizzare la continuazione analitica, si usano gli sviluppi asintotici di $Ai(z)$ per $z \rightarrow \pm\infty$, che si possono ricavare con il metodo della fase stazionaria:

$$\begin{aligned} \psi(z) &\underset{z \rightarrow +\infty}{\sim} i\sqrt{\pi} z^{-\frac{1}{4}} \exp\left\{-\frac{2}{3}z^{\frac{3}{2}}\right\} \\ \psi(z) &\underset{z \rightarrow -\infty}{\sim} 2i\sqrt{\pi}|z|^{-\frac{1}{4}} \sin\left(\frac{2}{3}|z|^{\frac{3}{2}} + \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned} \quad (14.1)$$

Si riscrivono ora le (14.1) in funzione di x :

- $z \rightarrow \infty, \quad x \rightarrow \infty$

Ridefinito $V'(a) := V'$, un'altra espressione per z è la seguente

$$z = \frac{2mV'}{\hbar^2}(x - a) \left(\frac{2mV'}{\hbar}\right)^{-\frac{2}{3}} = \frac{2m}{\hbar}(V(x) - E) \left(\frac{2mV'}{\hbar^2}\right)^{-\frac{2}{3}} = \beta^2(x) \left(\frac{2mV'}{\hbar^2}\right)^{-\frac{2}{3}}$$

Da cui è comodo scrivere

$$\frac{2}{3}z^{\frac{3}{2}} = \int_0^z dz' z'^{\frac{1}{2}} = \int_a^x \left(\frac{2mV'}{\hbar^2}\right)^{\frac{1}{3}} dx' \cdot \left(\frac{2mV'}{\hbar^2}\right)^{-\frac{1}{3}} \beta(x') = \int_a^x dx' \beta^2(x')$$

dove si è utilizzata la definizione di z per il cambio di variabile e la relazione appena ricavata per l'integrando.

Sostituendo l'ultima relazione tra z e x anche in $z^{-\frac{1}{4}}$, la prima delle (14.1) in funzione di x è dunque

$$\psi(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} i\sqrt{\pi} \left(\frac{2mV'}{\hbar^2}\right)^{\frac{1}{6}} \frac{1}{\sqrt{\beta(x)}} \exp\left\{-\int_a^x dx' \beta(x')\right\}$$

- $z \rightarrow -\infty, \quad x \rightarrow -\infty$

Utilizzando i risultati precedenti e ricordando che $-\beta^2(x) = k^2(x)$, è facile mostrare che la seconda delle (14.1) in funzione di x è

$$\psi(x) \underset{x \rightarrow -\infty}{\sim} 2i\sqrt{\pi} \left(\frac{2mV'}{\hbar^2}\right)^{\frac{1}{6}} \frac{1}{\sqrt{k(x)}} \sin\left(\int_x^a dx' k(x') + \frac{\pi}{4}\right)$$

Ricapitolando, dalla soluzione intorno a $x = a$ si è trovato che

$$\begin{aligned} \psi(x) &\underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} i\sqrt{\pi} \left(\frac{2mV'}{\hbar^2}\right)^{\frac{1}{6}} \frac{1}{\sqrt{\beta(x)}} \exp\left\{-\int_a^x dx' \beta(x')\right\} \\ \psi(x) &\underset{x \rightarrow -\infty}{\sim} 2i\sqrt{\pi} \left(\frac{2mV'}{\hbar^2}\right)^{\frac{1}{6}} \frac{1}{\sqrt{k(x)}} \sin\left(\int_x^a dx' k(x') + \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

Mentre dall'approssimazione WKB si è trovato che

$$\psi_{\text{WKB}}(x) = \frac{D}{\sqrt{\beta(x)}} \exp \left\{ - \int_{x_0}^x dx' \beta(x') \right\}, \quad x \gg a$$

$$\psi_{\text{WKB}}(x) = \frac{A}{\sqrt{k(x)}} \sin \left(\int_{x_0}^x dx' k(x') + \delta \right), \quad x \ll a$$

che sono la (13.2) e la (13.3), dove si è posto $c = 0$ per la normalizzabilità.

Osservazione 1 Prima di confrontare queste soluzioni tra loro, bisogna verificare che il dominio in cui $V(x)$ è circa lineare intersechi quello in cui vale l'approssimazione WKB: $V(x)$ è circa lineare per gli x tali che

$$\frac{V''(a)|x-a|^2}{V'(a)|x-a|} = \frac{V''(a)|x-a|}{V'(a)} \ll 1 \leftrightarrow \frac{V'(a)}{V''(a)} \gg |x-a|$$

Se per questi x vale anche l'approssimazione WKB, non ci sono problemi.

Osservazione 2 Per effettuare la continuazione analitica bisogna invece verificare per quali z gli sviluppi asintotici approssimano bene la funzione $Ai(z)$: come è evidente dalla figura 14.2, per $|z| > 1$ esse approssimano quasi perfettamente la funzione originaria.




Fig. 14.2: Grafico di $\text{Re}(Ai(z))$ (in blu) e dei due andamenti asintotici (in rosa)

Si noti infine che

$$|z| > 1 \rightarrow \left| \frac{2mV'(a)}{\hbar^2} \right|^{-\frac{2}{3}} \frac{2m}{\hbar} |E - V(x)| > 1 \rightarrow \left| \frac{\hbar^2}{2mV'(a)} \right|^{\frac{2}{3}} \frac{p^2}{\hbar^2} > 1 \leftrightarrow \left| \frac{2mV'(a)}{p^3} \right| < 1$$

che è compatibile con il regime WKB: ciò significa che c'è un'intersezione tra il dominio di validità dello sviluppo asintotico e quello delle soluzioni WKB, il che garantisce la possibilità di utilizzare la continuazione analitica.

Se queste due condizioni sono soddisfatte, si possono confrontare i coefficienti nelle espressioni di sopra a due a due, trovando le condizioni di raccordo con le $Ai(z)$

$$\begin{cases} D = i\sqrt{\pi} \left(\frac{2mV'}{\hbar^2} \right)^{\frac{1}{6}} \\ \delta = \frac{\pi}{4} \\ A = 2D \\ x_0 = a \end{cases}$$

La soluzione del problema è infine

$$\psi_{\text{WKB}}(x) = \begin{cases} \frac{2D}{\sqrt{k(x)}} \sin \left(\int_x^a dx' k(x') + \frac{\pi}{4} \right) & x < a \\ \frac{D}{\sqrt{\beta(x)}} \exp \left\{ - \int_a^x dx' \beta(x') \right\} & x > a \end{cases}$$

14.2 Potenziali decrescenti

Si consideri ora un potenziale $V(x)$ strettamente decrescente e si supponga che il sistema abbia energia E : esisterà un unico punto b tale che $V(b) = E$, con $V'(b) := V' < 0$.

Come in precedenza, si linearizza $V(x)$ e si cerca la soluzione dell'equazione di Schrödinger:

$$V(x) \underset{x \rightarrow b}{\sim} E + V' \cdot (x - b) \rightarrow V(x) - E = |V'|(b - x)$$

Si definisce la variabile adimensionale $z = \left| \frac{2mV'}{\hbar^2} \right|^{\frac{1}{3}} (b - x)$ e, similmente a prima, si trova

$$z = \left| \frac{2mV'}{\hbar^2} \right|^{-\frac{2}{3}} \beta^2(x) = - \left| \frac{2mV'}{\hbar^2} \right|^{-\frac{2}{3}} k^2(x)$$

L'equazione di Schrödinger si riduce nuovamente a quella di Airy e le soluzioni sono le medesime, con gli stessi sviluppi asintotici (14.1).

Le soluzioni WKB sono invece

$$\begin{aligned} \psi_{\text{WKB}}(x) &= \frac{A}{\sqrt{k(x)}} \sin \left(\int_{x_0}^x dx' k(x') + \delta \right), \quad x \gg b \\ \psi_{\text{WKB}}(x) &= \frac{C}{\sqrt{\beta(x)}} \exp \left\{ - \int_{x_0}^x dx' \beta(x') \right\}, \quad x \ll b \end{aligned}$$

e in questo caso si è posto $d = 0$ per garantire la normalizzabilità.

Per riscrivere le (14.1) si utilizza lo stesso ragionamento del caso precedente, ma ricordando che in questo caso $z \rightarrow \pm\infty$ implica $x \rightarrow \mp\infty$.

Le soluzioni nell'intorno di b sono dunque

$$\begin{aligned} \psi(x) &\underset{x \rightarrow -\infty}{\sim} i\sqrt{\pi} \left| \frac{2mV'}{\hbar^2} \right|^{\frac{1}{6}} \frac{1}{\sqrt{\beta(x)}} \exp \left\{ - \int_x^b dx' \beta(x') \right\} \\ \psi(x) &\underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} 2i\sqrt{\pi} \left| \frac{2mV'}{\hbar^2} \right|^{\frac{1}{6}} \frac{1}{\sqrt{k(x)}} \sin \left(\int_b^x dx' k(x') + \frac{\pi}{4} \right) \end{aligned}$$

Dal confronto, come in precedenza, si trova che $A = 2C$ e la soluzione generale del problema è

$$\psi_{\text{WKB}}(x) = \begin{cases} \frac{C}{\sqrt{\beta(x)}} \exp \left\{ - \int_x^b dx' \beta(x') \right\} & x < b \\ \frac{2C}{\sqrt{k(x)}} \sin \left(\int_b^x dx' k(x') + \frac{\pi}{4} \right) & x > b \end{cases}$$

15 Potenziali con due punti di inversione