

Résolution graphique : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices sans calculatrice, comme à l'épreuve anticipée : résoudre $f(x) = k$ et $f(x) < k$ sur une courbe, lire le signe d'une fonction, dresser son tableau de variations, dire si une croissance accélère ou ralentit. Un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau, et une correction qui marque la lecture sur le dessin.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8


niveau 1

Une lecture par question. Sans calculatrice.

Rappel de cours


- Résoudre $f(x) = k$: on trace l'horizontale d'ordonnée k ; les solutions sont les ABSCISSES des points d'intersection.
- $f(x) > k$: les abscisses des points de la courbe AU-DESSUS de cette horizontale ; $f(x) < k$: EN DESSOUS.
- f est positive là où sa courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, négative là où elle est en dessous.
- f est croissante là où sa courbe monte, de gauche à droite ; le tableau de variations résume les montées et les descentes.

- 1 Voici la courbe d'une fonction f définie sur $[-3; 5]$. Résoudre graphiquement : $f(x) = 0$; $f(x) = -3$; $f(x) = -5$.




- 2 On reprend la courbe de l'exercice 1. Sur $[-3; 5]$, résoudre graphiquement : $f(x) < 0$; $f(x) \geq 5$.

- 3 Voici la courbe d'une fonction f définie sur $[-4; 5]$. Dresser le tableau de signes de f .




- 4 Voici la courbe d'une fonction f . Dresser son tableau de variations sur $[-2; 2]$.



- 5 Deux grandeurs augmentent : la bleue (une droite) et l'orange.

a) De combien augmente chacune entre $x = 0$ et $x = 2$, puis entre $x = 4$ et $x = 6$?

b) Laquelle augmente à vitesse constante ? Laquelle accélère ?



- 6 On reprend la courbe de l'exercice 1. Dresser le tableau de signes de f sur $[-3; 5]$.

- 7 La courbe de l'exercice 1 est celle de $f(x) = x^2 - 2x - 3$. Dresser le tableau de variations de f sur $[-3; 5]$, puis donner le minimum de f .

8 On reprend la courbe de l'exercice 4, sur $[-2; 2]$. Résoudre graphiquement : $f(x) = 2$; $f(x) \leq -2$; $f(x) > 2$.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Traduire la question, lire la courbe, répondre avec l'unité. Sans calculatrice.


Rappel de cours

- « Dépasser k », c'est $f(x) > k$; « rester sous k », c'est $f(x) < k$.
- La réponse est un ensemble d'ABSCISSES (des heures, des années, des tonnes...), pas d'ordonnées.
- Une croissance qui accélère : la courbe se redresse. Qui ralentit : elle s'aplatit. Qui double à intervalles réguliers : elle s'envole.

9 Une journée d'hiver en montagne

La courbe donne la température T , en $^{\circ}\text{C}$, relevée dans une station de ski. Une unité horizontale vaut 3 heures, à partir de minuit ($x = 0$).


- Dresser le tableau de signes de T sur $[0; 8]$.
- Pendant quelles heures gèle-t-il (température négative) ?
- Résoudre $T(x) \geq 3$ et traduire en heures.



10 Le bénéfice d'un atelier

Un atelier fabrique x centaines d'objets, avec $0 \leq x \leq 6$. Son bénéfice $B(x)$, en milliers d'euros, est donné par la courbe.


- Pour quelles productions l'atelier est-il bénéficiaire, c'est-à-dire $B(x) > 0$?
- Pour quelles productions le bénéfice atteint-il au moins 3 000 € ?
- Donner le signe de B sur $[0; 6]$.



11 Une ville industrielle

La courbe donne la population d'une ville industrielle, en dizaines de milliers d'habitants. L'abscisse compte les décennies depuis 1900 (chiffres d'un modèle).


- Dresser le tableau de variations de la population de 1900 à 2020.
- Quand la population est-elle la plus grande ? Combien d'habitants ?
- En quelles années la ville comptait-elle 50 000 habitants ?



12 Deux jeunes entreprises

La figure donne le chiffre d'affaires de deux jeunes entreprises, en millions d'euros, en fonction des années (chiffres d'un modèle) : A en bleu, B en orange.


- De combien augmente le chiffre d'affaires de A chaque année ? Et celui de B ?
- Décrire la croissance de chacune.
- À partir de quelle année B fait-il au moins autant que A ?



13 La balance commerciale

La courbe donne le solde commercial d'un pays (exportations moins importations), en dizaines de milliards d'euros, sur sept ans (chiffres d'un modèle).


- Dresser le tableau de signes du solde sur $[0; 6]$.
- Pendant quelles années le pays est-il en déficit (solde négatif) ?



14 Les ventes d'un jeu vidéo

La courbe donne le nombre total d'exemplaires vendus d'un jeu vidéo, en millions, en fonction du nombre d'années depuis sa sortie (chiffres d'un modèle).


- a) Donner les variations du nombre total de ventes.
- b) Combien d'exemplaires sont vendus pendant chacune des quatre années ?
- c) La croissance accélère-t-elle ou ralentit-elle ?
- d) Quand atteint-on 7 millions ?



15 La qualité de l'air

La courbe donne la concentration C de particules fines dans l'air d'une grande ville, en dizaines de $\mu\text{g}/\text{m}^3$, au cours d'une journée. Une unité horizontale vaut 3 heures, depuis minuit (chiffres d'un modèle). L'horizontale marque le seuil d'information : $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$.


- a) Résoudre graphiquement $C(x) > 5$.
- b) Traduire en heures de la journée.



16 La marée

La courbe donne la hauteur d'eau h dans un port, en mètres, en fonction du temps t , en heures (modèle simplifié : une vraie marée suit une courbe arrondie).

- Dresser le tableau de variations de h sur $[0; 9]$.
- À quelles heures la mer est-elle haute ? basse ?
- Un bateau a besoin d'au moins 5 m d'eau. Résoudre $h(t) \geq 5$.



★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. Sans calculatrice.


Rappel de cours

- On lit, on traduit, on répond avec l'unité : « de 6 h à 12 h », « entre 100 et 500 objets ».
- Inégalité stricte ($<$, $>$) : crochets ouverts. Inégalité large ($\leq$, $\geq$) : crochets fermés.
- Un tableau de variations se lit sur les changements de SENS ; un tableau de signes, sur les passages par l'AXE.

17 Deux placements

Deux capitaux, en milliers d'euros, sont placés pendant trente ans ; l'abscisse compte les décennies (chiffres d'un modèle). Le capital L (en bleu) gagne la même somme chaque décennie ; le capital E (en orange) double à chaque décennie, et ses points sont reliés par des segments.


- Décrire la croissance de chaque capital.
- Donner les variations de L et de E sur $[0; 3]$.
- Résoudre graphiquement $E(x) \geq 4$.
- Au bout de dix ans, puis de trente ans, quel placement est le meilleur ?



18 Le bénéfice d'une coopérative

Une coopérative agricole produit x tonnes de fromage par mois, avec $0 \leq x \leq 8$. Son bénéfice $B(x)$, en milliers d'euros, est donné par la courbe (chiffres d'un modèle).


- Dresser le tableau de variations de B sur $[0; 8]$.
- Dresser son tableau de signes.
- Résoudre $B(x) \geq 1,5$ et interpréter.
- Quelle production conseiller ?



19 Un bassin minier

La courbe donne la production de charbon d'un bassin minier, en dizaines de millions de tonnes par an. L'abscisse compte les décennies depuis 1900 (chiffres d'un modèle).


- Décrire les variations de la production de 1900 à 2000.
- Quand la production est-elle la plus forte ?
- Résoudre graphiquement $P(x) \geq 5$ et traduire en années.



20 Le chômage et ses cycles

La courbe donne le taux de chômage T d'un pays, en %, de 2000 à 2020. Une unité horizontale vaut deux ans, à partir de 2000 (chiffres d'un modèle).

- Pendant quelles périodes le chômage baisse-t-il ?
- Résoudre graphiquement $T(x) \geq 8$ et traduire en années.
- Comparer la hausse de 2004 à 2008 et celle de 2016 à 2020 : laquelle est la plus rapide ?



Corrigés : résolution graphique, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On trace l'horizontale d'ordonnée k , et on lit les abscisses des points d'intersection.

$f(x) = 0$: la courbe coupe l'axe des abscisses en -1 et en 3 . $S = \{-1; 3\}$.

$f(x) = -3$: $S = \{0; 2\}$.

$f(x) = -5$: l'horizontale passe sous le point le plus bas, d'ordonnée -4 . Aucune solution : $S = \emptyset$.

⚠ Les solutions sont des **ABSCISSES** : répondre « -3 », c'est recopier la question.

2. $f(x) < 0$: la courbe est **SOUS** l'axe des abscisses entre -1 et 3 . $S =]-1; 3[$, crochets ouverts car l'inégalité est stricte.

$f(x) \geq 5$: la courbe est au-dessus de l'horizontale d'ordonnée 5 pour $x \leq -2$ et pour $x \geq 4$. Sur $[-3; 5]$: $S = [-3; -2] \cup [4; 5]$.

⚠ En -1 et en 3 , $f(x) = 0$: ce n'est pas « < 0 », d'où les crochets ouverts.

3. On repère où la courbe coupe l'axe des abscisses : en -2 et en 3 .

Avant -2 , la courbe est au-dessus de l'axe : $f(x) > 0$.

Entre -2 et 3 , elle est en dessous : $f(x) < 0$.

Après 3 , elle est de nouveau au-dessus : $f(x) > 0$.

⚠ Le signe de $f(x)$ se lit par rapport à l'axe **HORIZONTAL**, pas selon que la courbe monte ou descend.

4. On parcourt la courbe de gauche à droite.

De $x = -2$ à $x = -1$, elle **MONTE** de -2 à 2 .

De -1 à 1 , elle **DESCEND** de 2 à -2 .

De 1 à 2 , elle remonte de -2 à 2 .

★ La première ligne du tableau porte les abscisses où la courbe change de sens ; la seconde, les ordonnées de ces points.

⚠ Une flèche qui monte veut dire « croissante » : on n'y écrit pas de signe.

x	-2	-1	1	2
f	-2	2	-2	2

5. a) Bleue : de 1 à 3 , puis de 5 à 7 : $+2$ à chaque fois.

Orange : de 1 à 2 ($+1$), puis de 5 à 10 ($+5$).

b) La bleue augmente à vitesse constante : c'est une droite, une croissance linéaire.

L'orange augmente de plus en plus vite : la courbe se redresse, la croissance accélère.

⚠ « Croissante » ne dit pas **COMMENT** on monte : les deux sont croissantes, mais pas de la même façon.

6. La courbe coupe l'axe des abscisses en -1 et en 3 : ce sont les valeurs où $f(x) = 0$.

Au-dessus de l'axe avant -1 : $+$. En dessous entre -1 et 3 : $-$. Au-dessus après 3 : $+$.

★ C'est la même lecture que « $f(x) < 0$ » à l'exercice 2 : le tableau de signes range toutes ces réponses d'un coup.

7. La courbe descend jusqu'à son point le plus bas, $(1; -4)$, puis remonte.

$f(-3) = 9 + 6 - 3 = 12$ et $f(5) = 25 - 10 - 3 = 12$: ces valeurs sortent du dessin, on les calcule.

f est décroissante sur $[-3; 1]$ et croissante sur $[1; 5]$. Son minimum est -4 , atteint en $x = 1$.

⚠ Le minimum est -4 , une ordonnée ; il est atteint **EN** 1 , une abscisse. Deux nombres, deux rôles.

x	-3	1	5
f	12		12

-4

8. $f(x) = 2$: l'horizontale d'ordonnée 2 touche la courbe en $x = -1$ (la bosse) et en $x = 2$ (le bout). $S = \{-1; 2\}$.

$f(x) \leq -2$: la courbe ne descend jamais sous -2 ; elle y est en $x = -2$ et en $x = 1$. $S = \{-2; 1\}$.

$f(x) > 2$: la courbe ne monte jamais au-dessus de 2. $S = \emptyset$.

⚠ Une inéquation peut avoir pour solutions quelques points isolés, ou rien du tout : ce n'est pas toujours un intervalle.

9. Une journée d'hiver en montagne

a) La courbe coupe l'axe des abscisses en $x = 3$ et en $x = 7$. Elle est en dessous avant 3, au-dessus entre 3 et 7, en dessous après 7.

b) $T(x) < 0$ pour x dans $[0; 3[$ et dans $]7; 8]$. En heures : de minuit à 9 h, puis de 21 h à minuit.

c) L'horizontale d'ordonnée 3 coupe la courbe en $x = 4$ et en $x = 5,5$, au milieu de 5 et 6. $S = [4; 5,5]$: de 12 h à 16 h 30.

⚠ On convertit : $x = 3$, ce n'est pas 3 h, c'est $3 \times 3 = 9$ h.

x	0	3	7	8
$T(x)$		- 0	+ 0	-

10. Le bénéfice d'un atelier

a) La courbe est au-dessus de l'axe entre 1 et 5 : $S =]1; 5[$. Entre 100 et 500 objets, bornes exclues.

b) $B(x) \geq 3$: la courbe est au-dessus de l'horizontale d'ordonnée 3 entre 2 et 4. $S = [2; 4]$: de 200 à 400 objets.

c) B est négatif sur $[0; 1[$, nul en 1, positif sur $]1; 5[$, nul en 5, négatif sur $]5; 6]$.

⚠ En $x = 1$ et en $x = 5$, le bénéfice est nul : l'atelier ne perd rien, mais ne gagne rien non plus. D'où les crochets ouverts en a).

11. Une ville industrielle

a) La courbe monte de 1900 à 1960, descend de 1960 à 2000, puis remonte jusqu'en 2020.

b) Au sommet, en 1960 ($x = 6$) : 8 dizaines de milliers, soit 80 000 habitants.

c) 50 000 habitants, c'est 5. L'horizontale d'ordonnée 5 coupe la courbe trois fois : en $x = 3$, $x = 9$ et $x = 12$, soit en 1930, 1990 et 2020.

★ Ce modèle raconte une ville qui grandit avec ses usines, décline quand elles ferment, puis repart un peu.

⚠ Une équation lue sur une courbe peut avoir trois solutions : on suit l'horizontale jusqu'au bout.

année	1900	1960	2000	2020
P	20 000	80 000	40 000	50 000

12. Deux jeunes entreprises

a) A : 2, 3, 4, 5 : +1 million par an. B : 1, 2, 4, 8 : il DOUBLE chaque année.

b) A croît à vitesse constante : une droite. B croît de plus en plus vite : chaque hausse est le double de la précédente (+1, +2, +4).

c) En année 2, les deux valent 4 millions ; en année 3, B fait 8 contre 5. B fait au moins autant que A à partir de l'année 2.

⚠ Au début, B est derrière : une croissance qui double finit par dépasser une croissance constante, mais pas tout de suite.

13. La balance commerciale

- a) La courbe touche l'axe en $x = 2$ et en $x = 5$. Le solde est positif avant 2, négatif entre 2 et 5, positif après 5.
- b) Déficit pour x dans $]2; 5[$: entre l'année 2 et l'année 5, le pays importe plus qu'il n'exporte.
- ★ Solde positif : un excédent, le pays vend plus qu'il n'achète. Solde négatif : un déficit.
- ⚠ En $x = 4$, le solde remonte, mais il reste négatif : monter n'est pas être positif.

x	0	2	5	6
solde	$+ 0$	$- 0$	$+$	

14. Les ventes d'un jeu vidéo

- a) Le total est croissant sur $[0; 4]$: un total de ventes ne peut que monter.
- b) 4, puis 3, puis 2, puis 1 million : ce sont les hausses d'une année sur l'autre.
- c) Elle ralentit : chaque année, on vend moins que l'année d'avant. La courbe s'aplatit.
- d) Au bout de 2 ans.
- ⚠ Un total qui augmente de moins en moins vite reste croissant : ralentir n'est pas baisser.

15. La qualité de l'air

- a) La courbe est strictement au-dessus de l'horizontale entre 2 et 4, puis entre 6 et 7,5 : de 7 à 8, elle descend de 7 à 3 et passe à 5 au milieu. $S =]2; 4[\cup]6; 7,5[$.
- b) $x = 2 : 6 \text{ h}$; $x = 4 : 12 \text{ h}$; $x = 6 : 18 \text{ h}$; $x = 7,5 : 22 \text{ h } 30$. Le seuil est dépassé de 6 h à 12 h, puis de 18 h à 22 h 30.
- ★ Deux pics dans la journée, sans doute ceux des trajets du matin et du soir.
- ⚠ Une réunion de deux intervalles s'écrit avec $\cup$: « dans l'un, ou dans l'autre ».

16. La marée

- a) La hauteur monte de 2 à 8 entre 0 et 3 h, descend de 8 à 2 entre 3 h et 6 h, remonte de 2 à 8 entre 6 h et 9 h.
- b) Pleine mer à 3 h et à 9 h (8 m) ; basse mer à 6 h (2 m).
- c) La courbe est à 5 m au milieu de chaque montée ou descente : en 1,5, 4,5 et 7,5. $S = [1,5; 4,5] \cup [7,5; 9]$: de 1 h 30 à 4 h 30, puis à partir de 7 h 30.
- ★ Environ six heures entre une pleine mer et une basse mer : c'est le rythme des marées sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique.
- ⚠ 1,5 h, c'est 1 h 30 min, pas 1 h 50.

t	0	3	6	9
h	2	8	2	8


17. Deux placements

- a) L : +2 milliers par décennie, une croissance à vitesse constante (une droite). E : $\times 2$ par décennie, une croissance qui accélère (+1, +2, +4).
- b) Les deux sont croissants sur $[0; 3]$.
- c) La courbe orange est au-dessus de l'horizontale d'ordonnée 4 à partir de $x = 2$: $S = [2; 3]$, de la vingtième à la trentième année.
- d) Au bout de dix ans : $L = 3$ milliers, $E = 2$: L est meilleur. Au bout de trente ans : $L = 7$, $E = 8$: E est meilleur.
- ★ La croissance qui double finit par gagner : c'est la force des intérêts composés sur le long terme.
- ⚠ Sur une courte durée, le placement qui double n'est pas forcément le meilleur.

18. Le bénéfice d'une coopérative

- a) La courbe monte de -6 (en 0) à 2 (en 4), puis redescend à -6 (en 8).

- b) Elle coupe l'axe en 2 et en 6 : B est négatif sur $[0; 2[$, positif sur $]2; 6[$, négatif sur $]6; 8]$.
- c) La courbe est au-dessus de l'horizontale d'ordonnée 1,5 entre 3 et 5 : $S = [3; 5]$. Entre 3 et 5 tonnes, le bénéfice est d'au moins 1 500 €.
- d) 4 tonnes par mois : c'est là que le bénéfice est le plus grand, 2 000 €.
- ⚠ Sous 2 tonnes, la coopérative perd de l'argent ; au-delà de 6 tonnes aussi.
- ★ Le tableau de variations dit où est le maximum ; le tableau de signes dit où l'on gagne de l'argent. Ce sont deux questions différentes.

x	0	4	8
B			

x	0	2	6	8	
$B(x)$	-	0	+	0	-

19. Un bassin minier

- a) Croissante de 1900 à 1930, décroissante de 1930 à 1940, croissante de 1940 à 1960, puis décroissante jusqu'en 2000, où elle s'arrête.
- b) En 1960 ($x = 6$) : 7 dizaines de millions, soit 70 millions de tonnes.
- c) L'horizontale d'ordonnée 5 touche la courbe en $x = 3$, puis la courbe est au-dessus de $x = 5$ à $x = 7$. $S = \{3\} \cup [5; 7]$: en 1930, puis de 1950 à 1970.
- ⚠ En $x = 3$, la courbe touche l'horizontale sans passer au-dessus : cette solution est un point isolé.
- ★ Le modèle raconte un creux autour de 1940, puis le déclin des mines.

20. Le chômage et ses cycles

- a) La courbe descend sur $[0; 2]$ et sur $[6; 8]$: de 2000 à 2004, puis de 2012 à 2016.
- b) L'horizontale d'ordonnée 8 touche la courbe en $x = 0$, puis la courbe est au-dessus de $x = 3$ à $x = 7$. $S = \{0\} \cup [3; 7]$: en 2000, puis de 2006 à 2014.
- c) De 2004 à 2008 (x de 2 à 4), le taux passe de 6 à 10 : +4 points en quatre ans. De 2016 à 2020, de 6 à 7 : +1 point seulement. La première hausse est quatre fois plus rapide.
- ⚠ $x = 3$ correspond à $2000 + 3 \times 2 = 2006$: on convertit avec l'échelle.
- ★ Entre 2008 et 2012, le taux reste à 10 % : la courbe est plate, le chômage ne varie pas.