11. Sluch, Zrak

Sluch


= jeden z pěti smyslů, založený na percepci akustických signálů; jeho podstatou je transformace mechanických zvukových vln na elektrické akční potenciály

Akustika


- zvuk = mechanické vlnění pružného prostředí ve frekvenčním rozsahu lidského sluchu (16 - 20kHz)
- frekvence (kmitočet, výška) = počet kmitů prostředí za vteřinu; rozsah lidské řeči
 100Hz 8kHz
- rychlost zvuku = závisí na charakteru prostředí, kterým zvuková vlna prochází; při
 20°C činí ve vzdušném prostředí 433m/s
- vlnová délka = vzdálenost mezi dvěma vrcholy zvukových vln; v metrech [m]
- akustický tlak = změny tlaku prostředí způsobené akustickou vlnou; v pascalech [Pa]
- intenzita zvuku (hladina intenzity) = množství akustické energie, která projde určitou plochou ve směru kolmém na šíření zvuku; v decibelech [dB]
- hlasitost = subjektivní vjem, který vyvolá určitá intenzita zvuku; ve fonech [Ph]; vjem hlastosti není u všech tónů stejný; u frekvencí pod 1kHz a nad 4kH je třeba vyšší intenzity, abychom vnímali tón stejně hlasitě jako u frekvencí mezi 1 - 4kHz

sluchový práh = akustický tlak, který právě ještě vyvolá sluchový vjem

Ucho



Střední ucho



Kladívko je připojeno k bubínku, kloubně spojeno s kovadlinkou a ta zase s třmínkem, jehož stupátko přiklápí a odklápí fenestra ovalis do prostoru vnitřního ucha

Princip

Sluchové kůstky působý jako pákový systém, jenž přenáší vybrace bubínku na pohyby stupátka třmínku proti fenestra ovalis. Jelikož přechodem ze středního do vnitřního ucha se změní prostředí, kudy vlna prochází, z plynného (ve středouší) na kapalné (v hlemýždi středního ucha), přičemž kapalné prostředí vyvíjí zvukové vlně mnohem větší odpor, je třeba zvýšit tlak, jímž zvuková vlna vtrhne do vnitřního ucha. To se děje mechanickou úpravou vzduchu:

- poměrem plochy bubínku (velká plocha) a fenestra ovalis (malinká ploška)
- nerovnorameností pák sluchových kůstek

Následkem toho se tlak zvukový vlny zvýší (asi 22x) a amplituda sníží

Eustachova trubice - u dětí je kratší a leží téměř horizontálně → častá příčina zánětů středního ucha

Myringotomie

Při zánětu středního ucha se provede malá incise bubínku (píchne se do něj) → hnis vyteče ven

Vedení zvuku

- kostní vedení když si přiložím zdroj zvuku na kost kolem ucha, tak něco uslyším
- vzdušné vedení ossikulární

Poruchy sluchu, hluchota

- převodní porucha = překážka v zevním nebo středním uchu
 - ucpání zevního zvukovodu, perforace bubínku, zánět
- percepční porucha = poškození vnitřního ucha, nebo sluchového nervu
 - nádory, poškození nervu ototoxickými antibiotiky
 - presbyakusie = staředká nedoslýchavost ubývá vláskových buněk s věkem

Ladičkové zkoušky

= vyšetření sluchu


- Weberova zkouška (lateralizační) patka rozezvučené ladičky se přiloží na temeno hlavy (prostě na hlavu), vnímáme vzukový vjem v obou uších; za normálních okolností je intenzita zvukového vjemu v obou uších stejná
 - převodní jednostranná porucha postižené ucho slyší lépe
 - percepční jednostranná porucha zdravé ucho slyší lépe lateralizace vjemu
- Rinneho zkouška porovnává dobu, pro kterou vyšetřovaný slyší zvuk rozezvučené ladičky pri kostním vedení a vzdušném vedení
 - pozitivní zkouška slyšení vzdušným vedením je 2x delší než slyšení kostním vedením
 - negativní zkouška vnímání zvuku kostním vedením trvá déle nežli vedení vzdušnou cestou
- Schvabachova zkouška porovnává, jak dlouho trvá vjem zvuku cestou kostního vedení u pacienta a vyšetřujícího
 - převodní jednostranná porucha kostní vedení je u pacienta prodloužené
 - percepční jednostranná porucha kostní vedení je u pacienta zkrácené

Zrak

= pro člověka nejdůležitější smysl; až 90% informací je získáváno ze zraku

- vnímáme elektromagnetické světelné záření o vlnové délce 400 760nm
- převod z fotochemického procesu v sítnici na bioelektrické podněty
- vidíme prostorově; černobíle i barevně

Části oka




Čočka

- průhledná, na povrchu; lze sloupnout
- základní plocha je více vyklenutá
- má asi 18 D+
- zavěšena na corpus ciliare pomocí fibrae zonulares (fakt se učit nebudu)
- při zákalu čočky, je možná výměna

Akomodace

= proces, při kterém se zvětšuje optická mohutnost čočky při pohledu na blízké předměty




Blízký bod = bod ležící nejblíže oku, který lze při maximální akomodaci vidět ostře

- u dětí do několika cm
- s věkem se vzdaluje od oka

Daleký bod = nejvzdálenější bod od oka, který lze ještě vidět ostře bez akomodace

- leží ve vzdálenosti více než 6m od oka

Zraková dráha




- 1. neuron tyčinky a čípky sítnice
- 2. neuron bipolární buňky sítnice
- 3. neuron gangliové buňky sítnice
- 4. neuron buňky v corpus geniculatum laterale primární zraková korová oblast sekundární zraková korová oblast

Poruchy zraku

Hemianopsie

- = označení výpadku postihujícího polovinu zorného pole
 - heteronymní postiženy jsou různé poloviny zorného pole obě nasální, či obě temporální
 - homonymní obě stejnostranné levé, nebo pravé
 - bitemporální hemianopsie způsobena lézí chismatu tumor
 - binasální hemianopsie způsobena zevní bilaterální kompresí chiasmatu při oboustranném aneurysmatu karotidy

Poruchy zrakové dráhy



- 1. stejnostranná slepota
- 2. heteronymní bitemporální hemianopsie
 - 3. heteronymní binasální hemianopsie
 - 4. kontralaterální homonymní

hemianopsie

- 5. kontralaterální homonymní hemianopsie
- 6. kontralaterální kvadrantová hemianopsie
- 7. kontralaterální kvadrantová hemianopsie s centrální úsporou

Emetropické oko

= paprsky rovnoběžné s osou oka se protínají na sítnici, aniž by docházelo k akomodaci

Krátkozrakost

- = příliš dlouhý bulbus, velká lomovitost optické soustavy
 - korekce rozptylkami → divergence paprsků

Dalekozrakost

- = příliš krátky bulbus, malá lomovitost optické soustavy
 - korekce spojkami → konvergence paprsků

Vetchozrakost

- = ztráta akomodační schopnosti čočky
 - korekce spojkami

Astigmatismus

- = oko nemá ve všech meridiánech stejnou optickou mohutnost
 - nerovnoměrné zakřivení rohovky

Barvoslepost

- = za normálních okolnosti vidímě všechny barvy správně trichromat
 - protanopie ztráta vnímání červené barvy
 - deuteranopie ztráta vnímání zelené barvy
 - tritanopie ztráta vnímání modré barvy

