

$$\begin{array}{l} 37 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} x_1 - x_2 = 0 \quad (1) \\ 3x_1 - 2x_2 = -1 \quad (2) \end{array} \right.$$

$$(1) \rightarrow x_1 = x_2$$

$$(2) \quad 3x_1 - 2x_1 = -1$$

$$\underline{x_1 = -1 = x_2}$$

$$\begin{array}{l} 39 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} 3u + v = 240 \\ -3u + u + 3v = 240 \quad (1) \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{l} 3u + v = 240 \\ -3u - 9v = -720 \\ \hline -8v = -480 \\ \underline{v = 60} \end{array}$$

$$(1) \quad u = 240 - 3(60) \\ \underline{= 60}$$

$$\#49 \left\{ \begin{array}{l} 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 1 \quad (1) \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = 3 \quad (2) \\ 2x_1 - 3x_2 + 6x_3 = 8 \quad (3) \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{l} 3(2) - (1) \left\{ \begin{array}{l} 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 1 \\ x_2 - 2x_3 = 8 \quad (4) \\ -5x_2 + 10x_3 = 22 \quad (5) \end{array} \right. \end{array}$$

$$\begin{array}{l} (5) + 5(4) \left\{ \begin{array}{l} 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 1 \\ x_2 - 2x_3 = 8 \\ 0 = 42 \Rightarrow (\text{impossible}) \end{array} \right. \end{array}$$

No solution.

$$\#1 \begin{bmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 3 & -4 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ size: } \begin{matrix} 3 \times 3 \\ R & C \end{matrix}$$

$$\#3 \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 \\ -6 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ size } \begin{matrix} 2 \times 4 \\ R. & C. \end{matrix}$$

$$\#11 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 0 \\ x_2 = 2 \end{matrix}$$

$$19 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ Reduced}$$

$$\#31 \begin{cases} x_1 - 3x_3 = -2 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 5 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -2 \\ 3 & 1 & -2 & 5 \\ 2 & 2 & 1 & 4 \end{array} \right] \begin{matrix} R_2 - 3R_1 \\ R_3 - 2R_1 \end{matrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 7 & 11 \\ 0 & 2 & 7 & 8 \end{array} \right] R_3 - 2R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 7 & 11 \\ 0 & 0 & -7 & -14 \end{array} \right] \begin{matrix} \rightarrow x_1 - 3x_3 = -2 \quad (2) \\ \rightarrow x_2 + 7x_3 = 11 \quad (1) \\ \rightarrow -7x_3 = -14 \\ \underline{x_3 = 2} \end{matrix}$$

$$(1) \underline{x_2 = 11 - 14 = -3}$$

$$(2) \underline{x_1 = -2 + 6 = 4}$$

$$\underline{\underline{\therefore (4, -3, 2)}}$$

#33
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_3 = 3 \\ 4x_1 - 3x_2 + 7x_3 = 5 \\ 8x_1 - 9x_2 + 15x_3 = 10 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 3 & 3 \\ 4 & -3 & 7 & 5 \\ 8 & -9 & 15 & 10 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_2 - 2R_1 \\ R_3 - 4R_1 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & -3 & 1 & -1 \\ 0 & -9 & 3 & -2 \end{array} \right] R_3 - 3R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & -3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow 0 = 1 \text{ (imp)}$$

\therefore No solution

#43
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{array}{l} x_1 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 = -x_3 \end{array}$$

let $x_3 = t \Rightarrow x_2 = -t$

$\therefore (0, -t, t)$

#49 $A = \begin{bmatrix} 1 & k & 2 \\ -3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ Augmented matrix

a) 2 eqns w 2 variables.

b) $\begin{bmatrix} 1 & k & 2 \\ -3 & 4 & 1 \end{bmatrix} R_2 + 3R_1$

$$\begin{bmatrix} 1 & k & 2 \\ 0 & 4+3k & 7 \end{bmatrix}$$

For the system to be consistent: $4+3k \neq 0$
 $\Rightarrow k \neq -\frac{4}{3}$ $k \in \mathbb{R} - \{-\frac{4}{3}\}$

\rightarrow

#49 cont

System is homogeneous.

$$a) \begin{bmatrix} 1 & k & 2 & | & 0 \\ -3 & 4 & 1 & | & 0 \end{bmatrix} \quad \text{2 eqns w/ 3 variables}$$

$$b) R_2 + 3R_1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & k & 2 & | & 0 \\ 0 & 4+3k & 7 & | & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{aligned} & x_1 + kx_2 + 2x_3 = 0 \quad (2) \\ & (4+3k)x_2 + 7x_3 = 0 \quad (1) \end{aligned}$$

$$k \in \mathbb{R}$$

$$x_1 = t$$

$$x_2 = -\frac{7}{4+3k}x_3$$

$$x_3 = s$$

#1/ (2, 5) (3, 2) (4, 5)

a) $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$

$$p(2) = \begin{cases} a_0 + 2a_1 + 4a_2 = 5 \\ a_0 + 3a_1 + 9a_2 = 2 \\ a_0 + 4a_1 + 16a_2 = 5 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 9 & 2 \\ 1 & 4 & 16 & 5 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_2 - R_1 \\ R_3 - R_1 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 5 & -3 \\ 0 & 2 & 12 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_3 - 2R_2 \\ a_0 + 2a_1 + 4a_2 = 5 \quad (2) \end{array}$$


$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{array} \right] \begin{array}{l} a_1 + 5a_2 = -3 \quad (1) \\ 2a_2 = 6 \Rightarrow \underline{a_2 = 3} \end{array}$$

$$(1) \rightarrow \underline{a_1 = -3 - 15 = -18}$$

$$(2) \rightarrow \underline{a_0 = 5 + 36 - 12 = 29}$$

$$\underline{p(x) = 29 - 18x + 3x^2}$$

b)



#5/ $(-1, 3) (0, 0) (1, 1) (4, 58)$

a) $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$

$p(-1) \quad a_0 - a_1 + a_2 - a_3 = 3 \quad (1)$

$p(0) \quad \underline{a_0} = \underline{0}$

$p(1) \quad a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 1 \quad (2)$

$p(4) \quad a_0 + 4a_1 + 16a_2 + 64a_3 = 58 \quad (3)$

$(1) \rightarrow -a_1 + a_2 - a_3 = 3 \quad +$

$(2) \rightarrow \underline{a_1 + a_2 + a_3 = 1}$

$2a_2 = 4 \Rightarrow \underline{a_2 = 2}$

$(2) \Rightarrow a_1 + a_3 = -1$

$(3) \rightarrow 4a_1 + 64a_3 = 58 - 32 = 26$

$\begin{array}{l} -2x \downarrow \\ \left. \begin{array}{l} a_1 + a_3 = -1 \\ 2a_1 + 32a_3 = 13 \end{array} \right\} \end{array}$


$\left. \begin{array}{l} -2a_1 - 2a_3 = 2 \\ 2a_1 + 32a_3 = 13 \end{array} \right\}$

$30a_3 = 15 \Rightarrow \underline{a_3 = \frac{1}{2}}$

$\underline{a_1 = -1 - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}}$

$\therefore p(x) = -\frac{3}{2}x + 2x^2 + \frac{1}{2}x^3$

b)



#17

let assume $x=0$ @ year 1990

$$\Rightarrow (0, 249)$$

$$2000 \rightarrow (10, 282)$$

$$2010 \rightarrow (20, 309)$$

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

$$P(0): \underline{a_0 = 249}$$

$$P(10): \begin{cases} a_0 + 10a_1 + 100a_2 = 282 \end{cases}$$

$$P(20): \begin{cases} a_0 + 20a_1 + 400a_2 = 309 \end{cases}$$

$$\times (-2) \begin{cases} 10a_1 + 100a_2 = 33 \quad (1) \\ 20a_1 + 400a_2 = 60 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -20a_1 - 200a_2 = -66 \\ 20a_1 + 400a_2 = 60 \end{cases}$$

$$\underline{200a_2 = -6} \Rightarrow \underline{a_2 = -\frac{3}{100}}$$

$$\begin{aligned} (1) \rightarrow 10a_1 &= 33 + 3 \\ \underline{a_1 = \frac{36}{10} = \frac{18}{5}} \end{aligned}$$

$$p(x) = 249 + \frac{18}{5}x - \frac{3}{100}x^2$$

$$\text{year: } 2020 \rightarrow x = 30$$

$$p(30) = 249 + 18(6) - 27 = \underline{330 \text{ mill}} \quad \text{in } 2020$$

$$\text{year } 2030 \rightarrow x = 40$$

$$\begin{aligned} p(40) &= 249 + 18(8) - 3(16) \\ &= \underline{345 \text{ million}} \quad \text{in } 2030 \end{aligned}$$

#23 a)

$$\begin{cases} x_3 = x_1 + 100 \\ x_1 = 200 + x_2 \\ x_4 = 100 + x_2 \\ x_3 = 200 + x_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_3 = 100 \\ x_1 - x_2 = 200 \\ -x_2 + x_4 = 100 \\ x_3 - x_4 = 200 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & 1 & 0 & 100 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 200 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 100 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 200 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ R_2 + R_1 \\ \\ -R_1 \\ -R_2 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} +1 & 0 & -1 & 0 & 100 \\ 0 & +1 & -1 & 0 & -300 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 100 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 200 \end{array} \right] R_3 + R_2$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & -100 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -300 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -200 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 200 \end{array} \right] R_4 + R_3$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & -100 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -300 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -200 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{l} x_1 - x_3 = -100 \\ x_2 - x_3 = -300 \\ -x_3 + x_4 = -200 \end{array}$$

or

$$\text{Let } x_4 = t$$

$$x_3 = t + 200$$

$$x_2 = t + 200 - 300 = t - 100$$

$$x_1 = -100 + t + 200$$

$$\begin{cases} x_1 = t + 100 \\ x_2 = t - 100 \\ x_3 = t + 200 \\ x_4 = t \end{cases}$$

$$b) \quad t = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 100 \\ x_2 = -100 \\ x_3 = 200 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

#23. cont.

c) $x_4 = 100 = t.$

$$\begin{cases} x_1 = 200 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 300 \\ x_4 = 100 \end{cases}$$

d) $x_1 = 2x_2$

$$t + 100 = 2(t - 100)$$

$$t + 100 = 2t - 200$$

$$\underline{t = 300}$$

$$\begin{cases} x_1 = 400 \\ x_2 = 200 \\ x_3 = 500 \\ x_4 = 300 \end{cases}$$