

Professor: Fred Khoury

1. Let  $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$  be the Euclidean inner product on  $\mathbb{R}^2$ , and let  $\mathbf{u} = (3, -2)$ ,  $\mathbf{v} = (4, 5)$ , and  $k = 4$ .

Verify the following for the weighted Euclidean inner product  $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 3u_1v_1 + 4u_2v_2$

a)  $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$                       b)  $\langle k\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = k\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$

2. Which of the following form orthonormal sets?

a)  $\left( \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \left( \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right)$  in  $\mathbb{R}^3$

b)  $\left( \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right), \left( 0, \frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}} \right), \left( \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{\sqrt{3}}{6}, -\frac{\sqrt{3}}{6} \right), \left( 0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$

3. Use the Gram-Schmidt process to find an orthonormal basis for the subspaces of  $\mathbb{R}^m$ .

a)  $x_1 = (1, 1), x_2 = (1, 2)$

b)  $x_1 = (1, 2), x_2 = (1, 3)$

c)  $x_1 = (1, 2, 2), x_2 = (2, 1, 3)$

d)  $v_1 = (1, -1, -1, 1), v_2 = (2, 1, 0, 1), v_3 = (2, 2, 1, 2)$

4. Find the  $QR$ -decomposition of

a)  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$                       b)  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

5. Determine if the matrix is orthogonal. For those that is orthogonal find the inverse

a)  $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$                       b)  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

c)  $\begin{pmatrix} \cos \theta \sin \theta & -\cos \theta & -\sin^2 \theta \\ \cos^2 \theta & \sin \theta & -\cos \theta \sin \theta \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}$

## Solution

1.

2. a) *Orthonormal* b) *Orthonormal*

3. a)  $v_1 = (1, 1), v_2 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right); q_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), q_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

b)  $q_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right), q_2 = \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$

c)  $q_1 = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right), q_2 = \left(\frac{8}{3\sqrt{26}}, -\frac{11}{3\sqrt{26}}, \frac{7}{3\sqrt{26}}\right)$

d)  $q_1 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), q_2 = \left(\frac{3\sqrt{5}}{10}, \frac{3\sqrt{5}}{10}, \frac{\sqrt{5}}{10}, \frac{\sqrt{5}}{10}\right), q_3 = \left(-\frac{\sqrt{6}}{6}, 0, \frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right)$

4. a)  $Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{3}{\sqrt{12}} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{12}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{12}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{12}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} R = \begin{pmatrix} 2 & \frac{3}{2} & 1 \\ 0 & \frac{3}{\sqrt{12}} & \frac{2}{\sqrt{12}} \\ 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$

b)  $Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3\sqrt{5}}{10} & -\frac{\sqrt{6}}{6} \\ -\frac{1}{2} & \frac{3\sqrt{5}}{10} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{5}}{10} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{5}}{10} & \frac{\sqrt{6}}{3} \end{bmatrix} R = \begin{pmatrix} 2 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & \sqrt{5} & \frac{3\sqrt{5}}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} \end{pmatrix}$

5. a) *Orthogonal*  $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$

b) *Orthogonal*  $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

c) *Orthogonal*  $\begin{pmatrix} \cos\theta\sin\theta & \cos^2\theta & \sin\theta \\ -\cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin^2\theta & -\cos\theta\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$