

# Single Variables

## Volume of Solid of Revolution

**Solid:**  $V = \int_a^b A(x) dx$

**Disk:**  $V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx$  (about  $x$ -axis)  $V = \pi \int_c^d [R(y)]^2 dy$  (about  $y$ -axis)

**Washer:**  $V = \pi \int_a^b \left( [R(x)]^2 - [r(x)]^2 \right) dx$  (about  $x$ -axis)

$$V = \pi \int_c^d \left( [R(y)]^2 - [r(y)]^2 \right) dy$$
 (about  $y$ -axis)

**Shell:**  $V = 2\pi \int_a^b y \cdot g(y) dy$  (about  $x$ -axis)  $V = 2\pi \int_a^b x \cdot f(x) dx$  (about  $y$ -axis)

$$V = \int_a^b 2\pi \left( \begin{matrix} \text{shell} \\ \text{radius} \end{matrix} \right) \left( \begin{matrix} \text{shell} \\ \text{height} \end{matrix} \right) dx$$

**Length**  $y = f(x)$   $L = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$   $x = g(y)$   $L = \int_c^d \sqrt{1 + g'(y)^2} dy$

**Parametric Curve:**  $L = \int_a^b \sqrt{f'(t)^2 + g'(t)^2} dt$   $\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$

**Area of the Surface**  $S = 2\pi \int_a^b y \sqrt{1 + \left( \frac{dy}{dx} \right)^2} dx$

$$S = 2\pi \int_c^d x \sqrt{1 + \left( \frac{dx}{dy} \right)^2} dy = 2\pi \int_c^d g(y) \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

**Trapezoid Rule:** 
$$\int_a^b f(x) dx \approx T(n) = \left( \frac{1}{2} f(x_0) + \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + \frac{1}{2} f(x_n) \right) \Delta x$$

where  $\Delta x = \frac{b-a}{n}$  and  $x_k = a + k\Delta x$  for  $k = 0, 1, \dots, n$

**Simpson's Rule:**

$$\int_a^b f(x) dx \approx S(n) = \left[ f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \dots + 4f(x_{n-1}) + f(x_n) \right] \frac{\Delta x}{3}$$

where  $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ ,  $n$  is even and  $x_k = a + k\Delta x$  for  $k = 0, 1, \dots, n$

**Polar Coordinates**

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \quad \begin{cases} r^2 = x^2 + y^2 \\ \theta = \tan^{-1} \left( \frac{y}{x} \right) \end{cases}$$

**Slope of the Curve**  $r = f(\theta)$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(f(\theta_0), \theta)} = \frac{f'(\theta_0) \sin \theta + f(\theta_0) \cos \theta_0}{f'(\theta_0) \cos \theta_0 - f(\theta_0) \sin \theta_0}$$

**Length of Polar Curve:** 
$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{f(\theta)^2 + g(\theta)^2} d\theta$$

**Area of Region between Polar Curves:**

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} (f(\theta)^2 - g(\theta)^2) d\theta \quad f(\theta) \geq g(\theta) \geq 0$$