# Dzień 1 - Model liniowy - grafika

# Spis treści


Model liniowy - grafika																1														
Wykres 1																														4
Wykres 2																														7
Wykres 3																														7
Wykres 5																														8
Ćwiczenia																														9


#### Model liniowy - grafika


Wersja pdf


Załadujmy w R jak poprzednio:

```
library(tidyverse)
devtools::install_github("kassambara/datarium")
data("marketing", package = "datarium")
model <- lm(sales ~ youtube + facebook + newspaper, data = marketing)
plot(model)</pre>
```











plot(model, which = 1)




Ręcznie możemy to uzyskać:

```
plot(model$fitted.values, model$residuals, ylab = "Residuals", xlab = "Fitted values", )
lines(lowess(model$fitted.values, model$residuals), col='red', lwd=2)
```



Rysunek 1:




Wyjaśnienie na rysunku:

 $\'{x}\'{r}\'{o}dlo~zdjecia:~https://stats.stackexchange.com/questions/76226/interpreting-the-residuals-vs-fitted-values-plot-for-verifying-vs-fitted-values-plot-for-verifying-vs-fitted-values-plot-for-verifying-vs-fitted-values-plot-for-verifying-vs-fitted-values-plot-for-verifying-vs-fitted-values-plot-for-verifying-vs-fitted-values-plot-for-verifying-vs-fitted-values-plot-for-verifying-vs-fitted-vs-fitted-vs-fitted-vs-fitted-vs-fitted-vs-fit$ 

# Wykres 2


```
plot(model, which = 2)
```



Wykres Q-Q (kwantylowo-kwantylowy) informuje, na ile dopasowanie odbiega od rozkładu normalnego.

#### Wykres 3


```
plot(model, which = 3)
```



Ten wykres pokazuje, czy reszty są równomiernie rozłożone wzdłuż zakresów dopasowanych wartości. W ten sposób można sprawdzić założenie równej wariancji (homoscedastyczność). To dobrze, jeśli jest linia pozioma z równomiernie umieszczonymi punktami.

#### Wykres 5

```
plot(model, which = 5)
```



Wykres pokazuje jednorodność wariancji. Cel: linia ciągła jest pozioma, punkty równomiernie rozłożone, brak linii przerywanej. Dokładniejsze wytłumaczenie: link.

# Ćwiczenia

1. Wygerenuj w R idealny rozkład zgodny z liniową regresją wielokrotną np. za pomocą kod:

```
n <- 1000
x1 <- runif(n, min = 0, max = 100)
x2 <- runif(n, min = 0, max = 100)
y.good <- 5 + 0.2 * x1+14*x2 + rnorm(n, sd = 3)</pre>
```

Przetestuj model i przeanalizuj wykresy.

2. Przetestuj błędny model np.

```
y.bad < -5+sin(x1)+x2*x2+rnorm(n,sd=4)
```

3. Przeanalizuj wykresy dla ramek danych ze wcześniejszych ćwiczeń.