



દિવેલા પાકની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

ખેતી નિયામકની કચેરી
કૃષિભવન, ગાંધીનગર

દિવેલા

દિવેલા આપણા રાજ્ય અને દેશનો અખાદ્ય તેલીબીયાનો નિકાસલક્ષી પાક છે. દિવેલાના તેલનો ઉપયોગ દવાથી માંડીને વિવિધ ઉદ્યોગમાં થાય છે. દિવેલાની ચિકાશના ગુણને લીધે તે એન્જિનના ઉજણમાં, રંગ-રસાયણ બનાવવા માટે અને વિવિધ ઔદ્યોગિક બનાવટો જેવી કે પ્લાસ્ટીક, સાબુ, છાપકામની શાહી, મીણ, રબર, કોસ્મેટીક અને દવાઓમાં વપરાય છે. છોડના માવાનો ઉપયોગ પુંઠા અને સમાચારપત્રો માટેના કાગળોની બનાવટમાં કરવામાં આવે છે. દિવેલાના ખોળમાં રહેલ રેસીન નામના કેફી તત્ત્વને લીધે તે પશુઓનાં ખાણદાણમાં વાપરી શકાતો નથી. પરંતુ જમીનની ફળદ્રુપતા સુધારવા સેન્દ્રિય ખાતર તરીકે તે ખૂબ જ ઉપયોગી છે.

દુનિયામાં દિવેલાના પાકનું વાવેતર મુખ્યત્વે ભારત, ચીન, બ્રાઝીલ, થાઈલેન્ડ, ઈથોપીયા, પાકિસ્તાન, ફીલીપાઈન્સ, સુદાન વગેરે દેશોમાં થાય છે. દિવેલાનું વાવેતર કરતાં દુનિયાના મુખ્ય દેશો કરતાં ઉત્પાદન અને હેક્ટર દીઠ ઉત્પાદકતામાં ભારત પ્રથમ સ્થાન ધરાવે છે. આપણા દેશમાં દિવેલાનું વાવેતર મુખ્યત્વે ગુજરાત, રાજસ્થાન, આંધ્રપ્રદેશ, તામિલનાડુ અને કર્ણાટકમાં કરવામાં આવે છે. ભારતના દિવેલા હેક્ટરના કુલ વિસ્તારમાં ગુજરાત રાજ્યનો ફાળો ૩૫ થી ૪૦% જેટલો છે. ગુજરાતમાં અંદાજે ૭ થી ૮ લાખ હેક્ટર વાવેતર વિસ્તારમાંથી અંદાજે ૧૮ થી ૨૦ લાખ ટન જેટલું વાર્ષિક ઉત્પાદન થાય છે. મુખ્યત્વે મહેસાણા, પાટણ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, કચ્છ, સુરેન્દ્રનગર અને ગાંધીનગર જિલ્લાઓમાં તેનું વાવેતર મોટા પાયા પર થાય છે. ગુજરાતમાં દિવેલાની પ્રતિ હેક્ટરે ઉત્પાદકતા ૧૮૦૦ થી ૨૧૦૦ કિ.ગ્રા. છે. દિવેલામાં વધુ ઉત્પાદન આપતી સંકર જાતો વિકસાવવામાં ગુજરાત દુનિયામાં તેમજ દેશમાં પહેલું રાજ્ય છે. ઓછા વરસાદ સામે ટકી રહેવાની શક્તિ, ઓછા ખર્ચે વધુ આર્થિક વળતર તથા ઓછા રોગ-જીવાતના પ્રશ્નોને કારણે આ પાક દિવસે દિવસે મધ્ય ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત અને રાજ્યના અન્ય વિસ્તારમાં ખેડૂતો અપનાવતા થયા છે.

જમીન અને આબોહવા :

દિવેલાને જુદા જુદા પ્રકારની સારી નિતારશક્તિ ધરાવતી જમીન વધુ માફક આવે છે. પાણી ભરાઈ રહેતું હોય તેવી ભારે કાળી અને ક્ષારીય જમીન ઓછી માફક આવે છે. સારા નિતારવાળી, મધ્યમકાળી, ગોરાડું અને રેતાળ જમીનમાં આ પાકનો વિકાસ સારો થાય છે. આ પાકને જીવનકાળ દરમ્યાન ઓછામાં ઓછા ભેજ સાથે મધ્યમ ઉષ્ણતામાનવાળુ (૨૦ થી ૨૬ સે.) હવામાન વધુ માફક રહે છે. આ પાક વધુ પડતી ઠંડી અને હિમ સહન કરી શકતો નથી.

પ્રાથમિક ખેડ અને ખાતર :

દિવેલા લાંબાગાળાનો પાક હોઈ વધુ ઉત્પાદન લેવા માટે હેક્ટર દીઠ ૧૦ થી ૧૨ ટન છાણિયું ખાતર એક ટન દિવેલી ખોળ આપવો. પ્રાથમિક ખેડ પહેલા છાણિયું ખાતર, જમીનમાં નાખીને એક હળની અને બે થી ત્રણ કરબની ખેડ કરી સમાર મારી જમીન સમતલ કરવી. છાણિયું ખાતર કે દિવેલી ખોળ ન મળી શકે તો જુનના પ્રથમ અઠવાડિયે ગુવાર કે શણનો લીલો પડવાશ કરવો.

દિવેલા પાકને નાઈટ્રોજન તત્વની જરૂરિયાત વધુ રહે છે. પિયત અને બિનપિયત પરિસ્થિતિમાં ખાતરની જરૂરિયાત જુદી-જુદી રહે છે.

બિનપિયત દિવેલાનું અર્થક્ષમ રીતે વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે ૪૦ કિલોગ્રામ નાઈટ્રોજન અને ૩૦ કિલોગ્રામ ફોસ્ફરસનો તમામ જથ્થો વાવણી વખતે પાયાના ખાતર તરીકે આપવો. તેમ છતાં નાઈટ્રોજન ખાતરને બે સરખા હપ્તામાં વહેંચી પહેલો હપ્તો વાવણી વખતે પાયાના ખાતર તરીકે અને બીજો હપ્તો વાવણી પછી પાક ૩૦-૩૫ દિવસનો થાય અને જમીનમાં ભેજ હોય ત્યારે પૂર્તિ ખાતર તરીકે આપવો.

પિયત દિવેલામાં હેક્ટરદીઠ ૭૫ કિલોગ્રામ નાઈટ્રોજન અને ૫૦ કિલોગ્રામ ફોસ્ફરસ તત્વ આપવાની ભલામણ છે. તેમાંનો ૩૭.૫ કિલો નાઈટ્રોજન અને ૫૦ કિલોગ્રામ ફોસ્ફરસ વાવેતર વખતે જમીનમાં આપવો તેમજ ૧૮.૭૫ કિલો

નાઈટ્રોજન વાવણી બાદ ૪૦ દિવસે અને ફરીથી તેટલો જ જથ્થો વાવણી બાદ ૭૦ દિવસે આપવો.

ક્રમ	ભલામણ કરેલ તત્વ ના. ફો. તત્વો (કિ.ગ્રા./હે.)	રાસાયણિક ખાતરનું પ્રમાણ (કિ.ગ્રા./હે.)	સમય
૧	૩૭.૫-૫૦-૦૦	૧૦૮ ડીએપી, ૩૮ યુરિયા	વાવતી વખતે
૨	૧૮.૭૫-૦૦-૦૦	૪૧ યુરિયા	૪૦ દિવસે
૩	૧૮.૭૫-૦૦-૦૦	૪૧ યુરિયા	૭૦ દિવસે

જમીનમાં જો સલ્ફર તત્વની ઉણપ હોય તો હેક્ટરે ૨૦ કિ.ગ્રા. સલ્ફર (૧૨૫ કિ.ગ્રા. જીપ્સમના રૂપમાં) આપવાથી ઉત્પાદનમાં વધારો થાય છે.

દિવેલા પાકમાં હેક્ટર દીઠ વધુ આર્થિક વળતર મેળવવા માટે હેક્ટરે ૧૨૦-૫૦-૦૦ નાઈટ્રોજન તથા ફોસ્ફરસ (કિ.ગ્રા.) આપવાની ભલામણ છે.

ક્રમ	ભલામણ કરેલ તત્વ ના. ફો. તત્વો (કિ.ગ્રા./હે.)	રાસાયણિક ખાતરનું પ્રમાણ (કિ.ગ્રા./હે.)	સમય
૧	૪૦-૫૦-૦૦	૧૦૮ ડીએપી, ૩૮ યુરિયા	વાવતી વખતે
૨	૩૦-૦૦-૦૦	૬૫ યુરિયા	૪૦ દિવસે
૩	૩૦-૦૦-૦૦	૬૫ યુરિયા	૭૦ દિવસે
૪	૨૦-૦૦-૦૦	૪૨ યુરિયા	૧૦૦ દિવસે

શણનો લીલા પડવાશ કરવાથી ૪૦% રાસાયણિક ખાતરની બચત થાય છે અને ઉત્પાદનમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળે છે.

જાતની પસંદગી અને બીજની માવજત :

કોઈપણ પાકમાં વધુ ઉત્પાદન મેળવવા જેમ બિયારણની જાત પસંદ કરવી એ ઘણું જ મહત્વનું અંગ છે તેમ દિવેલામાં પણ નીચે મુજબ ભલામણ કરેલ સુધારેલી જાતો/સંકર જાતોમાંથી પસંદગી કરી વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.

બીજને વાવતા પહેલા બીજ જન્ય રોગોથી છોડના રક્ષણ માટે ફૂગનાશક દવા થાયરમ એક કિલો બીજ દીઠ ૩ ગ્રામ અથવા બાવીસ્ટીન ૧ ગ્રામ પ્રમાણે બીજને પટ આપી વાવણી કરવી. દિવેલાની હાઈબ્રીડ જાતો માટે પ્રમાણિત બિયારણ વાપરવાનો આગ્રહ રાખવો.

ગુજરાત રાજ્યની દિવેલાની સુધારેલી જાતો/સંકર જાતોની માહિતી

જાત	બહાર પાડ્યાનું વર્ષ	પિતૃઓ	પાકવાના દિવસો	ઉત્પાદન કિ.ગ્રા./હે.	ઓળખ માટેના ચિન્હો
જ.એ.યુ.સી.-૧	૧૯૭૩	વીઆઈ-૯	૧૫૦-૧૮૦	૧૨૪૨	લીલુ થડ, ત્રિછારીય કાંટાવાળા ગોગડા
જસી-૨	૧૯૮૩	૧-૨૧ x વીઆઈ-૯	૧૪૦-૧૮૦	૧૫૪૭	લાલ થડ, ત્રિછારીય કાંટાવાળા ગોગડા
જસી-૩	૨૦૦૭	(જે.પી.-૬૫ x જે.આઈ. ૮૮) x ૪૮-૧	૨૧૦	૨૩૪૦	લાલ થડ, ત્રિછારીય કાંટાવાળા ગોગડા
જએયુસીએય-૧	૧૯૭૩	વીપી-૧ x વીઆઈ-૯	૧૪૦-૨૪૦	૧૫૧૮	લીલુ થડ ત્રિછારીય કાંટાવાળા ગોગડા
જસીએય-૨	૧૯૮૫	વીપી-૧ x જેઆઈ-૩૫	૧૩૦-૨૧૨	૧૭૪૭	લીલુ છાંટવાળુ થડ ત્રિછારીય

જાત	બહાર પાડવાનું વર્ષ	પિતૃઓ	પાકવાના દિવસો	ઉત્પાદન કિ.ગ્રા./હે.	ઓળખ માટેના ચિન્હો
જીસીએચ-૪	૧૯૮૬	વીપી-૧ x ૪૮-૧	૧૫૦-૨૪૦	૧૯૮૫	લાલથડ, ત્રિછારીય મધ્યમ કાંટાવાળા ગોગડા
જીસીએચ-૫	૧૯૮૮	ગીતા x એસ. એચ.-૭૨	૧૫૫-૨૪૦	૨૨૮૦	લાલથડ, દ્વિછારીય મધ્યમ કાંટાવાળા ગોગડા
જીસીએચ-૬	૨૦૦૦	જેપી-૬૫ x જેઆઈ-૮૬	૨૧૦	૨૩૪૮	લાલથડ, દ્વિછારીય કાંટાવાળા ગોગડા
જીસીએચ-૭	૨૦૦૫	એસકેપી-૮૪ x એસકેઆઈ-૨૧૫	૨૧૦-૨૧૫	૨૪૫૬	લાલથડ, ત્રિછારીય મધ્યમ કાંટાવાળા ગોગડા

વાવણીનો સમય :

સામાન્ય રીતે દિવેલાની વાવણી જુલાઈ થી ઓગસ્ટ મધ્ય સુધીમાં કરવી. ઓગસ્ટ માસમાં વાવણી કરવાથી પાકને ઘોડીયા ઈયળ તથા ડોડવા કોરી ખાનાર ઈયળોના ઉપદ્રવથી બચાવી શકાય છે. બિનપિયત દિવેલાની વાવણી ચોમાસામાં વાવણી લાયક વરસાદ થયે તુરત જ કરી દેવી. મોડી વાવણી કરવાથી ઉત્પાદન ઘટે છે. મોડી વાવણી (ઓક્ટોબર) માટે જીસીએચ-૫ જાતની પસંદગી કરવી.

પિયત વિસ્તાર માટે ૧૫ જુલાઈ થી ૧૫ ઓગસ્ટ સુધીમાં વાવણી કરવામાં આવે તો પણ ઉત્પાદનમાં આર્થિક તફાવત પડતો નથી અને પાકને ઘોડીયા ઈયળનાં નુકશાનથી બચાવી શકાય છે.

વાવણી અંતર અને બીજનો દર :

વાવણીનું અંતર સામાન્ય રીતે જમીનની ફળદ્રુપતા પર આધાર રાખે છે. બિનપિયત માટે ૮૦ × ૪૫ સે.મી. અને પિયત વાવેતરમાં હલકી જમીન માટે ૮૦ × ૬૦ સે.મી. તેમજ ફળદ્રુપ જમીન માટે ૧૨૦-૧૫૦ × ૬૦ સે.મી.નું અંતર રાખવું.

થાણીને વાવેતર માટે ૫ કિ.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટરે જ્યારે બીજ હળની પાછળ ઓરીને ૮ થી ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટરે બીજનો દર રાખવો જોઈએ. પાકના ઉગાવા પછી પડેલ ખાલામાં બીજ વાવીને ખાલા તરત જ પુરી દેવા.

આંતરખેડ અને નિંદામણ :

દિવેલાના પાકને શરૂઆતમાં ૪૫ થી ૬૦ દિવસ નિંદામણ મુક્ત રાખવો અને આ સમય દરમ્યાન બે થી ત્રણ આંતરખેડ અને એક થી બે નિંદામણ કરવા. દિવેલામાં મુખ્ય માળ આવી જાય તેમજ ડાળીઓમાં માળો આવી જાય પછી આંતરખેડ કરવી નહીં. દિવેલાના પાકમાં શરૂઆતનાં દિવસોમાં નિંદામણ ન કરવામાં આવે તો ૩૦ ટકા જેટલું ઉત્પાદન ઘટે છે. નિંદામણનાશક દવાઓ જેવી કે ફલ્યુકલોરાલીન અને ટ્રાયફલ્યુરાલીન ૧.૦ કિલો સક્રિય તત્વ/હેક્ટર લેખે ઉગાવા પહેલાં છાંટવાની ભલામણ છે.

પિયત :

દિવેલાના પાકને તેના જીવનકાળ દરમ્યાન જમીનની પ્રત મુજબ ૭ થી ૮ પિયત આપવાની ભલામણ છે. પ્રથમ પિયત વરસાદ બંધ થયા પછી ૨૦ દિવસે આપવું. ત્યારબાદ બાકીનાં પિયત અંદાજે ૧૫ થી ૨૦ દિવસના ગાળો રાખીને આપવા. જો પાણીની ખેંચ હોય તો વાવણી બાદ અંદાજે ૭૫ દિવસ પછી એક પિયત આપવું.

પાણીની તીવ્ર અછતવાળા વિસ્તારમાં ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિથી પિયત આપવું જેનાથી ૨૪ ટકા પાણી બચે છે તથા ૩૬ ટકા વધુ ઉત્પાદન મળે છે.

દિવેલાની બે હાર વચ્ચે ઉભડી મગફળીની ૩ હાર, આડી મગફળીની એક થી બે હાર, તલની એક હાર અથવા મગ, યોળા, અડદ જેવા કઠોળ વર્ગના પાકો લેવાથી એકલા દિવેલા કરતાં ચોખ્ખી આવક વધુ મળે છે.

પાક ફેરબદલી :

પાક ફેરબદલીથી દિવેલામાં આવતા સુકારાનાં રોગનું સાડું નિયંત્રણ થતું હોઈ બાજરી, જુવાર, અન્ય તેલીબિયાં, કઠોળ વગેરે પાકોમાંથી કોઈપણ એક પાક દ્વારા પાકની ફેરબદલી કરવી હિતાવહ છે.


પાક સંરક્ષણ :

દિવેલાના પાકને રોગ અને જીવાતથી મુક્ત રાખવા નીચે મુજબના પાક સંરક્ષણના પગલાં સમયસર લેવા.

(૧) જીવાત :

(અ) ઘોડીયા ઈયળ :


દિવેલાનો પાક લીધેલ ખેતરમાં ઉનાળામાં ઊંડી ખેડ કરવી જેથી કોશેટાનો નાશ થાય. શક્ય હોય તો એકલ દોકલ દેખાતી ઈયળ વીણાવી નાશ કરવો. છોડ દીઠ ૪ ઈયળો જોવા મળે ત્યારે



કવીનાલફોસ ૨૦ મિ.લિ. અથવા ડાયકલોરોવોસ ૫ મિ.લિ. અથવા ડી.ડી.વી.પી. ૫ મિ.લિ. અથવા કાર્બોરીલ ૪૦ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. વધુ ઉપદ્રવ હોય તો કવીનાલફોસ ૧.૫ ટકા ભૂકી અથવા મિથાઈલ પેરાથીયોન ૨ ટકા ભૂકી દવા હેક્ટરે ૨૫ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે છાંટવી.

(બ) લશ્કરી ઈયળ (પ્રોડેનીયા) :


આ જીવાતના નિયંત્રણ માટે હેક્ટર દીઠ ૫-૬ ફેરોમેન ટ્રેપ ગોઠવી તેમાં પકડાતા નર કુદાનો નાશ કરવો જેથી કુદા દ્વારા મુકાતા ઈંડામાંથી ઈયળો ઓછી પેદા થાય. પાન ઉપર મુકેલા ઈંડા કે ઈયળોનાં સમુહવાળા પાન તોડીને નાશ કરવો. નાની ઈયળોનાં સમુહ ૨૦



છોડ દીઠ ૧૦ જેટલા મળે ત્યારે કલોરપાયરીફોસ ૨૫ મી.લી. દવા અથવા ડી.ડી.વી.પી. ૫ મિ.લિ. દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. મોટી ઈયળો માટે કલોરપાયરીફોસ ૨૦ મિ.લિ. દવા સાથે ડી.ડી.વી.પી. ૫ મિ.લિ. દવા ભેળવી ૧૦ લીટર પાણીમાં ઉમેરી છંટકાવ કરવો.

(ક) ડોડવા કોરી ખાનાર ઈયળ :

આ જીવાતનાં નિયંત્રણ માટે ડી.ડી.વી.પી. ૫ મિ.લિ. દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. અથવા મિથાઈલ પેરાથીઓન ૨



ટકા અથવા કવીનાલફોસ ૧.૫ ટકા ભુકી હેક્ટરે ૨૫ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે છાંટવાથી પણ સારું નિયંત્રણ મેળવી શકાય છે.


(ડ) દિવેલાની સફેદ માખી :



આ જીવાતના નિયંત્રણ માટે એક પાન દીઠ સરેરાશ પાંચ માખીનું પ્રમાણ દેખાય ત્યારે મિથાઈલ પેરાથીઓન ૧૦ મિ.લિ. અથવા ઈથીઓન ૨૦ મિ.લિ. અથવા મિથાઈલ ઓ ડીમેટોન ૧૦ મિ.લિ. અથવા ડાય મીથીએટ ૧૦ મિ.લિ. દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી

છંટકાવ કરવો. લિંબોળીનું તેલ ૫૦ મિ.લિ. ૧૦ લીટર પાણીમાં ડીટરજન્ટ પાવડર સાથેનું દ્રાવણ બનાવી છંટકાવ કરવાથી સફેદ માખીનું નિયંત્રણ ઘટાડી શકાય છે.

(ઈ) તડતડીયા (જેસીડ) અને ગ્રીપ્સ :



આ જીવાતનાં નિયંત્રણ માટે શોષક પ્રકારની દવાઓ જેવી કે ડાયમીથીએટ ૧૦ મિ.લિ./મિથાઈલ-ઓ-ડીમેટોન ૧૦ મિ.લિ. દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં નાખી છંટકાવ કરવો.

(ર) રોગ :

આપણા રાજ્યમાં દિવેલાનાં પાકમાં ફ્યુઝેરીયમ પ્રકારની ફૂગથી થતો છોડનો સુકારો અને મેકોફોમીના પ્રકારની ફૂગથી થતો મૂળનો કોહવારો



જેવા રોગોનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતે બિનપિયત પાકમાં અને પિયત પાકમાં પણ ચોમાસાનો વરસાદ ખેંચાય ત્યારે પિયત ન આપી

શકાય તો મેકોફોમીનાથી થતો મૂળનો કોહવારો વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે.

સુકારાનું નિયંત્રણ :

- પાકની ફેરબદલી કરવી.
- રોગ પ્રતિકારક જાતો જેવી કે જીસીએચ- ૪, ૬ અને ૭ નું વાવેતર કરવું.
- રોગવાળા છોડને ઉપાડી નાશ કરવો.
- પાણી ભરાઈ રહેતું હોય તેવા ખેતરમાં એરંડાનું વાવેતર ન કરવું જોઈએ.
- ૫૦૦ કિલોગ્રામ દિવેલી ખોળમાં ૫ કિલોગ્રામ ટ્રાઈકોડર્મા હારજેનીયમ ફુગના બીજાણું મિશ્રણ કરી વાવણી સમયે પુરતો ભેજ હાય ત્યારે ચાસમાં આપવાથી રોગનું નિયંત્રણ થાય છે.

મુળનો કહોવારાનું નિયંત્રણ :

- ઓછામાં ઓછા ત્રણ વર્ષ સુધી પાકની ફેરબદલી કરવી.
- બીજને થાયરમ ૩ ગ્રામ અથવા કાર્બેન્ડીઝીમ ૧ ગ્રામ પ્રતિ કીલો દીઠ ફુગનાશક દવાનો પટ આપવો.



- રોગ પ્રતિકારક જાતોનું વાવેતર કરવું. (જીસીએચ-૨, ૬)
- તંદુરસ્ત બીજ પસંદ કરવું.
- ઉપર મુજબ ટ્રાઈકોડર્મા હારજેનીયમ ફુગ અને દિવેલીનો ખોળ પાયામાં આપવો. રોગવાળા છોડને ઉપાડી નાશ કરવો.

કાપણી :

વાવણી બાદ લગભગ ૧૦૦ થી ૧૧૦ દિવસે મુખ્ય માળ પીળી પડી જઈ કાપણી લાયક બનશે. માળમાં અંદાજે અડધા ડોડવા પાકી જાય અને બાકીના ડોડવા પીળા પડે તે માળ પાકવાની નિશાની છે. કાપણી લગભગ ત્રણ થી ચાર માસ સુધી ચાલુ રહે છે. કારણ કે, બધી માળો એક સાથે પાકતી નથી. બધી માળો ઉતરી જાય ત્યારે ખળામાં બળદથી પગર કરી અથવા દિવેલા કાઢવાના શ્રેસરથી દાણા છૂટા પાડી સાફ કરી વેચાણ માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે.

ઉત્પાદન :

જમીનની જાત, પ્રત અને હવામાનની અનુકૂળતા મુજબ પિયત પાકમાં હેક્ટરે ૩૦૦૦ કિ.ગ્રા. અને બિન પિયત પાકમાં હેક્ટરે ૧૨૦૦ થી ૧૫૦૦ કિ.ગ્રા. ઉત્પાદન મળે છે.





કિસાન કોલ સેન્ટર

ટોલ ફ્રી નંબર

૧૫૫૫

(BSNL મોબાઈલ અને લેન્ડલાઈન પરથી)

અન્ય મોબાઈલ માટે

૧૮૦૦-૧૮૦-૧૫૫૫

—●(ટોલ ફ્રી - વિના મૂલ્યે)●—

(સવારે ૬-૦૦ થી રાત્રીના ૧૦-૦૦ કલાક સુધી

વિના મૂલ્યે ફોન કરી કૃષિ વિષયક માર્ગદર્શન મેળવો.)

પ્રોસેસિંગ અને મુદ્રણ : સરકારી ફોટો લીથો પ્રેસ, અમદાવાદ