p-adische Zahlen

Vorlesung im Wintersemester 2026/2027
an der Philipps-Universität Marburg

Panagiotis Konstantis

20. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Motivation **1**
1.1 Hensels Analogie 1
1.2 Ganzzahlige Lösungen von Gleichungen 4

2 p-adische Zahlen **6**
2.1 Der Körper der p-adischen Zahlen 6

1 Motivation

Die *p-adischen Zahlen* wurden von KURT HENSEL[1] eingeführt. Hensels Motivation war, die Eigenschaften des Polynomringes $\mathbb{C}[X]$ in einer Unbekannten X und des zugehörigen Körpers der rationalen Funktionen $\mathbb{C}(X)$ auf die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ und den zugehörigen Quotientenkörper $\mathbb{Q}$ zu übertragen. Wir wollen in diesem Kapitel genau das etwas näher beleuchten. Dabei werden wir nicht mathematisch rigoros vorgehen, aber stattdessen die Idee hinter den p-adischen Zahlen hervorheben.

1.1 Hensels Analogie

Betrachtet man ein Polynom $P \in \mathbb{C}[X]$ und eine komplexe Zahl $\alpha \in \mathbb{C}$, so ist es möglich, etwa mittels einer *Taylor-Entwicklung*, das Polynom in der Form

$$P(X) = a_0 + a_1(X-\alpha) + a_2(X-\alpha)^2 + \ldots + a_n(X-\alpha)^n$$

zu schreiben für gewisse $a_i \in \mathbb{C}$. Dabei sind die Polynome der Form $X-\alpha$ *irreduzibel* in $\mathbb{C}[X]$ und können daher die Rolle einer *Primzahl* im Ring der Polynome einnehmen (und genau das ist auch die richtige Sichtweise). Aus dieser Darstellung lässt sich das Verhalten des Polynoms in allen Punkten nahe α verstehen.

Wir möchten also diese Entwicklung auf natürliche Zahlen übertragen. Ist etwa p eine Primzahl, so wollen wir eine natürliche Zahl in eine Form

$$a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + a_3 p^3 + \ldots + a_n p^n$$

schreiben. Eine solche Darstellung ist uns auch bereits bestens bekannt, denn wir schreiben natürliche Zahlen in der Basis 10 (keine Primzahl!), etwa ist

$$321 = 1 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^2.$$

Wir können aber auch 321 in der Basis $p = 7$ schreiben, etwa

$$321 = 5 + 3 \cdot 7 + 6 \cdot 7^2$$

und in Analogie zur Basis 10 hätten wir hier die Zifferndarstellung 635 in der Basis $p = 7$ der Zahl 321.

Bei der Taylorentwicklung des Polynoms $P(X)$ oben lässt sich durch die Kenntnis der Koeffizienten a_i herauslesen, zu welcher Ordnung sich das Polynom durch $(X-\alpha)$ teilen lässt. Ähnlich dazu lässt sich an der Zifferndarstellung einer Zahl in einer Basis p herauslesen, welches die größte Potenz von p ist, welche die Zahl noch teilt. Für die Zahl 72 in der Basis $p = 3$ gilt

$$72 = 0 + 0 \cdot 3 + 2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3^3$$

[1] Deutscher Mathematiker, 1861 – 1941. Professur für Mathematik an der Philipps-Universität Marburg von 1901 – 1930

und damit ist 2200 die Zifferndarstellung bezüglich $p = 3$ und wir sehen, dass 3^2 die höchste Dreierpotenz ist, welche 72 teilt.

Betrachten wir nun rationale Funktionen, wie etwa

$$f(\mathrm{X}) = \frac{1}{1-\mathrm{X}}.$$

Formal lässt sich f in eine geometrische Reihe entwickeln (Taylor-Entwicklung um $\mathrm{X} = 0$)

$$f(\mathrm{X}) = 1 + \mathrm{X} + \mathrm{X}^2 + \mathrm{X}^3 + \dots$$

und wir sehen, dass

$$\begin{aligned} f(\mathrm{X}) &\equiv 1 \pmod{\mathrm{X}} \\ f(\mathrm{X}) &\equiv 1 + \mathrm{X} \pmod{\mathrm{X}^2} \\ f(\mathrm{X}) &\equiv 1 + \mathrm{X} + \mathrm{X}^2 \pmod{\mathrm{X}^3} \\ &\vdots \end{aligned}$$

gilt. Führen wir die Analogie fort, so hätten wir gerne für eine Primzahl p eine ähnliche Entwicklung, d.h.

$$\frac{1}{1-p} = 1 + p + p^2 + p^3 + \dots$$

doch klarerweise konvergiert diese Reihe nicht in $\mathbb{R}$. Die Idee von p-adischen Zahlen ist es nun, einen geeigneten Konvergenzbegriff einzuführen, sodass

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-p} &\equiv 1 \pmod{p} \\ \frac{1}{1-p} &\equiv 1 + p \pmod{p^2} \\ \frac{1}{1-p} &\equiv 1 + p + p^2 \pmod{p^3} \\ &\vdots \end{aligned}$$

gegen $\frac{1}{1-p}$ konvergiert. Wir sehen an dem Beispiel, dass der Konvergenzbegriff beinhalten muss, dass Teilbarkeit durch eine große Primzahlpotenz als „klein“ gelten soll (ähnlich wie bei der geometrischen Reihe, bei der x^n für $|x| < 1$ für wachsendes n vom Betrag her kleiner wird).

Nehmen wir z.B. $p = 5$, so erhalten wir nach obiger Analogie

$$-\frac{1}{2} = 2 \cdot \frac{1}{1-5} = 2 + 2 \cdot 5 + 2 \cdot 5^2 + \dots$$

was die Darstellung $\dots 222$ ergibt und damit erhalten wir auch

$$\frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2} = \dots 2223.$$

Man beachte, dass wenn wir die Darstellung $\dots 2223$ mit 2 multiplizieren, so erhalten wir $2 \cdot 3 = 6$, was 11 in der Basis $p = 5$ ist, also schreiben wir $\dots 1$ und nehmen die andere 1 mit, für die nächste

Stelle haben wir $2 \cdot 2 = 4$ und mit dem Übertrag $4 + 1 = 5$, was 10 in $p = 5$ ist, also schreiben wir $\ldots 01$ und nehmen die 1 wieder als Übertrag mit. Führen wir das so durch, so erhalten wir die Darstellung

$$\ldots 0001,$$

was gleich 1 ist. Nun lassen sich nicht nur ganze Zahlen p-adisch entwickeln, sondern auch Brüche $x = a/b$ für $a \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{Z}$ und a, b teilerfremd. Wir sagen, dass so ein Bruch durch p *teilbar* ist, wenn p den Nenner b nicht teilt, aber a durch p teilbar ist[2]. Wir wollen also eine Entwicklung der Form

$$x \equiv a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \ldots + a_k p^k \pmod{p^{k+1}}$$

für alle $k \in \mathbb{N}$ mit $a_k \in \{0, \ldots, p-1\}$. Gemäß unserer Hensel-Analogie ist die p-adische Entwicklung durch folgende rekursive Berechnung möglich:

1. Wir beginnen damit, die Kongruenz $a - a_0 b \equiv 0 \pmod{p}$ zu lösen und erhalten a_0. Wir setzen $r_0 = \frac{a - a_0 b}{p}$. Beachte, dass $r_0 \in \mathbb{Z}$ ist, da a_0 so gewählt wurde, dass die Differenz durch p teilbar ist.

2. Für $k \geq 0$ lösen wir die Gleichung $r_k - a_{k+1} b \equiv 0 \pmod{p}$ und setzen $r_{k+1} = \frac{r_k - a_{k+1} b}{p}$.

So erhalten wir die Koeffizienten $a_0, \ldots, a_k, \ldots$ und damit die p-adische Darstellung von x als $(\ldots a_k \ldots a_0)_p$. *Übungsaufgabe: Zeige, dass dieser Algorithmus genau die p-adische Darstellung ergibt.*

Hier ein Beispiel: Wir betrachten $x = \frac{24}{17}$ und wollen nun diesen Bruch 3-adisch entwickeln, also $p = 3$ betrachten.

k	a_k	r_k
0	0	8
1	1	-3
2	0	-1
3	1	-6
4	0	-2
5	2	-12
6	0	-4
7	1	-7
8	1	-8
9	2	-14

und damit ist

$$\frac{24}{17} = \ldots 2110201010_3.$$

Wir wollen noch eine letzte Analogie ziehen. Für manche rationale Funktionen über $\mathbb{C}$ ist eine Taylor-Entwicklung nicht immer möglich, aber dafür eine *Laurent-Entwicklung*. Sind $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ und $f := P/Q$ mit $Q \neq 0$, so gilt

$$f(X) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (X - \alpha)^k.$$

[2] Beachte, dass wenn $p \nmid b$, so auch $p^k \nmid b$ für alle $k > 1$ und damit ist b invertierbar in $\mathbb{Z}_{p^k}$

Z. B. existiert folgende Laurent-Entwicklung:

$$f(\mathrm{X}) = \frac{1}{\mathrm{X}(1+\mathrm{X}^2)} = \frac{1}{\mathrm{X}} - \mathrm{X} + \mathrm{X}^3 - \mathrm{X}^5 + \ldots$$

Analog erwarten wir dann auch für gewisse Brüche eine p-adische Entwicklung

$$x = a_{-k}p^{-k} + a_{-k+1}p^{-k+1} + \ldots + a_{-1}p^{-1} + a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \ldots.$$

Wir erinnern nochmal daran, dass wir in diesem Kapitel auf mathematische Formalität verzichten und eher durch heuristische Überlegungen Zugang zum Gebiet der p-adischen Zahlen erhalten wollen. Die Laurent-Entwicklung mit negativem k erhalten wir dann, wenn der Nenner durch p teilbar ist. Sei wieder $x = \frac{a}{b}$ ein gekürzter und angenommen es ist $m \in \mathbb{N}$ so gewählt, dass $p^m b' = b$ und $p \nmid b'$. Dann können wir wie oben den Bruch $\frac{a}{b'}$ p-adisch entwickeln, etwa

$$\frac{a}{b'} = a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \ldots$$

und multiplizieren dann alles mit p^{-m} und erhalten

$$\frac{a}{b} = a_0 p^{-m} + a_1 p^{-m+1} + a_2 p^{-m+2} + \ldots + a_m + a_{m+1} p + a_{m+2} p^2 + \ldots$$

Betrachten wir etwa $x = \frac{8}{51} = 3^{-1}\frac{8}{17}$. Geht man den Algorithmus für $\frac{24}{17}$ durch, so kann man daraus ablesen, dass

$$\frac{8}{17} = \ldots 211020101_3$$

ist (man entferne die letzte Null, warum?) und damit erhalten wir

$$\frac{8}{51} = \ldots 21102010.1_3$$

also alles entlang des Punktes nach rechts verschieben.

1.2 Ganzzahlige Lösungen von Gleichungen

Angenommen man möchte eine Gleichung der Form $x^2 = y$ mit $y \in \mathbb{Z}$ in den ganzen oder rationalen Zahlen lösen. Eine notwendige Bedingung ist dann

$$x^2 \equiv y \pmod{p^n}$$

für alle $n \in \mathbb{N}$, wobei, wie immer, p eine Primzahl ist. Dabei können wir uns auf die Fälle $x, y \in \mathbb{Z}$ beschränken, denn ist $\frac{a}{b}$ eine rationale Lösung mit $\mathrm{ggT}(a,b) = 1$ und $\mathrm{ggT}(b,p) = 1$, so ist

$$\left(\frac{a}{b}\right)^2 \equiv y \pmod{p^n} \quad \text{äquivalent zu} \quad a^2 \equiv b^2 y \pmod{p^n}.$$

Das ist genau die Idee von Euklids Beweis der Irrationalität von $\sqrt{2}$. Setzen wir $p = 2$, so müsste

$$a^2 \equiv 2b^2 \pmod 2 \quad \text{und} \quad a^2 \equiv 2b^2 \pmod 4$$

sein. Aus der ersten Gleichung folgt $a \equiv 0 \pmod 2$ und aus der zweiten $b \equiv 0 \pmod 2$, was ein Widerspruch zu $\mathrm{ggT}(a,b) = 1$ ist. Analog zeigt man, dass $x^2 = p$ für jede Primzahl p keine rationale Lösung hat.

Die Lösbarkeit einer solchen Gleichung ist eng mit den p-adischen Zahlen verbunden. Angenommen es gäbe $x_n \in \{0,\dots,p^n-1\}$ mit

$$x_n^2 \equiv y \pmod{p^n} \quad \text{und} \quad x_{n+1} \equiv x_n \pmod{p^n}$$

für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 1$, so lässt sich aus der Folge (x_n) eine p-adische Zahl wie folgt bauen: Es existieren $a_n \in \{0,\dots,p-1\}$ mit

$$x_{n+1} = x_n + a_n p^n$$

und setze $a_0 := x_1$. Also

$$x_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} a_k p^k$$

und die (noch) formale Reihe

$$x := a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} a_k p^k$$

definiert nach unserem obigen Verständnis eine p-adische Zahl. Diese *Zahl* löst nun alle unsere quadratischen Kongruenzgleichungen gleichzeitig, denn es gilt

$$x \equiv x_n \pmod{p^n} \quad \text{also} \quad x^2 \equiv x_n^2 \equiv y \pmod{p^n}$$

für alle $n \in \mathbb{N}$. Folglich können wir sagen: Existiert für die Gleichung $x^2 = y$ *keine* p-adische Lösung, so besitzt sie auch keine ganzzahlige oder rationale Lösung. Dieses Vorgehen lässt sich natürlich auf beliebige ganzzahlige Gleichungen anwenden.

Man beachte, dass die Existenz einer p-adischen Lösung einer solchen Gleichung nicht impliziert, dass sie eine ganzzahlige oder rationale Lösung besitzt, wie folgendes berühmtes Beispiel zeigt: Der *Große Satz von Fermat* besagt, dass die Gleichung

$$x^n + y^n = z^n$$

keine ganzzahlige Lösung mit $xyz \neq 0$ und $n > 2$ besitzt[3]. Dass diese Gleichung stets eine p-adische Lösung besitzt, ist relativ einfach zu sehen, falls $p \nmid n$: Nimm $x = 1$, $y = p$ und löse

$$z^n = 1 + p^n$$

p-adisch (Übungsaufgabe). Für $p|n$ gibt es auch eine Möglichkeit eine p-adische Lösung zu konstruieren, nur benötigen wir hierfür etwas mehr Theorie.

14.10.2026
1. Vorlesung

[3] Dieser Satz wurde in der bahnbrechenden Arbeit *Modular elliptic curves and Fermat's Last Theorem* von *Andrew Wiles* bewiesen.

2 p-adische Zahlen

Für dieses Kapitel bezeichne p stets eine Primzahl. Wir wollen nun einen Körper aus $\mathbb{Q}$ und dem p-adischen Betrag definieren.

2.1 Der Körper der p-adischen Zahlen

Sei S die Menge der Folgen (x_n) in $\mathbb{Q}$, sodass für alle $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert mit $|x_n - x_m|_p < \varepsilon$ für alle $n, m > N$. Somit ist S die Menge aller *Cauchy-Folgen* in $\mathbb{Q}$ bezüglich des p-adischen Betrags.

Definition 2.1. Wir definieren auf S folgende Äquivalenzrelation: Zwei Folgen $(x_n), (y_n) \in S$ heißen äquivalent, in Zeichen $(x_n) \sim (y_n)$, falls

$$|x_n - y_n|_p \longrightarrow 0 \quad \text{für } n \to \infty.$$

Wir setzen $\mathbb{Q}_p := S/\sim$. Für $x \in \mathbb{Q}$ sei (x) die konstante Cauchy-Folge in $\mathbb{Q}$, welche nur aus x besteht, und wir bezeichnen mit 0 die Äquivalenzklasse der Folge (0).

Bemerkung 2.2. Nach Definition repräsentiert jede Folge (x_n) mit $\lim_{n\to\infty} |x_n|_p = 0$ die 0 in $\mathbb{Q}_p$. Ist $(x_n), (y_n) \in S$ mit $(x_n) \sim (y_n)$, so ist es möglich endlich viele Folgeglieder von (x_n) beliebig abzuändern und diese neue Folge (x'_n) ist immer noch nach Definition äquivalent zu (y_n).

Wir wollen nun den p-adischen Betrag von $\mathbb{Q}$ auf $\mathbb{Q}_p$ fortsetzen. Dafür benötigen wir:

Lemma 2.3. *Sei $\xi \in \mathbb{Q}_p$ repräsentiert durch eine Folge (x_n). Dann existiert der Grenzwert $\lim_{n\to\infty} |x_n|_p$. Genauer: Es gibt ein $N \in \mathbb{N}$, sodass $|x_n|_p = |x_N|_p$ für alle $n \geq N$ ist. Folglich hängt der Grenzwert nicht von der gewählten Folge ab.*

Beweis. Falls $\xi = 0$, dann ist die Aussage klar. Sei $\xi \neq 0$. Insbesondere bedeutet das, dass $(|x_n|_p)$ keine Nullfolge in $\mathbb{R}$ ist (sonst würde sie $\xi = 0$ repräsentieren). Folglich existiert ein $\varepsilon > 0$, sodass für jedes $N \in \mathbb{N}$ ein $n_0 > N$ existiert mit $|x_{n_0}|_p > \varepsilon$. Wähle nun N so groß, dass $|x_n - x_m|_p < \varepsilon$ für alle $n, m > N$ gilt. Dann ist

$$|x_n - x_{n_0}|_p < \varepsilon \quad \text{für alle } n \geq N.$$

Nach dem Prinzip der gleichschenkligen Dreiecke (siehe Definition **??**) folgt daher $|x_{n_0}|_p = |x_{n_0} + x_n - x_{n_0}|_p = |x_n|_p$ für alle $n \geq N$. Das heißt, dass die Folge $(|x_n|_p)$ irgendwann konstant wird und daher konvergiert.

Sei schließlich (y_n) eine weitere Folge, welche ξ repräsentiert. Dann gilt nach Definition von $\sim$

$$|x_n - y_n|_p \longrightarrow 0$$

für $n \to \infty$. Damit ist aber wegen Lemma **??**

$$||x_n|_p - |y_n|_p| \leq |x_n - y_n|_p \longrightarrow 0$$

für $n \to \infty$, was zu zeigen war. □

Daher ist folgende Definition wohldefiniert:

Definition 2.4. Für $\xi \in \mathbb{Q}_p$ setzen wir

$$|\xi|_p := \lim_{n\to\infty} |x_n|_p,$$

wobei (x_n) das Element ξ repräsentiert.

Bemerkung 2.5. Man beachte, dass $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{Q}_p$ eingebettet ist, indem man für $x \in \mathbb{Q}$ die konstante Folge (x) in S betrachtet. Wir bezeichnen die entsprechende Äquivalenzklasse davon in $\mathbb{Q}_p$ ebenso mit x. In diesem Sinne wurde der p-adische Betrag von $\mathbb{Q}$ auf $\mathbb{Q}_p$ fortgesetzt. Inbesondere bedeutet das, dass

$$|[(x)]|_p = |x|_p$$

ist, wobei die eckigen Klammern die Äquivalenzklasse der konstanten Folge in $\mathbb{Q}_p$ bezeichnet.

Als Nächstes zeigen wir, dass $\mathbb{Q}_p$ ein Körper ist.

Definition 2.6. Seien $\xi, \eta \in \mathbb{Q}_p$ und (x_n) sowie (y_n) Folgen, welche ξ und η repräsentieren. Wir definieren

$$\xi \cdot \eta := [(x_n y_n)],$$
$$\xi + \eta := [(x_n + y_n)],$$

wobei die eckigen Klammern bedeuten, dass wir die Äquivalenzklasse der Folge in $\mathbb{Q}_p$ betrachten.

Lemma 2.7. *Die Multiplikation und die Addition aus Definition 2.6 sind unabhängig von der Wahl der Repräsentanten.*

Beweis. Seien (x'_n) und (y'_n) weitere Folgen, welche ξ und η repräsentieren. Dann gilt

$$\begin{aligned} |x'_n y'_n - x_n y_n|_p &= |x'_n(y'_n - y_n) + y_n(x'_n - x_n)|_p \\ &\leq \max(|x'_n(y'_n - y_n)|_p, |y_n(x'_n - x_n)|_p). \end{aligned}$$

Nach Definition gilt nun

$$\lim_{n\to\infty} |x'_n(y'_n - y_n)|_p = |\xi|_p \cdot 0$$

und analog für den zweiten Term im Maximum. Daher repräsentieren die Produkte die gleiche Äquivalenzklasse. Die Addition zeigt man analog. □

Nachdem wir eine Addition und Multiplikation definiert haben, zeigen wir noch, dass es entsprechende Inverse gibt.

Lemma 2.8. *Sei $\eta \in \mathbb{Q}_p \setminus \{0\}$. Dann existiert ein Repräsentant von (y_n) von η mit $y_n \neq 0$ für*

alle $n \in \mathbb{N}$. Wir definieren

$$\eta^{-1} := \frac{1}{\eta} := [(y_n^{-1})],$$

was unabhängig von der Wahl der Repräsentanten ist mit obiger Eigenschaft.

Beweis. Sei $(y_n) \in S$ mit $[(y_n)] = \eta$. Da $\eta \neq 0$, ist $(|y_n|_p)$ keine Nullfolge und nach Lemma 2.3 existiert ein $N \in \mathbb{N}$, sodass $|y_n|_p$ konstant ist für alle $n \geq N$. Wir setzen nun

$$y_n' := \begin{cases} p & n < N, \\ y_n & n \geq N. \end{cases}$$

Nach Konstruktion ist $y_n' \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und

$$\lim_{n\to\infty} |y_n - y_n'|_p = 0.$$

Daher können wir o. B. d. A. annehmen, dass $y_n \neq 0$ ist für alle $n \in \mathbb{N}$. Als Nächstes zeigen wir, dass (y_n^{-1}) eine Cauchy-Folge ist. Wir rechnen

$$\begin{aligned} \left|\frac{1}{y_n} - \frac{1}{y_m}\right|_p &= \left|\frac{y_m - y_n}{y_m y_n}\right|_p \\ &= \frac{1}{|y_n|_p |y_m|_p} |y_m - y_n|_p \\ &\leq \frac{1}{C} |y_m - y_n|_p, \end{aligned}$$

da für n, m groß genug $|y_n|_p, |y_m|_p \geq C$ ist. Dies zeigt, dass (y_n^{-1}) eine Cauchy-Folge ist. Den Nachweis der Wohldefiniertheit überlassen wir dem Leser. □

Da nun Addition und Multiplikation definiert wurde, fehlt noch zu zeigen, dass das *Distributivgesetz* erfüllt ist.

Lemma 2.9. *Für $\xi, \eta, \zeta \in \mathbb{Q}_p$ gilt*

$$\xi(\eta + \zeta) = \xi\eta + \xi\zeta.$$

Beweis. Seien $(x_n), (y_n), (z_n) \in S$ die entsprechenden Repräsentanten. Dann ist $\xi(\eta + \zeta)$ gegeben durch

$$(x_n(y_n + z_n)) = (x_n y_n + x_n z_n)$$

und letzteres repräsentiert $\xi\eta + \xi\zeta$. □

Somit haben wir gezeigt, das $\mathbb{Q}_p$ ein Körper ist.

Bemerkung 2.10. Sei (X, d) ein metrischer Raum.

(a) Wir sagen eine Teilmenge $Y \subset X$ liegt *dicht* in X, falls für jedes $x \in X$ und jedes $\varepsilon > 0$ ein $y \in Y$ existiert mit $y \in B(x, \varepsilon)$. Mit anderen Worten, für jedes x existiert eine Folge (y_n) aus Y mit $\lim_{n\to\infty} y_n = x$.

(b) Wir sagen, dass (X, d) *vollständig* ist, falls jede Cauchy-Folge aus X in X konvergiert.

Proposition 2.11. *Es gilt*

(a) Das Bild von $\mathbb{Q}$ unter der Inklusion $\mathbb{Q} \to \mathbb{Q}_p$ liegt dicht in $\mathbb{Q}_p$.

(b) $\mathbb{Q}_p$ ist vollständig.

Beweis. Wir zeigen zuerst, dass $\mathbb{Q}$ dicht in $\mathbb{Q}_p$ liegt. Laut Bemerkung 2.5 ist die Inklusion gegeben durch $x \mapsto (x)$. Sei $\xi \in \mathbb{Q}_p$. Wir müssen zeigen, dass jeder Ball um ξ eine konstante Folge enthält. Sei also $\varepsilon > 0$ und (x_n) eine Folge welche ξ repräsentiert. Da dies eine Cauchy-Folge ist, existiert ein $N \in \mathbb{N}$ mit

$$|x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{für alle } n \geq \mathbb{N}.$$

Wir betrachten die Folge (x_N), welche wir mit x_N notieren. Es gilt

$$|\xi - x_N|_p = \lim_{n\to\infty} |x_n - x_N|_p \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

also $x_N \in B(\xi, \varepsilon)$, was zu zeigen war.

Wir kommen nun zur Vollständigkeit von $\mathbb{Q}_p$. Sei dafür (ξ_k) eine Cauchy-Folge in $\mathbb{Q}_p$ und $(x_n^k)_n$ repräsentiere ξ_k. Da $\mathbb{Q}$ dicht in $\mathbb{Q}_p$ liegt, existiert zu ξ_k ein y_k mit

$$|\xi_k - y_k|_p \leq \frac{1}{k}.$$

Zunächst gilt, dass (y_k) eine Cauchy-Folge in $\mathbb{Q}_p$ ist, denn es ist

$$|y_k - y_l|_p \leq |y_k - \xi_k|_p + |\xi_k - \xi_l|_p + |\xi_l - y_l|_p$$

und wählen wir k, l groß genug, wird der ersten und letzte Term klein per Konstruktion und der mittlere, weil (ξ_k) eine Cauchy-Folge ist. Fassen wir nun die y_k als Folge (y_k) in $\mathbb{Q}$ auf, so ist sie dort auch eine Cauchy-Folge, da der Betrag der gleiche ist, siehe Bemerkung 2.5. Damit repräsentiert diese Folge ein Element in $\mathbb{Q}_p$ was wir mit η bezeichnen. Wir behaupten, dass η der Grenzwert der Folge (ξ_k) ist. Zunächst begründen wir, dass (y_k) gegen η in $\mathbb{Q}_p$ konvergiert. Da (y_k) in $\mathbb{Q}$ eine Cauchy-Folge ist, gibt es ein $N \in \mathbb{N}$ mit $|y_n - y_k| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ für $n, k \geq N$. Damit ist aber in $\mathbb{Q}_p$

$$|\eta - y_k|_p = \lim_{n\to\infty} |y_n - y_k|_p \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

für $k \geq N$. Schließlich gilt dann

$$|\xi_k - \eta|_p \leq |\xi_k - y_k|_p + |y_k - \eta|_p \to 0$$

für $k \to \infty$.

□