

第五节

函数展开成幂级数

- 一、主要内容
- 二、典型例题
- 三、同步练习
- 四、同步练习解答

一、主要内容

(一) 函数的幂级数展开式

—— 泰勒 (Taylor) 展开式

1. 函数展开成幂级数

定义 若 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$, $x \in I$ (I 为区间),

则称 $f(x)$ 在 I 上可以展开成 $(x - x_0)$ 的幂级数.

问题: (1) 如果能展开, a_n 是什么?

(2) 展开式是否唯一?

(3) 在什么条件下才能展开成幂级数?



2.定理 (展开式的唯一性)

若在邻域 $U(x_0, R)$ 内任意阶可导的函数

$f(x)$ 能展成幂级数:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n, \quad x \in U(x_0, R)$$

则其系数

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

且展开式是唯一的。



3.定义 (泰勒级数)

设 $f(x)$ 在 x_0 处具有任意阶导数, 则称

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) +$$

$$\frac{f''(x_0)}{2!} (x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n + \cdots$$

为 $f(x)$ 在 x_0 处的 **泰勒级数**.

麦克劳林级数 ($x_0 = 0$):

$$f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \cdots$$

泰勒系数



4. 泰勒级数基本问题

(1) 构造 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$;

(2) 收敛域 ?

(3) 在收敛域 I 内, 级数是否一定收敛到 $f(x)$?

即 $f(x) \stackrel{?}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n, \quad x \in I$

答: 不一定.



(二) 函数展开成幂级数的充分必要条件

定理11.14 设 $f(x)$ 在区间 I 上具有各阶导数, 则 $f(x)$ 在 I 上能展开成泰勒级数, 即

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n, \quad x \in I$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0 \quad (\forall x \in I)$$

$$\text{其中 } R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad (\xi \text{ 在 } x, x_0 \text{ 之间})$$

—— $f(x)$ 的泰勒公式中的余项



(三) 函数展开成幂级数的方法

展开方法 $\left\{ \begin{array}{l} \text{直接展开法 — 用泰勒公式} \\ \text{间接展开法 — 用已有展开式} \end{array} \right.$

(1) 直接展开法

$f(x)$ 展开成 x 的幂级数的 **步骤**:

1° 求 $f^{(n)}(x)$, $f^{(n)}(0)$, $n = 0, 1, 2, \dots$;

2° 写出幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$, 并求收敛半径 R ;

3° 判断 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0?$ $x \in (-R, R)$



(2) 间接展开法

根据展开式的唯一性, 利用常见展开式, 通过变量代换, 四则运算, 恒等变形, 逐项求导, 逐项积分等方法, 求展开式.



二、典型例题

例1 将 $f(x) = e^x$ 展开成 x 的幂级数.

解 1° $f^{(n)}(x) = e^x$, $f^{(n)}(0) = 1$ ($n = 0, 1, \dots$),

2° 写出 e^x 的麦克劳林级数

$$e^x \sim f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots$$

$$\text{即 } 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots + \frac{1}{n!}x^n + \dots$$

$$\text{收敛半径 } R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} \bigg/ \frac{1}{(n+1)!} = +\infty$$

收敛区间:
 $(-\infty, +\infty)$



$$3^\circ \quad e^x \stackrel{?}{=} S(x) = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + \cdots$$

$x \in (-\infty, +\infty)$

$\therefore \forall x \in (-\infty, +\infty)$, 余项满足

$$|R_n(x)| = \left| \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1} \right| \quad (\xi \text{ 介于 } x \text{ 与 } 0 \text{ 之间})$$

$$< e^{|x|} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

收敛级数的

通项 $u_n \rightarrow 0$

(当 $n \rightarrow \infty$ 时)

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + \cdots, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$



例2 将 $f(x) = \sin x$ 展开成 x 的幂级数.

解 1° $f^{(n)}(x) = \sin(x + \frac{n\pi}{2}), f^{(n)}(0) = \sin \frac{n\pi}{2},$

$$\therefore f^{(2k)}(0) = 0, \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$
$$f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k,$$

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \begin{cases} 0, & n = 2k \\ \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}, & n = 2k+1 \end{cases} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

$$2^\circ \sin x \sim \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad \text{收敛半径 } R = +\infty.$$



3° $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, 余项满足

$$\begin{aligned} |R_n(x)| &= \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1} \right| = \left| \frac{\sin\left[\xi + (n+1)\frac{\pi}{2}\right]}{(n+1)!} x^{n+1} \right| \\ &< \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \dots + (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!}x^{2n+1} + \dots$$
$$x \in (-\infty, +\infty)$$



例3 将 $f(x) = (1+x)^m$ 展开成 x 的幂级数
(m : 任意常数).

解 1° $f(0) = 1, f'(0) = m, f''(0) = m(m-1),$
 $f^{(n)}(0) = m(m-1)(m-2) \cdots (m-n+1), \cdots$

2° 麦克劳林级数

$$1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n + \cdots$$

$x \in (-1, 1)$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{m-n} \right| = 1$$



3° 设和函数为 $F(x)$, $-1 < x < 1$

下证: $F(x) = (1+x)^m$.

$$\frac{(m-1)\cdots(m-n)}{n!} + \frac{(m-1)\cdots(m-n+1)}{(n-1)!} = \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}$$

$$F'(x) = m \left[1 + \frac{m-1}{1}x + \cdots + \frac{(m-1)\cdots(m-n+1)}{(n-1)!}x^{n-1} + \cdots \right]$$

$$xF'(x) = m \left[x + \frac{m-1}{1}x^2 + \cdots + \frac{(m-1)\cdots(m-n+1)}{(n-1)!}x^n + \cdots \right]$$

$$\begin{aligned} (1+x)F'(x) &= m \left[1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \cdots \right. \\ &\quad \left. + \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n + \cdots \right] = mF(x) \end{aligned}$$



$$\underline{(1+x)F'(x) = mF(x)}, \quad x \in (-1,1)$$

$$F(0) = 1$$

$$\int_0^x \frac{F'(x)}{F(x)} dx = \int_0^x \frac{m}{1+x} dx,$$

$$\ln F(x) - \underline{\ln F(0)} = m \ln(1+x),$$

$$\therefore F(x) = (1+x)^m, \quad x \in (-1,1)$$



二项展开式:

$$(1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \dots \\ + \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n + \dots \quad (-1 < x < 1)$$

注 1° 在 $x = \pm 1$ 处收敛性与 m 的取值有关 .

2° m 为正整数时, 得二项式定理:

$$(1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \dots + x^m$$



$$(1+x)^m = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!} x^n \quad (-1 < x < 1)$$

3° $m = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$ 时二项展开式分别为

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2 \cdot 4}x^2 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^3 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8}x^4 + \dots$$

$$(-1 \leq x \leq 1)$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}x^2 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^3 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8}x^4 - \dots$$

$$(-1 < x \leq 1)$$



例4 将 $\cos x$ 展开成 x 的幂级数.

解 $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1} \quad x \in (-\infty, +\infty)$

逐项求导:

$$\begin{aligned} \cos x &= (\sin x)' \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!} x^{2n} \\ &= 1 - \frac{1}{2!} x^2 + \frac{1}{4!} x^4 - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots \quad x \in (-\infty, +\infty) \end{aligned}$$



例5 将 $f(x) = \ln(1+x)$ 展开成 x 的幂级数.

解 $[\ln(1+x)]' = \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad (-1 < x < 1)$

$$\begin{aligned}\ln(1+x) &= \int_0^x \frac{1}{1+x} dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x x^n dx, \quad |x| < 1 \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1}, \quad -1 < x \leq 1.\end{aligned}$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1}, \quad -1 < x \leq 1$$

注 取 $x=1$ 得, $\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n+1} + \cdots$



例6 将 $\sin x$ 展成 $x - \frac{\pi}{4}$ 的幂级数.

解 $\sin x = \sin\left[\frac{\pi}{4} + \left(x - \frac{\pi}{4}\right)\right]$

$$= \sin \frac{\pi}{4} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \cos \frac{\pi}{4} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\left(1 - \frac{1}{2!} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + \frac{1}{4!} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^4 - \dots + (-1)^k \frac{\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^{2k}}{(2k)!} + \dots \right) \right. \\ \left. + \left(\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{3!} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3 + \dots + (-1)^k \frac{\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^{2k+1}}{(2k+1)!} + \dots \right) \right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(1 + \left(x - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{2!} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 - \frac{1}{3!} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3 + \dots \right) \\ (-\infty < x < +\infty)$$



例7 将 $\frac{1}{x^2 + 3x + 2}$ 展开成 $x + 4$ 的幂级数 .

解

$$\begin{aligned}\frac{1}{x^2 + 3x + 2} &= \frac{1}{(x + 1)(x + 2)} = \frac{1}{x + 1} - \frac{1}{x + 2} \\&= -\frac{1}{3(1 - \frac{x + 4}{3})} + \frac{1}{2(1 - \frac{x + 4}{2})} \\&= -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x + 4}{3} \right)^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x + 4}{2} \right)^n \quad |x + 4| < 2 \\ \therefore \frac{1}{x^2 + 3x + 2} &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}} \right) (x + 4)^n \\ &\quad (-6 < x < -2)\end{aligned}$$



例8 将 $\arcsin x$ 展开成 x 的幂级数

解 $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = [1 + (-x^2)]^{-\frac{1}{2}}$

取二项展开式中 $m = -\frac{1}{2}$, 得

$$\begin{aligned}(1+x)^{-\frac{1}{2}} &= 1 - \frac{x}{2} + \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}}{2!} x^2 - \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2}}{3!} x^3 + \dots \\&= 1 - \frac{x}{2} + \frac{3!!}{4!!} x^2 - \frac{5!!}{6!!} x^3 + \dots + \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} (-1)^n x^n + \dots \\&= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n \quad (-1, 1)\end{aligned}$$



— x^2 代替 x 得

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{3!!}{4!!}x^4 + \dots + \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^{2n} + \dots$$

$$= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n}$$

$$\arcsin x = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$\arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)}, \quad x \in (-1,1)$$

$$(1+x)^{-\frac{1}{2}} = 1 +$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n$$

(−1,1)



若 $0 < a < b$,

则 $\frac{a}{b} < \frac{a+1}{b+1}$

又因当 $x=1$ 时, $1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{1}{2n+1}$

$$u_n = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{1}{2n+1} < \frac{1}{(2n+1)^{\frac{3}{2}}}$$

令 $v_n = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$, 则

$$v_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} < \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdots \frac{2n}{2n+1} = \frac{1}{v_n} \cdot \frac{1}{2n+1}$$

$$v_n^2 < \frac{1}{2n+1}, \quad v_n < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$$



$$\because u_n = v_n \cdot \frac{1}{2n+1} < \frac{1}{(2n+1)^{\frac{3}{2}}} < \frac{1}{2^{\frac{3}{2}} n^{\frac{3}{2}}}, \text{ 而 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{\frac{3}{2}} n^{\frac{3}{2}}} \text{ 收敛}$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛, 故 } 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{1}{2n+1} \text{ 收敛}$$

$$\text{当 } x = -1 \text{ 时, } -[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{1}{2n+1}] \text{ 收敛}$$

\therefore 展开式成立的范围是 $x \in [-1, 1]$, 即

$$\arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)}, \quad x \in [-1, 1]$$



例9 将 $f(x) = \ln \frac{x}{3-2x}$ 展成 $x-1$ 的幂级数 .

解 $f(x) = \ln x - \ln(3-2x)$

$$= \ln[1 + (x-1)] - \ln[1 - 2(x-1)]$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (x-1)^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{[-2(x-1)]^n}{n}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} + 2^n}{n} (x-1)^n \quad \left(|x-1| < \frac{1}{2} \right)$$

$x = \frac{1}{2}$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} + 2^n}{n} \left(-\frac{1}{2}\right)^n$ 收敛, $x = \frac{3}{2}$ 时发散 .

$$x \in \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right]$$

拆
配
化一
展
范围



三、同步练习

1. 将 $f(x) = \ln(2 + x - 3x^2)$ 在 $x = 0$ 处展为幂级数.

2. 将 $\frac{1}{x^2 + 4x + 3}$ 展成 $x - 1$ 的幂级数.

3. 将函数展开成 x 的幂级数:

$$f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$$

4. 将 $f(x) = x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}$ 展成 x 的幂级数 .



四、同步练习解答

1. 将 $f(x) = \ln(2+x-3x^2)$ 在 $x=0$ 处展为幂级数.

解 $f(x) = \ln(1-x) + \ln 2 + \ln(1 + \frac{3}{2}x)$

$$\ln(1-x) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \quad (-1 \leq x < 1)$$

$$\ln(1 + \frac{3}{2}x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (\frac{3}{2}x)^n \quad (-\frac{2}{3} < x \leq \frac{2}{3})$$

故 $f(x) = \ln 2 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (\frac{3}{2}x)^n$

$$\begin{aligned} 2+x-3x^2 \\ = (1-x)(2+3x) \end{aligned}$$

$$f(x) = \ln 2 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} [1 + (-\frac{3}{2})^n] x^n \quad (-\frac{2}{3} < x \leq \frac{2}{3})$$



2. 将 $\frac{1}{x^2 + 4x + 3}$ 展成 $x-1$ 的幂级数.

解

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{x^2 + 4x + 3} &= \frac{1}{(x+1)(x+3)} = \frac{1}{2(1+x)} - \frac{1}{2(3+x)} \\
 &= \frac{1}{4\left(1 + \frac{x-1}{2}\right)} - \frac{1}{8\left(1 + \frac{x-1}{4}\right)} \quad (|x-1| < 2) \\
 &= \frac{1}{4} \left[1 - \frac{x-1}{2} + \frac{(x-1)^2}{2^2} + \cdots + (-1)^n \frac{(x-1)^n}{2^n} + \cdots \right] \\
 &\quad - \frac{1}{8} \left[1 - \frac{x-1}{4} + \frac{(x-1)^2}{4^2} + \cdots + (-1)^n \frac{(x-1)^n}{4^n} + \cdots \right] \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{2^{n+2}} - \frac{1}{2^{2n+3}} \right) (x-1)^n \quad (-1 < x < 3)
 \end{aligned}$$



3. 将函数展开成 x 的幂级数:

$$f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$$

解 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, \quad x \in (-1, 1)$

$$f(x) - f(0) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x x^{2n} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$$

$x = \pm 1$ 时, 级数条件收敛, $f(0) = \frac{\pi}{4}$, 故

$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad x \in [-1, 1]$$

问题:

$f(x)$ 的
导数 } 易展?
积分 }



4. 将 $f(x) = x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}$ 展成 x 的幂级数 .

解 $f'(x) = (\arctan x + \frac{x}{1+x^2})$

$-\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \arctan x$

$$f''(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad (|x| < 1)$$

不易积分,
试求导数,
再展开.

导函数仍
不易展,再
求导.



$$f'(x) = f'(x) - f'(0) = \int_0^x \underline{f''(x)} \, dx$$

$$= \int_0^x \left[\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \right] dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

$$\begin{aligned} f'(0) \\ &= \arctan 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$f(x) = f(x) - f(0) = \int_0^x f'(x) \, dx$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+2}}{(2n+1)(2n+2)} \quad (-1 \leq x \leq 1)$$

$$x = \pm 1 \text{ 处, } \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} \text{ 收敛.}$$

