

第二节

二重积分的计算(1)

- 一、主要内容
- 二、典型例题
- 三、同步练习
- 四、同步练习解答

一、主要内容

(一) 直角坐标系下二重积分的计算

1. D 为X-型区域

$$D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$$

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(x, y) dx dy$$

$$= \int_a^b \left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right] dx$$

先对 y , 后对 x 积分的二次积分

记作

$$\int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$



2. D 为Y-型区域

$$D = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}$$

$$\iint_D f(x, y) \, d\sigma$$

先对 x , 后对 y 积分的二次积分

$$= \int_c^d \left[\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) \, dx \right] dy$$


记作

$$= \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) \, dx$$



若积分区域既是 X -型区域又是 Y -型区域,

$$\begin{aligned} \text{则有 } & \iint_D f(x, y) d\sigma \\ &= \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \\ &= \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx. \end{aligned}$$



为计算方便, 可选择积分次序,


必要时还可以交换积分次序.



注 1° 对于给定的积分区域 D , 外层积分的上、下限均为常数.

2° 内层积分上下限只能是外层积分变量的函数或常数, 不能与内层积分变量有关.


$$\begin{aligned} & \iint_D f(x, y) d\sigma \\ &= \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \\ &= \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx. \end{aligned}$$



3° 对于 X -型区域 D , 用直线 $x = x$ 由下
至上穿 D , 穿入点所对应的纵坐标为
(出)

内层积分的下限.
(上)


$$\iint_D f(x, y) d\sigma$$
$$= \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$



4° 两种特殊情形

设 $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$, 则

$$\begin{aligned} (1) \quad & \iint_D f(x, y) dx dy \\ &= \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy \\ &= \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx \end{aligned}$$



积分顺序可交换



(2) 当 $f(x, y) = g(x) \cdot h(y)$ 时, 有


$$\begin{aligned} & \iint_D g(x)h(y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y \\ &= \int_a^b \mathrm{d}x \int_c^d g(x)h(y) \mathrm{d}y \\ &= \int_a^b [g(x) \cdot \int_c^d h(y) \mathrm{d}y] \mathrm{d}x \\ &= [\int_a^b g(x) \mathrm{d}x] \cdot [\int_c^d h(y) \mathrm{d}y] \end{aligned}$$



3. D 既不是 X -型区域，也不是 Y -型区域

解决方法：可将它分成若干个 X -型域 或 Y -型域，
如图中区域 D 被分成三个子区域，
则有

$$\iint_D = \iint_I + \iint_{II} + \iint_{III}.$$



计算二重积分的步骤

- 1° 画出积分域;
- 2° 确定积分次序;
- 3° 写出积分限;
- 4° 计算累次积分.



二、典型例题

例1 化二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 为二次积分, 其中


D 是由 $y = x$ 和 $y^2 = 4x$ 所围.

解 D 是 X -型的, $x \in [0, 4]$.

$$\forall x \in (0, 4), \quad x \leq y \leq 2\sqrt{x}.$$

$$D : x \leq y \leq 2\sqrt{x}, \quad 0 \leq x \leq 4,$$


$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_0^4 dx \int_x^{2\sqrt{x}} f(x, y) dy.$$



D 又是 Y -型的, $y \in [0, 4]$.

$$\forall y \in (0, 4), \quad \frac{y^2}{4} \leq x \leq y.$$

$$D : \frac{y^2}{4} \leq x \leq y, \quad 0 \leq y \leq 4,$$



$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_0^4 dy \int_{\frac{y^2}{4}}^y f(x, y) dx.$$



例2 交换下列二次积分的积分次序:

$$(1) \int_0^1 dy \int_{1-y}^{1+y^2} f(x, y) dx;$$

$$(2) \int_1^2 dx \int_1^x xy dy;$$

$$(3) \int_0^1 dx \int_x^{2x} f dy + \int_1^{\sqrt{2}} dx \int_x^{\frac{2}{x}} f dy.$$




解 (1) 由二次积分的积分限可知

$$D : 0 \leq y \leq 1, 1 - y \leq x \leq 1 + y^2,$$

化为先对 y 后 x 的积分,

$$D = D_1 \cup D_2,$$


则有



$$I = \int_0^1 dx \int_{1-x}^1 f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_{\sqrt{x-1}}^1 f(x, y) dy.$$




$$\begin{aligned}
 (2) \quad & \int_1^2 dx \int_1^x xy dy \\
 &= \int_1^2 dy \int_y^2 xy dx
 \end{aligned}$$



$$(3) \quad \int_0^1 dx \int_x^{2x} f dy + \int_1^{\sqrt{2}} dx \int_x^{\frac{2}{x}} f dy$$

$$= \int_0^{\sqrt{2}} dy \int_{\frac{y}{2}}^y f dx + \int_{\sqrt{2}}^2 dy \int_{\frac{y}{2}}^{\frac{2}{y}} f dx$$



例3 计算 $\iint_D xy d\sigma$, 其中 D 是抛物线 $y^2 = x$


及直线 $y = x - 2$ 所围成的闭区域.

解 1° 画 D 的草图

$$\text{求交点: } \begin{cases} y^2 = x \\ y = x - 2 \end{cases}$$

$$y^2 - y - 2 = 0, (y + 1)(y - 2) = 0$$

$$y = -1, y = 2 \quad \text{交点: } (1, -1), (4, 2).$$



2° 选择积分变量, 定限




先对 x , 后对 y 积分

$$I = \iint_D xy \, dx \, dy = \int_{-1}^2 dy \int_{y^2}^{y+2} xy \, dx$$

$$= \int_{-1}^2 \left(\int_{y^2}^{y+2} xy \, dx \right) dy$$


$$= \int_{-1}^2 y \left(\int_{y^2}^{y+2} x \, dx \right) dy$$

$$= \int_{-1}^2 y \cdot \frac{x^2}{2} \bigg|_{x=y^2}^{x=y+2} dy = \frac{1}{2} \int_{-1}^2 y[(y+2)^2 - y^4] dy = \frac{45}{8}.$$



注 若选择先对 y 后对 x 积分的次序,
则有

$$\iint_D xy d\sigma = \iint_{D_1} xy d\sigma + \iint_{D_2} xy d\sigma$$



$$= \int_0^1 \left[\int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} xy dy \right] dx + \int_1^4 \left[\int_{x-2}^{\sqrt{x}} xy dy \right] dx.$$

显然这样计算会麻烦些.



例4 计算二重积分 $\iint_D e^{x^2} d\sigma$, 其中 D 是由直线

$y = x, x = 1$ 和 x 轴围成的三角形区域.


解 D 既是 X -型, 又是 Y -型.

若将积分区域看成 Y -型:

$$D : y \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1,$$

则有
$$\iint_D e^{x^2} d\sigma = \int_0^1 dy \int_y^1 e^{x^2} dx,$$

但 $\int e^{x^2} dx$ 无法算出.




若将积分区域看成 X -型:

$$\text{则 } \iint_D e^{x^2} d\sigma = \int_0^1 dx \int_0^x e^{x^2} dy$$

$$= \int_0^1 (e^{x^2} y) \Big|_0^x dx$$

$$= \int_0^1 x e^{x^2} dx = \frac{1}{2}(e - 1).$$



注 计算二重积分时, 要适当地选择积分次序.

先对哪个变量积分, 要视积分区域 D 及被积函数 $f(x, y)$ 的不同情况而定.




例5 计算 $I = \iint_D (\sqrt{y^2 - 2x^2y + x^4} + 1) dx dy,$

其中 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1.$

解


$$\begin{aligned} I &= \iint_D (\sqrt{(y - x^2)^2} + 1) dx dy \\ &= \iint_D (|y - x^2| + 1) dx dy \\ &= \iint_D |y - x^2| dx dy + \iint_D dx dy \\ &= \iint_D |y - x^2| dx dy + 1 \end{aligned}$$



$$|y - x^2| = \begin{cases} x^2 - y, & y < x^2 \quad (D_1) \\ y - x^2, & y \geq x^2 \quad (D_2) \end{cases}$$

分界线: $y = x^2$, $D = D_1 \cup D_2$,

$$I = \iint_D |y - x^2| dx dy + 1$$



$$= \iint_{D_1} (x^2 - y) dx dy + \iint_{D_2} (y - x^2) dx dy + 1$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^{x^2} (x^2 - y) dy + \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 (y - x^2) dy + 1$$



$$= \int_0^1 dx \int_0^{x^2} (x^2 - y) dy + \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 (y - x^2) dy + 1$$

$$= \int_0^1 -\frac{1}{2}(x^2 - y)^2 \Big|_{y=0}^{y=x^2} dx + \int_0^1 \frac{1}{2}(y - x^2)^2 \Big|_{y=x^2}^{y=1} dx + 1$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 x^4 dx + \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - x^2)^2 dx + 1$$

$$= \frac{1}{10} + \frac{4}{15} + 1 = \frac{41}{30}.$$



例6 设 $f(x), g(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且都单调减少,

证明: $\int_0^1 f(x)g(x)dx \geq \int_0^1 f(x)dx \int_0^1 g(x)dx.$

需证
 $A \geq 0$

证 设 $A = \int_0^1 f(x)g(x)dx - \int_0^1 f(x)dx \int_0^1 g(x)dx,$

则 $A = \int_0^1 f(x)g(x)dx \cdot \int_0^1 dy$
 $- \int_0^1 f(x)dx \cdot \int_0^1 g(y)dy$

定积分的
值与积分
变量记号
无关



$$A = \iint_D f(x)g(x) \, dx \, dy - \iint_D f(x)g(y) \, dx \, dy$$

$$= \iint_D [f(x)g(x) - f(x)g(y)] \, dx \, dy$$

类似可得


(或利用 D 关于 $y=x$ 的对称性)

$$= \iint_D [f(y)g(y) - f(y)g(x)] \, dx \, dy$$

右端相加


$$2A = \iint_D [f(x) - f(y)][g(x) - g(y)] \, dx \, dy$$

需证
 $A \geq 0$



$$2A = \iint_D [f(x) - f(y)][g(x) - g(y)] dx dy$$

由题设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为单调减少，
故不论 $x > y$ 或 $x < y$ 时，



$f(x) - f(y)$ 与 $g(x) - g(y)$ 同号，

从而 $[f(x) - f(y)][g(x) - g(y)] \geq 0$ ，

$\therefore 2A \geq 0$ ，即 $A \geq 0$ ，


亦即 $\int_0^1 f(x)g(x) dx \geq \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 g(x) dx$ 。



例7 计算 $\iint_D (3x^3 + y) dx dy$, 其中 D 是两条
 抛物线 $y = x^2$ 与 $y = 4x^2$, $y = 1$ 所围.

解 D 关于 y 轴 ($x = 0$) 对称,
 关于 x 是奇函数

$$\begin{aligned}
 & \iint_D (3x^3 + y) dx dy \\
 &= \iint_D 3x^3 dx dy + \iint_D y dx dy \\
 &= 0 + \iint_D y dx dy = 2 \iint_{D_1} y dx dy
 \end{aligned}$$




$$\iint_D (3x^3 + y) dx dy = 2 \iint_{D_1} y dx dy$$

$$= 2 \int_0^1 y dy \int_{\frac{\sqrt{y}}{2}}^{\sqrt{y}} dx$$

$$= \int_0^1 y^{\frac{3}{2}} dy$$

$$= \frac{2}{5}.$$



三、同步练习

1. 改变 $\int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x, y) dy$ ($a > 0$)

的积分次序.

2. 计算 $I = \iint_D \frac{\sin y}{y} d\sigma$, D 由 $y^2 = \frac{\pi}{2}x$ 与 $y=x$ 所围.

3. 计算 $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^1 e^{\frac{y}{x}} dx$.



4. 用适当的积分次序计算 $I = \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$,

其中 D 是由直线 $y = x$, $y = x + a$, $y = a$, $y = 3a$ ($a > 0$) 所围成的闭区域.

5. 计算二重积分 $\iint_D \sqrt{|y - x^2|} dx dy$, 其中 D

是由直线 $x = 1$, $x = -1$, $y = 2$ 和 x 轴所围区域.

6. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 试证

$$\int_0^1 e^{f(x)} dx \int_0^1 e^{-f(x)} dx \geq 1.$$



7. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 证明

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \sqrt{\frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(x) dx}.$$

8. 设 $f(t)$ 为连续函数, 证明

$$\iint_D f(x-y) dx dy = \int_{-A}^A f(t)(A-|t|) dt,$$

其中 $D: |x| \leq \frac{A}{2}, |y| \leq \frac{A}{2}, A$ 是常数.

9. 计算 $\iint_D y \sin x d\sigma$, 其中 D 是以 $A(0, \pi)$,

$B(0, -\pi), C(\pi, 0)$ 为顶点的三角形区域.



10. 求 $I = \iint_D (x^2 + y^2) \mathrm{d}x \mathrm{d}y$, $D : |x| + |y| \leq 1$.

11. 求 $I = \iint_D x[1 + yf(x^2 + y^2)] \mathrm{d}x \mathrm{d}y$, 其中 D 是

由 $y = x^3$, $y = 1$, $x = -1$ 围成, f 是连续函数.

12. 设 $f(x) \in C[0,1]$, 且 $\int_0^1 f(x) \mathrm{d}x = A$, 求

$$I = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^1 f(x)f(y) \mathrm{d}y.$$



13. 设 D 是平面上以 $A(1,1)$, $B(-1,1)$ 和 $C(-1,-1)$ 为顶点的三角形, D_1 是它的第一象限部分,

设 $I = \iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy$, 则有 ().

(A) $I = 4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$

(B) $I = 2 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$

(C) $I = 2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$

(D) $I = 4 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$



14. 求椭圆柱面 $x^2 + 4y^2 = 1$ 与平面 $z = 1 - x$ 及 $z = 0$ 所围成的空间体的体积 .



四、同步练习解答

1. 改变 $\int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x, y) dy$ ($a > 0$)


的积分次序.

解 $y = \sqrt{2ax} \Rightarrow x = \frac{y^2}{2a}$

$$y = \sqrt{2ax - x^2} \Rightarrow x = a \pm \sqrt{a^2 - y^2}$$

$$\text{原式} = \int_0^a dy \int_{\frac{y^2}{2a}}^{a - \sqrt{a^2 - y^2}} f(x, y) dx$$


$$+ \int_0^a dy \int_{a + \sqrt{a^2 - y^2}}^{2a} f(x, y) dx + \int_a^{2a} dy \int_{\frac{y^2}{2a}}^{2a} f(x, y) dx.$$



2. 计算 $I = \iint_D \frac{\sin y}{y} d\sigma$, D 由 $y^2 = \frac{\pi}{2}x$ 与 $y=x$ 所围.

解 选取先 y 后 x 的次序无法计算, 只能取先 x 后 y 的次序.

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dy \int_{\frac{2}{\pi}y^2}^y \frac{\sin y}{y} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin y}{y} \left(y - \frac{2}{\pi} y^2 \right) dy \\ &= 1 - \frac{2}{\pi}. \end{aligned}$$



3. 计算 $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^1 e^{\frac{y}{x}} dx$.


解 由于积分 $\int e^{\frac{y}{x}} dx$ 无法求出，故考虑交换积分次序。

$$D : \sqrt{y} \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$$

其边界区域为

$$x = \sqrt{y}, x = 1, y = 0$$

于是可作出 D 的图形如右




再将 D 按另一种次序表示

$$D : 0 \leq y \leq x^2, 0 \leq x \leq 1$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dx \int_0^{x^2} e^{\frac{y}{x}} dy \\ &= \int_0^1 [x e^{y/x}]_0^{x^2} dx \\ &= \int_0^1 (x e^x - x) dx = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$




4. 用适当的积分次序计算 $I = \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$,

其中 D 是由直线 $y = x$, $y = x + a$, $y = a$, $y = 3a$ ($a > 0$) 所围成的闭区域.

解 由被积函数及积分区域的特点知,
选先 x 后 y 的次序比较合适.

$$\begin{aligned} I &= \int_a^{3a} dy \int_{y-a}^y (x^2 + y^2) dx \\ &= 14a^4. \end{aligned}$$



5. 计算二重积分 $\iint_D \sqrt{|y - x^2|} dx dy$, 其中 D


是由直线 $x = 1$, $x = -1$, $y = 2$ 和 x 轴所围区域.

解 为去掉绝对值符号,

用抛物线 $y = x^2$ 将 D

分为两个子区域 D_1, D_2 ,

$$\sqrt{|x^2 - y|} = \begin{cases} \sqrt{x^2 - y}, & (x, y) \in D_1, \\ \sqrt{y - x^2}, & (x, y) \in D_2. \end{cases}$$



$$\iint_D \sqrt{|y-x^2|} dx dy$$

D_1 、 D_2 关于 y 轴($x=0$)对称,


关于 x 均为偶函数

$$= \iint_{D_1} \sqrt{x^2 - y} dx dy + \iint_{D_2} \sqrt{y - x^2} dx dy$$

$$= 2 \int_0^1 dx \int_0^{x^2} \sqrt{x^2 - y} dy$$

$$+ 2 \int_0^1 dx \int_{x^2}^2 \sqrt{y - x^2} dy$$

$$= \frac{\pi}{2} + \frac{5}{3}.$$



6. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 试证

$$\int_0^1 e^{f(x)} dx \int_0^1 e^{-f(x)} dx \geq 1.$$

证 设 $A = \int_0^1 e^{f(x)} dx \int_0^1 e^{-f(x)} dx$

则有 $A = \int_0^1 e^{f(x)} dx \int_0^1 e^{-f(y)} dy$

$$= \int_0^1 \int_0^1 e^{f(x)-f(y)} dx dy$$

$$= \int_0^1 e^{f(y)} dy \int_0^1 e^{-f(x)} dx$$

$$= \int_0^1 \int_0^1 e^{f(y)-f(x)} dx dy$$



于是

$$\begin{aligned} 2A &= \int_0^1 \int_0^1 \left[e^{f(x)-f(y)} + \frac{1}{e^{f(x)-f(y)}} \right] dx dy \\ &\geq \int_0^1 \int_0^1 2 dx dy = 2 \quad (\text{利用 } a^2 + \frac{1}{a^2} \geq 2) \end{aligned}$$

即

$$A = \int_0^1 e^{f(x)} dx \int_0^1 e^{-f(x)} dx \geq 1.$$



7. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 证明

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \sqrt{\frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(x) dx}.$$

即要证函数在一个区间 上的平均值不大于均方 根.

证 (方法1) 用二重积分证明

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 故 $F(x, y) = [f(x) - f(y)]^2$

在矩形区域 $D: a \leq x \leq b, a \leq y \leq b$ 上连续, 且

$$\iint_D [f(x) - f(y)]^2 dx dy \geq 0.$$



$$\begin{aligned}
& \text{显然} \quad \iint_D [f(x) - f(y)]^2 d\sigma \\
&= \iint_D f^2(x) d\sigma - 2 \iint_D f(x)f(y) d\sigma + \iint_D f^2(y) d\sigma \\
&= 2(b-a) \int_a^b f^2(x) dx - 2 \left[\int_a^b f(x) dx \right]^2 \geq 0, \\
&\therefore (b-a) \int_a^b f^2(x) dx \geq \left[\int_a^b f(x) dx \right]^2,
\end{aligned}$$

两端同乘以 $\frac{1}{(b-a)^2}$ 并开方得

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \sqrt{\frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(x) dx}.$$



(方法2) 用定积分证明

设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_a^b [f(x) + t g(x)]^2 dx \\ &= \int_a^b f^2(x) dx + 2t \int_a^b f(x)g(x) dx + t^2 \int_a^b g^2(x) dx \end{aligned}$$

由于关于 t 的二次三项式恒大于零, 故判别式

$$\Delta = [2 \int_a^b f(x)g(x) dx]^2 - 4 \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx \leq 0,$$



即
$$[\int_a^b f(x)g(x)dx]^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx,$$

令 $g(x)=1$, 则有

$$[\int_a^b f(x)dx]^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x)dx.$$

两端同乘以 $\frac{1}{(b-a)^2}$ 并开方得

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \leq \sqrt{\frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(x)dx}.$$



8. 设 $f(t)$ 为连续函数, 证明


$$\iint_D f(x-y) dx dy = \int_{-A}^A f(t)(A-|t|) dt,$$

其中 $D: |x| \leq \frac{A}{2}, |y| \leq \frac{A}{2}, A$ 是常数.

证
$$\iint_D f(x-y) dx dy = \int_{-\frac{A}{2}}^{\frac{A}{2}} dx \int_{-\frac{A}{2}}^{\frac{A}{2}} f(x-y) dy$$

令 $t = x - y$
$$\int_{-\frac{A}{2}}^{\frac{A}{2}} dx \int_{x-\frac{A}{2}}^{x+\frac{A}{2}} f(t) dt$$

画出积分区域




$$\int_{-\frac{A}{2}}^{\frac{A}{2}} dx \int_{x-\frac{A}{2}}^{x+\frac{A}{2}} f(t) dt \quad \text{交换积分次序}$$

$$= \int_{-A}^0 f(t) dt \int_{-\frac{A}{2}}^{t+\frac{A}{2}} dx + \int_0^A f(t) dt \int_{t-\frac{A}{2}}^{\frac{A}{2}} dx$$

$$= \int_{-A}^0 f(t)(A+t) dt + \int_0^A f(t)(A-t) dt$$

$$= \int_{-A}^0 f(t)(A-|t|) dt + \int_0^A f(t)(A-|t|) dt$$

$$= \int_{-A}^A f(t)(A-|t|) dt.$$




9. 计算 $\iint_D y \sin x \, d\sigma$, 其中 D 是以 $A(0, \pi)$,

$B(0, -\pi), C(\pi, 0)$ 为顶点的三角形区域 .

解 D 关于 x 轴 ($y = 0$) 对称,

关于 y 是奇函数

$$\begin{aligned} & \iint_D \textcircled{y} \sin x \, d\sigma \\ &= 0. \end{aligned}$$



10. 求 $I = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, $D : |x| + |y| \leq 1$.
关于 x, y 均为偶函数


解 D 关于 x, y 轴对称,

$$I = 4 \iint_{D_1} (x^2 + y^2) dx dy.$$

再利用积分区域 D_1 和被积函数


关于变量 x, y 的轮换对称性, 得

$$\iint_{D_1} x^2 dx dy = \iint_{D_1} y^2 dx dy,$$



故

$$\begin{aligned} I &= 8 \iint_{D_1} x^2 \, dx \, dy \\ &= 8 \int_0^1 dy \int_0^{1-y} x^2 \, dx \\ &= \frac{2}{3}. \end{aligned}$$



11. 求 $I = \iint_D x[1 + yf(x^2 + y^2)] dx dy$, 其中 D 是由 $y = x^3$, $y = 1$, $x = -1$ 围成, f 是连续函数.


解 $I = \iint_D x dx dy + \iint_D xyf(x^2 + y^2) dx dy$

$$\iint_D xyf(x^2 + y^2) dx dy$$

关于 x, y 均为奇函数

$$= \iint_{D_1} xyf(x^2 + y^2) dx dy$$

$$+ \iint_{D_2} xyf(x^2 + y^2) dx dy = 0,$$




$$I = \iint_D x \, dx \, dy + 0$$

$$= \int_{-1}^1 dx \int_{x^3}^1 x \, dy$$

$$= \int_{-1}^1 x(1 - x^3) \, dx$$


$$= -\frac{2}{5}.$$



12. 设 $f(x) \in C[0,1]$, 且 $\int_0^1 f(x) dx = A$,

$$\text{求 } I = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy.$$

提示 交换积分顺序后, x, y 互换



$$I = \int_0^1 dy \int_0^y f(x)f(y) dx = \int_0^1 dx \int_0^x f(x)f(y) dy$$

$$2I = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy + \int_0^1 dx \int_0^x f(x)f(y) dy$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^1 f(x)f(y) dy = \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 f(y) dy = A^2$$



13. 设 D 是平面上以 $A(1,1)$, $B(-1,1)$ 和 $C(-1,-1)$ 为顶点的三角形, D_1 是它的第一象限部分,

设 $I = \iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy$, 则有 ().

(A) $I = 4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$

(B) $I = 2 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$

(C) $I = 2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$

(D) $I = 4 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$



解 连 BO , 把 D 分成 $D_2 \cup D_3$.


因为 D_2 关于 y 轴对称,

D_3 关于 x 轴对称,

被积函数 xy 关于 x 为奇函数,

关于 y 也为奇函数,

$$\begin{aligned}\therefore \iint_D xy \, dx \, dy &= \iint_{D_2} xy \, dx \, dy + \iint_{D_3} xy \, dx \, dy \\ &= 0.\end{aligned}$$




又被积函数 $\cos x \sin y$ 关于 x 为偶函数,

关于 y 为奇函数,

$$\begin{aligned} \therefore & \iint_D \cos x \sin y \, dx \, dy \\ &= \iint_{D_2} \cos x \sin y \, dx \, dy + \iint_{D_3} \cos x \sin y \, dx \, dy \\ &= 2 \iint_{D_1} \cos x \sin y \, dx \, dy \end{aligned}$$

因此应选 B.



14. 求椭圆柱面 $x^2 + 4y^2 = 1$ 与平面 $z = 1 - x$ 及 $z = 0$ 所围成的空间体的体积 .


解 画出该空间体的图形如右,

这是一个曲顶柱体, 其顶

为 $z = 1 - x$, 底为

$$D : \{(x, y) \mid x^2 + 4y^2 \leq 1\}$$

$$= \{(x, y) \mid -\sqrt{1 - 4y^2} \leq x \leq \sqrt{1 - 4y^2}, -\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{1}{2}\}.$$



于是所求体积为

$$V = \iint_D (1 - x) \, d\sigma = \iint_D d\sigma - \iint_D x \, d\sigma$$

由对称性知

$$\iint_D x \, d\sigma = 0$$

而积分 $\iint_D d\sigma$ 数值上等于区域 D 的面积 $\frac{\pi}{2}$, 故

$$V = \frac{\pi}{2}.$$

