

第二节

第二类曲线积分

- 一、主要内容
- 二、典型例题
- 三、同步练习
- 四、同步练习解答

一、主要内容

(一) 第二类曲线积分的概念及性质


1. 问题引入 变力沿曲线所作的功.

设一质点受如下变力作用

$$\vec{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$$

$L: A \rightarrow B$, 求移动过程中变力所作的功 W . 解决办法:

“分割, 近似, 求和, 取极限”



联想: 恒力
沿直线做功


A diagram showing a constant force \vec{F} acting on a particle moving from point A to point B along a straight line. The angle between the force vector \vec{F} and the displacement vector \vec{AB} is θ .

$$W = \vec{F} |\vec{AB}| \cos \theta$$
$$= \vec{F} \cdot \vec{AB}$$

1° 分割

把 L 分成 n 个小弧段, \vec{F} 沿 $\widehat{M_{k-1}M_k}$ 所做的功为 ΔW_k , 则

$$W = \sum_{k=1}^n \Delta W_k$$



2° 取近似

有向小弧段 $\widehat{M_{k-1}M_k}$ 用有向线段 $\overrightarrow{M_{k-1}M_k} = (\Delta x_k, \Delta y_k)$ 近似代替, $\widehat{M_{k-1}M_k}$ 上任取一点 (ξ_k, η_k) , 则有

$$\begin{aligned} \Delta W_k &\approx \vec{F}(\xi_k, \eta_k) \cdot \overrightarrow{M_{k-1}M_k} \\ &= P(\xi_k, \eta_k) \Delta x_k + Q(\xi_k, \eta_k) \Delta y_k \end{aligned}$$




3° 求和

$$W \approx \sum_{k=1}^n [P(\xi_k, \eta_k) \Delta x_k + Q(\xi_k, \eta_k) \Delta y_k]$$

4° 取极限

变力沿曲线所作的功



$$W = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n [P(\xi_k, \eta_k) \Delta x_k + Q(\xi_k, \eta_k) \Delta y_k]$$

(其中 λ 为 n 个小弧段的最大长度)



2. 定义10.2 设 L 为 xOy 平面内从 A 到 B 的一条有向光滑弧, 在 L 上定义了一个有界向量函数

$$\vec{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$$

若对 L 的任意分割和在局部弧段上任意取点, 极限

$$\begin{aligned} & \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \vec{F}(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta \vec{r}_i \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i] \end{aligned}$$

都存在(与分化和取点无关), 其中 $\Delta \vec{r}_i = \Delta x_i \vec{i} + \Delta y_i \vec{j}$,



$\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{|\Delta \vec{r}_i|\}$, 则称此极限值为向量值函数

$F(x,y)$ 在有向曲线弧 L 上第二类曲线积分,

或对坐标的曲线积分, 记作

$$\int_L \vec{F}(x,y) \cdot d\vec{r} = \int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy$$

积分曲线

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [P(\xi_k, \eta_k) \Delta x_k + Q(\xi_k, \eta_k) \Delta y_k]$$



注 1° 关于第二类曲线积分的几个术语

$$\int_L \vec{F}(x, y) \cdot d\vec{r}$$

第二类曲线积分的向量形式

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

第二类曲线积分的坐标形式

$$\int_L P(x, y)dx$$

对 x 的曲线积分;

$$\int_L Q(x, y)dy$$

对 y 的曲线积分.

2° 若 Γ 为空间曲线弧 ,

$$\vec{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$$



$$\int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{\Gamma} P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz$$

3° 如果 L 是闭曲线, 则对坐标的曲线积分记为

$$\oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \oint_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

4° 对坐标的曲线积分必须注意积分弧段的方向!

5° 变力沿曲线所作的功

$$W = \int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$




性质 (1) 线性性质: $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}^1$

$$\begin{aligned} & \int_L [\alpha \vec{F}_1(x, y) + \beta \vec{F}_2(x, y)] \cdot d\vec{r} \\ &= \alpha \int_L \vec{F}_1(x, y) \cdot d\vec{r} + \beta \int_L \vec{F}_2(x, y) \cdot d\vec{r} \end{aligned}$$

(2) 可加性: L 由 L_1 和 L_2 组成

$$\begin{aligned} & \int_L \vec{F}(x, y) \cdot d\vec{r} \\ &= \int_{L_1} \vec{F}(x, y) \cdot d\vec{r} + \int_{L_2} \vec{F}(x, y) \cdot d\vec{r} \end{aligned}$$



(3) 有向性: 用 L^- 表示 L 的反向弧, 则

$$\int_{L^-} \vec{F}(x, y) \cdot d\vec{r} = - \int_L \vec{F}(x, y) \cdot d\vec{r}$$

对坐标的曲线积分必须注意积分弧段的方向.

这是第一类和第二类线积分的一个重要区别



(二) 两类曲线积分之间的联系

定理 设有向平面曲线弧 $L: \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$,

起点: $A \leftrightarrow a$, 终点: $B \leftrightarrow b$.

$\varphi'(t), \psi'(t)$ 在以 a, b 为端点的区间上连续, 且

$$[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2 \neq 0.$$

L 上点 (x, y) 处与 L 同方向的切向量 的方向角

为 α, β , 则

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_L [P(x, y)\cos\alpha + Q(x, y)\cos\beta]ds$$



注 $\cos \alpha = \pm \frac{\varphi'(t)}{\sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)}},$

$$\cos \beta = \pm \frac{\psi'(t)}{\sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)}},$$

当 $a < b$ 时, 取 “+” 号;

当 $a > b$ 时, 取 “-” 号.

$$dx = \cos \alpha ds, \quad dy = \cos \beta ds,$$

$$ds = \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} |dt|$$



(三) 第二类曲线积分的计算法

定理10.2 设 L 是一条平面有向光滑曲线弧,

其参数方程为
$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad t: a \rightarrow b,$$

当 $t: a \xrightarrow{\text{单调}} b$ 时, 点 $M(x, y): A \xrightarrow{\text{沿} L} B$.

$P(x, y), Q(x, y)$ 在 L 上连续, $\varphi(t), \psi(t)$ 在以 a 和 b 为端点的区间上具有一阶连续的导数, 且

$$\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) \neq 0,$$

则有
$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

$$= \int_a^b \{ P[\varphi(t), \psi(t)] \varphi'(t) + Q[\varphi(t), \psi(t)] \psi'(t) \} dt$$



注 1° 计算 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$, 可将

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases}$$

代入上式, 且同时换限.

下限 $a \longleftrightarrow L$ 的起点 A

上限 $b \longleftrightarrow L$ 的终点 B

a 不一定小于 b !

即计算定积分:

$$\int_a^b \{P[\varphi(t), \psi(t)]\varphi'(t) + Q[\varphi(t), \psi(t)]\psi'(t)\} dt \text{ 即可};$$



2° 如果 L 的方程为 $y = \psi(x), x: a \rightarrow b,$

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

$$= \int_a^b \{ P[x, \psi(x)] + Q[x, \psi(x)] \psi'(x) \} dx$$

3° 对空间光滑曲线弧 $\Gamma: \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = \omega(t) \end{cases} \quad t: \alpha \rightarrow \beta$

$$\int_{\Gamma} P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz$$


$$= \int_{\alpha}^{\beta} \{ P[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)] \varphi'(t)$$

$$+ Q[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)] \psi'(t) + R[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)] \omega'(t) \} dt$$



思考 定积分

$$\int_a^b f(x) dx$$



是否可看作第二类曲线积分的特例？

是！ 第二类曲线积分


$$\int_{\overline{AB}} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$



二、典型例题

例1 将积分 $\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ 化为对弧长的积分, 其中 L 沿上半圆周 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 从 $O(0,0)$ 到 $B(2,0)$.

解(方法1) $L: y = \sqrt{2x - x^2},$
 $x: 0 \longrightarrow 2 \quad (a < b)$
 $y' = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}$



切向量 $\vec{T} = \vec{r}'(x) = (1, y')$ 与 L 方向一致.

其方向余弦:



$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + y'^2}} = \sqrt{2x - x^2}$$

$$\cos \beta = \frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2}} = 1 - x$$

$$y' = \frac{1 - x}{\sqrt{2x - x^2}}$$

$$\therefore \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

$$= \int_L [P(x, y) \cos \alpha + Q(x, y) \cos \beta] ds$$

$$= \int_L [\sqrt{2x - x^2} P(x, y) + (1 - x) Q(x, y)] ds$$



(方法2) $L: \begin{cases} x = 1 + \cos t \\ y = \sin t \end{cases},$

$t: \pi \longrightarrow 0 \quad (a > b)$

切向量 $\vec{r}'(t) = (-\sin t, \cos t)$


与 L 方向相反.

与 L 同方向的切向量: $\vec{T} = -\vec{r}'(t) = (\sin t, -\cos t)$

其方向余弦: $\cos \alpha = \sin t = y = \sqrt{2x - x^2},$

$\cos \beta = -\cos t = 1 - x$

.....




(方法3) $y = \sqrt{2x - x^2}, \quad dy = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}} dx$

$$ds = \sqrt{1 + y'^2} dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2x-x^2}} dx$$

$O \xrightarrow{L} B$

弧长 s 



$$\cos \alpha = \frac{dx}{ds} = \sqrt{2x-x^2}, \quad \cos \beta = \frac{dy}{ds} = 1-x$$

$$\int_L P(x,y) dx + Q(x,y) dy =$$

$$\int_L [P(x,y)\sqrt{2x-x^2} + Q(x,y)(1-x)] ds$$



例2 计算 $\int_L xy dx$, 其中 L 为沿抛物线 $y^2 = x$ 从点 $A(1, -1)$ 到 $B(1, 1)$ 的一段.


解(方法1) 取 x 为参数, 则 $L: \widehat{AO} + \widehat{OB}$

$$\widehat{AO}: y = -\sqrt{x}, \quad x: 1 \rightarrow 0$$

$$\widehat{OB}: y = \sqrt{x}, \quad x: 0 \rightarrow 1$$

$$\therefore \int_L xy dx = \int_{\widehat{AO}} xy dx + \int_{\widehat{OB}} xy dx$$

$$= \int_1^0 x(-\sqrt{x}) dx + \int_0^1 x\sqrt{x} dx = 2 \int_0^1 x^{3/2} dx = \frac{4}{5}$$




(方法2) 取 y 为参数, 则

$$L: x = y^2, \quad y: -1 \rightarrow 1$$

$$\therefore \int_L xy dx = \int_{-1}^1 y^2 y (y^2)' dy$$

$$= 2 \int_{-1}^1 y^4 dy = \frac{4}{5}$$




注意积分
路径的
表示形式



例3 计算 $\int_L y^2 dx$, 其中 L 为

(1) 半径为 a 圆心在原点的上半圆周, 方向为逆时针方向;

(2) 从点 $A(a, 0)$ 沿 x 轴到点 $B(-a, 0)$.



解 (1) $L: x = a \cos t, y = a \sin t, t: 0 \rightarrow \pi$

$$\begin{aligned} \text{则 } \int_L y^2 dx &= \int_0^\pi a^2 \sin^2 t \cdot (-a \sin t) dt \\ &= -2a^3 \int_0^\pi \frac{1}{2} \sin^3 t dt = -2a^3 \cdot \frac{2}{3} \cdot 1 = -\frac{4}{3}a^3 \end{aligned}$$

(2) $L: y = 0, x: a \rightarrow -a,$

$$\text{则 } \int_L y^2 dx = \int_a^{-a} 0 dx = 0$$




例4 计算 $\int_L 2xydx + x^2 dy$, 其中 L 为

(1) 抛物线 $L: y = x^2, x: 0 \rightarrow 1$;

(2) 抛物线 $L: x = y^2, y: 0 \rightarrow 1$;

(3) 有向折线 $L: \overline{OA} + \overline{AB}$.



解 (1) 原式 $= \int_0^1 (2x \cdot x^2 + x^2 \cdot 2x) dx = 4 \int_0^1 x^3 dx = 1$

(2) 原式 $= \int_0^1 (2y^2 y \cdot 2y + y^4) dy = 5 \int_0^1 y^4 dy = 1$

(3) 原式 $= \int_{\overline{OA}} 2xydx + x^2 dy + \int_{\overline{AB}} 2xydx + x^2 dy$
 $= \int_0^1 (2x \cdot 0 + x^2 \cdot 0) dx + \int_0^1 (2y \cdot 0 + 1) dy = 1$



例5 计算 $\int_{\Gamma} x^3 dx + 3zy^2 dy - x^2 y dz$, 其中 Γ 是从点 $A(3, 2, 1)$ 到点 $B(0, 0, 0)$ 的直线段 AB .

解 直线 AB 为:
$$\begin{cases} x = 3t, \\ y = 2t, \\ z = t, \end{cases} \quad t: 1 \rightarrow 0.$$


$$\begin{aligned} & \int_{\Gamma} x^3 dx + 3zy^2 dy - x^2 y dz \\ &= \int_1^0 [(3t)^3 \cdot 3 + 3t(2t)^2 \cdot 2 - (3t)^2 \cdot 2t] dt \\ &= 87 \int_1^0 t^3 dt = -\frac{87}{4} \end{aligned}$$



例6 设在力场 $\vec{F} = (y, -x, z)$ 作用下, 质点由 $A(R, 0, 0)$ 沿 Γ 移动到 $B(R, 0, 2\pi k)$, 其中 Γ 为

(1) $x = R \cos t, y = R \sin t, z = kt$;
(2) \overline{AB} . 试求力场对质点所作的功.

解 (1)
$$W = \int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$
$$= \int_{\Gamma} y dx - x dy + z dz$$
$$= \int_0^{2\pi} (-R^2 + k^2 t) dt = 2\pi(\pi k^2 - R^2)$$



(2) Γ 的参数方程:


$$x = R, y = 0, z = t, t: 0 \rightarrow 2\pi k$$

$$W = \int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$= \int_{AB} y dx - x dy + z dz$$

$$= \int_0^{2\pi k} t dt$$

$$= 2\pi^2 k^2$$



三、同步练习

1. 计算 $\int_L (x + 2y)dx + xdy$, 其中 L 是从点 $(0,1)$ 沿曲线 $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ ($x \geq 0$) 到点 $(1,0)$.

2. 把对坐标的曲线积分 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$

化为对弧长的曲线积分, 其中 L 为:

- (1) 在 xOy 面内沿直线从点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$;
- (2) 沿抛物线 $y = x^2$ 从点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$;
- (3) 沿上半圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 从点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$.



3. 计算 $\int_L (x^2 - y^2) dx + xy dy$, 其中 L 是:

- (1) 由 $O(0, 0)$ 、 $A(1, 0)$ 、 $B(1, 1)$ 三点连成的折线段;
- (2) 由 $O(0, 0)$ 沿圆弧 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 到 $B(1, 1)$;
- (3) 由 $O(0, 0)$ 沿曲线 $y = x^n$ (n 是正的实数) 到 $B(1, 1)$.

4. 求 $I = \int_{\Gamma} (z - y) dx + (x - z) dy + (x - y) dz$,

$$\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x - y + z = 2 \end{cases}, \text{ 从 } z \text{ 轴正向看为顺时针方向.}$$

5. 计算 $\oint_L xy(y dx - x dy)$, L 是双纽线的右半支:

$$(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2), x \geq 0 \text{ 的逆时针方向.}$$




四、同步练习解答

1. 计算 $\int_L (x + 2y)dx + xdy$, 其中 L 是从点 $(0,1)$ 沿曲线 $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ ($x \geq 0$) 到点 $(1,0)$.

解 L 的参数方程:

$$x = \cos^3 t, y = \sin^3 t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2},$$



$$\begin{aligned} & \int_L (x + 2y)dx + xdy \\ &= \int_{\frac{\pi}{2}}^0 [(\cos^3 t + 2\sin^3 t)(-3\cos^2 t \sin t) + 3\sin^2 t \cos^4 t] dt \end{aligned}$$



$$= \int_{\frac{\pi}{2}}^0 [(\cos^3 t + 2\sin^3 t)(-3\cos^2 t \sin t) + 3\sin^2 t \cos^4 t] dt$$

$$= 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} [(\cos^5 t \sin t + 2(1 - \sin^2 t)\sin^4 t - (1 - \cos^2 t)\cos^4 t] dt$$

$$= 3 \left[\frac{1}{6} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^4 t - \sin^6 t) dt \right]$$

$$= \frac{1}{2} + 3 \left(\frac{3}{4 \times 2} - \frac{5 \times 3}{6 \times 4 \times 2} \right) \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2} + \frac{3}{32} \pi.$$



2. 把对坐标的曲线积分 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$

化为对弧长的曲线积分, 其中 L 为:

- (1) 在 xOy 面内沿直线从点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$;
- (2) 沿抛物线 $y = x^2$ 从点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$;
- (3) 沿上半圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 从点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$.

解 (1) 过点 $(0,0)$, $(1,1)$ 的直线 $y = x$,

方向余弦: $\cos \alpha = \cos \beta = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_L [P(x, y) + Q(x, y)] \frac{\sqrt{2}}{2} ds$$



(2) 由 $ds = \sqrt{1 + y_x'^2} dx = \sqrt{1 + 4x^2} dx$, 得

$$\cos \alpha = \frac{dx}{ds} = \frac{1}{\sqrt{1 + 4x^2}},$$

$$\cos \beta = \sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{2x}{\sqrt{1 + 4x^2}}$$

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

$$= \int_L \frac{1}{\sqrt{1 + 4x^2}} [P(x, y) + 2xQ(x, y)] ds$$



$$(3) \, ds = \sqrt{1 + y_x'^2} dx = \sqrt{1 + \frac{(1-x)^2}{2x-x^2}} dx, \text{ 则}$$

$$\cos \alpha = \sqrt{2x - x^2},$$

$$\cos \beta = \sin \alpha = \sqrt{1 - (2x - x^2)} = 1 - x$$

$$\begin{aligned} & \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy \\ &= \int_L \left[P(x, y) \sqrt{2x - x^2} + Q(x, y)(1 - x) \right] ds \end{aligned}$$



3. 计算 $\int_L (x^2 - y^2)dx + xydy$, 其中 L 是:

- (1) 由 $O(0, 0)$ 、 $A(1, 0)$ 、 $B(1, 1)$ 三点连成的折线段;
- (2) 由 $O(0, 0)$ 沿圆弧 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 到 $B(1, 1)$;
- (3) 由 $O(0, 0)$ 沿曲线 $y = x^n$ (n 是正的实数) 到 $B(1, 1)$.

解 (1)
$$\int_L (x^2 - y^2)dx + xydy = \int_{OA} + \int_{AB}$$
$$= \int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 y dy = \frac{5}{6}$$



(2) 把 L 的方程化成参数式:

$$y = \sqrt{2x - x^2}$$

$$x = 1 + \cos t, \quad y = \sin t, \quad \frac{\pi}{2} \leq t \leq \pi.$$

$$\int_L (x^2 - y^2) dx + xy dy$$

$$= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} 2 [(1 + \cos t)^2 (-\sin t) - \sin^2 t (-\sin t) \\ + (1 + \cos t) \sin t \cos t] dt$$

$$= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (\cos^2 t + \cos t) \sin t dt$$

$$= \left(-\frac{1}{3} \cos^3 t - \frac{1}{2} \cos^2 t \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \frac{1}{6}.$$



$$(3) \int_L (x^2 - y^2) dx + xy dy$$

$$= \int_0^1 (x^2 - x^{2n} + nx^{2n}) dx$$

$$= \left(\frac{x^3}{3} + \frac{n-1}{2n+1} x^{2n+1} \right) \bigg|_0^1$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{n-1}{2n+1}.$$

曲线 $y = x^n$




4. 求 $I = \int_{\Gamma} (z - y)dx + (x - z)dy + (x - y)dz,$

$\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x - y + z = 2 \end{cases}$, 从 z 轴正向看为顺时针方向.

解 Γ 的参数方程:

$x = \cos t, y = \sin t, z = 2 - \cos t + \sin t \quad (t: 2\pi \rightarrow 0)$

$$\begin{aligned} I &= -\int_0^{2\pi} [(2 - \cos t)(-\sin t) \\ &\quad + (-2 + 2\cos t - \sin t)\cos t \\ &\quad + (\cos t - \sin t)(\cos t + \sin t)] dt \\ &= \int_0^{2\pi} (1 - 4\cos^2 t) dt = -2\pi \end{aligned}$$



5. 计算 $\oint_L xy(ydx - xdy)$, L 是双纽线的右半支:
 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$, $x \geq 0$ 的逆时针方向。


解 L 的参数方程是:

$$x = a\sqrt{\cos 2\theta} \cos \theta,$$

$$y = a\sqrt{\cos 2\theta} \sin \theta,$$


$$-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$$

$$dx = \frac{-a}{\sqrt{\cos 2\theta}} \sin 3\theta d\theta, \quad dy = \frac{a}{\sqrt{\cos 2\theta}} \cos 3\theta d\theta,$$



$$dx = \frac{-a}{\sqrt{\cos 2\theta}} \sin 3\theta d\theta, \quad dy = \frac{a}{\sqrt{\cos 2\theta}} \cos 3\theta d\theta,$$

$$\oint_L xy(ydx - xdy)$$



$$= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} a^4 \cos 2\theta \sin \theta \cos \theta (-\sin \theta \sin 3\theta - \cos \theta \cos 3\theta) d\theta$$

$$= -\frac{a^4}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 2\theta \sin 2\theta d\theta = 0.$$

