

第四节 幂级数

- 一、主要内容
- 二、典型例题
- 三、同步练习
- 四、同步练习解答

一、主要内容

区间 I 上的函数

(一) 函数项级数的一般概念

- 函数项级数: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$
- 收敛点 (发散点) x_0 : 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛 (发散)
- 收敛域 (发散域) U : 收敛点 (发散点) 的全体.
- 和函数: $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x), \quad x \in U$ (收敛域)
- 部分和: $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$, 余项: $r_n(x) = S(x) - S_n(x)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = S(x), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} r_n(x) = 0.$$



(二) 幂级数及其收敛性

1. 定义 $(x - x_0)$ 的幂级数:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n + \cdots$$

x 的幂级数 ($x_0 = 0$):

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

例如, 等比级数为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (|x| < 1),$

收敛域 $(-1, 1)$ 为区间.

问题 一般幂级数的收敛域是否为区间?



2. 幂级数收敛域的结构

定理 11.10 (Abel定理)

(1) 若当 $x = x_0 \neq 0$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛,

则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ($|x| < |x_0|$) **绝对收敛**.

(2) 若当 $x = x_0$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散,

则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ($|x| > |x_0|$) **发散**.



结论: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域: 以原点为中心的区间.
幂级数收敛与发散的分界点: $\pm R$

(1) $R = 0$ 时, 幂级数仅在 $x = 0$ 收敛;

(2) $R = +\infty$ 时, 幂级数在 $(-\infty, +\infty)$ 收敛;

(3) $0 < R < +\infty$ 时, 幂级数在 $(-R, R)$ 收敛;

在 $[-R, R]$ 外发散; 在 $x = \pm R$ 可能收敛(发散).

R : 收敛半径; $(-R, R)$: 收敛区间.

$(-R, R)$ 加上收敛区间的收敛端点: 收敛域.



3. 收敛半径 R 的求法

定理11.11 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho$

(或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$)

则收敛半径 $R = \begin{cases} \frac{1}{\rho}, & \text{当 } 0 < \rho < +\infty \text{ 时,} \\ +\infty, & \text{当 } \rho = 0 \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } \rho = +\infty \text{ 时,} \end{cases}$

结论: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$



(三) 幂级数的运算与性质

1. 幂级数的四则运算性质

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 及 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 收敛半径分别为

R_1, R_2 , 令 $R = \min\{R_1, R_2\}$, 则

(1) 加减法: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n, |x| < R$

(2) 乘法: $\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, |x| < R$

其中 $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$

两幂级数
可在公共
收敛域上
相加减, 相乘



注 两幂级数相除所得幂级数的收敛半径 **R** 可能比原两幂级数的收敛半径 **R_1, R_2** 小得多.

例如, 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1$ ($a_0 = 1, a_n = 0, n = 1, 2, \dots$)

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = 1 - x \quad \left(\begin{array}{l} b_0 = 1, b_1 = -1, \\ b_n = 0, n = 2, 3, \dots \end{array} \right)$$

收敛半径均为 **$R = +\infty$** , 但是

$$\frac{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n} = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots$$

其收敛半径只是 **$R = 1$** .



2. 幂级数的分析运算性质

性质 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R > 0$, 则其和函数 $S(x)$

(1) 在收敛域 I 上连续;

收敛半径
不变

(2) 在收敛区间内可逐项求导、逐项积分:

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \quad x \in (-R, R)$$

$$\int_0^x S(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_0^x x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}, \quad x \in (-R, R)$$



二、典型例题

例1 确定下列函数项级数的收敛域，并求其和函数：

$$(1) \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{nx}} = 1 + \frac{1}{2^x} + \frac{1}{2^{2x}} + \cdots + \frac{1}{2^{nx}} + \cdots$$

解 和函数： $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{nx}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2^x}} \quad \left(\left| \frac{1}{2^x} \right| < 1 \right)$

等比级数
公比： $\frac{1}{2^x}$

收敛域： $(0, +\infty)$,

发散域： $(-\infty, 0]$.



$$(2) \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n + x^{-n}}{n^2} \quad (x \neq 0),$$

解 当 $|x|=1$ 时收敛, 该级数收敛;

当 $0 < |x| \neq 1$ 时,

$$\because \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x) = \infty,$$

\therefore 该级数发散, 故级数的收敛域:

$$U = \{ x \mid |x|=1 \} = \{-1, 1\}.$$

收敛域一般不一定为区间!



例2 求 (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n}$; (2) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{(2n+1)!}$ 的收敛域.

解 (1) 收敛半径 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^{n+1} \frac{n}{n+1}} = \frac{1}{2},$

当 $x = \frac{1}{2}$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散;

当 $x = -\frac{1}{2}$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛.

\therefore 收敛域为 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.



$$(2) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{(2n+1)!}$$

$$\begin{aligned} \text{解 (2)} \quad \because R &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(2n-1)!}}{\frac{1}{(2n+1)!}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1) \cdot 2n \\ &= +\infty \end{aligned}$$

收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.



例3 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{3^n n^2}$ 的收敛域.

$x-1$ 的幂级数

解 记 $y = x - 1$, 级数化为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{y^n}{3^n n^2},$$

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3^{n+1}(n+1)^2}}{\frac{1}{3^n n^2}} = \frac{1}{3},$$

\therefore 收敛半径 $R = 3$.



当 $y = 3$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛;

当 $y = -3$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ 收敛.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{y^n}{3^n n^2},$$
$$y = x - 1.$$

故收敛域为: $-3 \leq y = x - 1 \leq 3,$

即 $-2 \leq x \leq 4.$



例4 求 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) 2^n x^{2n}$ 的收敛域.

解 由比值法,

缺项幂级数,
直接用比值法

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) 2^{n+1} x^{2n+2}}{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) 2^n x^{2n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} 2x^2 = 2x^2$$



$$\rho = 2x^2 \begin{cases} < 1, \text{级数收敛}, & |x| < \frac{1}{\sqrt{2}}, \\ > 1, \text{级数发散}, & |x| > \frac{1}{\sqrt{2}}. \end{cases}$$

$x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, 原级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \quad \text{发散}$$

\therefore 所给级数的收敛域: $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$.



例5 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$ 的和函数 $S(x)$.

解 1° 先求收敛域

$$\therefore R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$$

$$x = -1 \text{ 时 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = -\ln 2, \text{ 收敛;}$$

$$x = 1 \text{ 时 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散,}$$

\therefore 该幂级数的收敛域: $[-1, 1)$.



2° 再求和函数 $S(x)$

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n = x + \frac{1}{2}x + \cdots + \frac{1}{n}x^n + \cdots, \quad x \in [-1, 1)$$

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^n}{n}\right)', \quad x \in (-1, 1)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$$

由和函数的连续性

$$\begin{aligned} S(x) &= S(x) - \underbrace{S(0)}_0 = \int_0^x S'(x) \, dx = \int_0^x \frac{1}{1-x} \, dx \\ &= -\ln(1-x) \Big|_0^x = -\ln(1-x), \quad x \in [-1, 1). \end{aligned}$$



注

1° 幂级数逐项求导, 逐项积分收敛半径不变, 但区间端点的敛散性可能变化, 即收敛域可能发生变化.

2° 求幂级数和函数的方法:

① 求导 (去分母) \rightarrow 求和 \rightarrow 积分 (如例5)

② 积分 (去分子) \rightarrow 求和 \rightarrow 求导 (如例6(1))



例6 求下列幂级数的收敛域及和函数:

$$(1) 1 - 2x + 3x^2 + \cdots + (-1)^{n-1} nx^{n-1} + \cdots$$

$$(2) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

解 已知等比级数

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots \quad (|x| < 1)$$

公比: $-x$

$$\therefore \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + \cdots \quad (|x| < 1)$$



(1) (方法1)

$$s(x) = 1 - 2x + 3x^2 + \cdots + (-1)^{n-1} nx^{n-1} + \cdots \quad (|x| < 1)$$

$$\int_0^x s(x) dx = \int_0^x \left[\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} nx^{n-1} \right] dx \quad (|x| < 1)$$

$$= \left[\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n \int_0^x x^{n-1} dx \right] \quad (\text{逐项积分})$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^n = - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^n$$

$$= - \left[\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n - 1 \right]$$



$$\int_0^x s(x) dx = - \left[\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n - 1 \right] \quad (|x| < 1)$$

$$= - \left[\frac{1}{1+x} - 1 \right]$$

两边对 x 求导:

$$s(x) = - \left[\frac{1}{1+x} - 1 \right]' \quad (|x| < 1)$$

$$= \frac{1}{(1+x)^2}$$



(方法2)

$$1 - 2x + 3x^2 + \cdots + (-1)^{n-1} \boxed{nx^{n-1}} + \cdots \quad (|x| < 1)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} nx^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} (x^n)' \quad (x^n)' = nx^{n-1}$$

$$= \left[\sum_{n=0}^{\infty} \underline{(-1)^{n-1} x^n} \right]' \quad (\text{逐项求导})$$

$$= - \left[\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \right]'$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} \underline{(-1)^n x^n} \quad (|x| < 1)$$

$$= - \left(\frac{1}{1+x} \right)' = \frac{1}{(1+x)^2} \quad (|x| < 1).$$



$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} \underline{(-1)^n x^n} \quad (|x| < 1)$$

$$(2) \quad \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x x^n dx$$

$$= \int_0^x \left[\sum_{n=0}^{\infty} \underline{(-1)^n x^n} \right] dx \quad (|x| < 1) \quad (\text{逐项积分})$$

$$= \int_0^x \frac{1}{1+x} dx = \ln(1+x) \quad (-1 < x \leq 1) \quad (\text{由和函数的连续性})$$

$$x=1 \text{ 处, } \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+1} \text{ 收敛; } x=-1 \text{ 处, } -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \text{ 发散.}$$



例7 求数项级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n}$ 的和.

解 设 $S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n^2-1}$, $x \in (-1, 1)$, 则

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) x^n \\ &= \frac{x}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n-1} - \frac{1}{2x} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (x \neq 0, x \in (-1, 1)) \\ &= \frac{x}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \frac{1}{2x} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - x - \frac{x^2}{2} \right) \end{aligned}$$



$$S(x) = \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{2x}\right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} + \frac{1}{2x} \left(x + \frac{x^2}{2}\right) \quad (x \neq 0)$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x x^{n-1} dx = \int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} \right) dx$

$$= \int_0^x \frac{dx}{1-x} = -\ln(1-x)$$

于是 $S(x) = \frac{1-x^2}{2x} \ln(1-x) + \frac{2+x}{4} \quad (x \neq 0, x \in (-1, 1))$

故 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n} = S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{8} - \frac{3}{4} \ln 2$



注 求常数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ 的和, 可利用幂级数及其和函数. 具体步骤如下:

1° 找一个幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 使 $a_n x_0^n = u_n$;

2° 求 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛区间;

若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 发散, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ 发散;



若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 收敛, 则转下一步:

3° 求出 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$;

4° $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = S(x_0)$.



例8 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 的和函数 $S(x)$.

解 易知收敛半径 $R = +\infty$.

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$\begin{aligned} \text{则} \quad S'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \\ &= S(x) \quad (-\infty < x < +\infty) \end{aligned}$$

$$\therefore S'(x) - S(x) = 0 \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$\text{即} \quad [e^{-x} S(x)]' = 0, \quad x \in \mathbf{R}$$



即 $[e^{-x} S(x)]' = 0, \quad x \in \mathbf{R}$

因此 $e^{-x} S(x) = C,$

即 $S(x) = C e^x, \quad x \in \mathbf{R}$

由 $S(0) = 1$ 得, $S(x) = e^x,$

故得 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x, \quad x \in (-\infty, +\infty).$



三、同步练习

1. $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots$

求收敛半径及收敛域.

2. 求收敛域: (1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$; (2) $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$.

3. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2^n n}$ 的收敛域.

4. 求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^{2n}$ 的收敛半径.



5. 求(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$; (2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$ 的和函数 $S(x)$.

6. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{2^n n}$ 的和函数.

7. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{a} + \frac{2}{a^2} + \cdots + \frac{n}{a^n})$, 其中 $a > 1$.



四、同步练习解答

1. $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots$

求收敛半径及收敛域.

解
$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}} = 1$$

当 $x = 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ 收敛;

当 $x = -1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{n}$ 发散. 故收敛域为 $(-1, 1]$.



2. 求收敛域：(1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$; (2) $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$.

解 (1)

规定: $0! = 1$

$$\because R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n!}}{\frac{1}{(n+1)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = \infty$$

所以收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.

$$(2) \because R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$$

所以级数仅在 $x=0$ 处收敛.



3. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2^n n}$ 的收敛域.

解 令 $t = x - 1$, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n n} t^n$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2^n n}}{\frac{1}{2^{n+1}(n+1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}(n+1)}{2^n n} = 2$$

当 $t = 2$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散;

当 $t = -2$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 条件收敛;

收敛域为 $-2 \leq t = x - 1 < 2$, 即 $-1 \leq x < 3$.



4. 求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^{2n}$ 的收敛半径.

分析 级数缺奇次项, 故直接用比值审敛法求收敛半径.

$$\text{解 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{[2(n+1)]!}{[(n+1)!]^2} x^{2(n+1)}}{\frac{[2n]!}{[n!]^2} x^{2n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)(2n+2)}{(n+1)^2} x^2 = 4x^2$$

当 $4x^2 < 1$ 即 $|x| < \frac{1}{2}$ 时级数收敛
当 $4x^2 > 1$ 即 $|x| > \frac{1}{2}$ 时级数发散

故收敛半径: $R = \frac{1}{2}$.



5. 求(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$; (2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$ 的和函数 $S(x)$.

解 (1) 联想 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, x \in (-1,1)$ (需去分母)

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n},$$

$$S'(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}, \quad x \in (-1,1)$$

$$S(x) = \int_0^x S'(x) dx = \int_0^x \frac{1}{1-x} dx = \ln(1-x), \quad x \in [-1,1)$$



$$(2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$$

$$xS(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1},$$

$$[xS(x)]' = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

$$\text{故 } xS(x) = \int_0^x (xS(x))' dx$$

$$= \int_0^x \frac{1}{1-x} dx = -\ln(1-x)$$



$$S(x) = -\frac{1}{x} \ln(1-x), \quad (0 < |x| < 1 \text{ 及 } x = -1)$$

而 $S(0) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{\ln(1-x)}{x} \right) = 1$,

由和函数的连续性:

$$S(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x} \ln(1-x), & x \in [-1, 0) \cup (0, 1) \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$



6. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{2^n n}$ 的和函数.

解 1° 先求收敛域

$$\therefore R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}(n+1)}{2^n n} = 2$$

在 $x = 2$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$ 发散

在 $x = -2$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n}$ 收敛

\therefore 所给级数的收敛域为: $[-2, 2)$.



2° 再求和函数 $S(x)$

$$\text{令 } S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{2^n n}, \quad x \in [-2, 2)$$

$$\text{则 } S(x) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{x}{2}\right)^{n-1} \quad (\text{令 } t = \frac{x}{2})$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1}}{n} = \frac{1}{2t} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n} \quad (t \neq 0, t \in (-1, 1))$$

$$= \frac{1}{2t} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^t t^{n-1} dt = \frac{1}{2t} \int_0^t \left[\sum_{n=1}^{\infty} t^{n-1} \right] dt$$



$$S(x) = \frac{1}{2t} \int_0^t \frac{1}{1-t} dt = -\frac{1}{2t} \ln(1-t) \quad (t \neq 0, t \in (-1,1))$$

$$= -\frac{1}{x} \ln(1 - \frac{x}{2}), \quad x \in (-2,0) \cup (0,2) \text{ (变量代回)}$$

$$S(0) = \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{2^n n} \right]_{x=0} = \left[\frac{1}{2} + \frac{x}{2^2 \cdot 2} + \frac{x^2}{2^3 \cdot 3} + \cdots \right]_{x=0} = \frac{1}{2}$$

再由和函数的连续性, $S(x)$ 在 $x = -2$ 处右连续

$$\therefore S(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x} \ln(1 - \frac{x}{2}), & x \in [-2,0) \cup (0,2) \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases}$$



7. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{a} + \frac{2}{a^2} + \cdots + \frac{n}{a^n})$, 其中 $a > 1$.

解 令 $S_n = \frac{1}{a} + \frac{2}{a^2} + \cdots + \frac{n}{a^n} = \sum_{k=1}^n \frac{k}{a^k}$

构造 $\sum_{n=1}^{\infty} n x^n$, 易知其收敛半径为 1, 设其和为 $S(x)$,

$$\text{则 } S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n x^n = x \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)'$$

$$= x \cdot \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{x}{(1-x)^2}$$

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S\left(\frac{1}{a}\right) = \frac{a}{(a-1)^2}$$

