

# 上节提要

条件概率计算方法 {

- a 利用缩减的样本空间
- b 等可能/几何概型中条件概率计算公式
- c 定义式  $P(B|A) = P(AB)/P(A)$

条件概率也是概率

因此，对概率所证明的一些重要结果都适用于条件概率。

乘法公式 设  $P(A) > 0$ ，则  $P(AB) = P(B|A)P(A)$

设  $P(B) > 0$ ，则  $P(AB) = P(A|B)P(B)$

# 上节提要

## 样本空间的一个划分

E的一组事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$  需满足互斥性和完全性

全概率公式 
$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$$

贝叶斯公式 
$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}, i = 1, 2, \dots, n$$

## § 6 独立性 Independence

对A、B两事件，一般来说，事件A的发生对事件B发生的概率是有影响的，此时  $P(B|A) \neq P(B)$ ，只有当这种影响不存在时才有  $P(B|A) = P(B)$ ，这时有

$$P(AB) \xrightarrow{\text{乘法公式}} P(B|A)P(A) = P(B)P(A)$$

于是给出如下直观性定义。

## 直观性定义

设A、B两事件，如果其中任何一个事件发生的概率不受另外一个事件发生与否的影响，则称事件A、B相互独立。

## 数学定义


设A、B两事件，如果等式 $P(AB) = P(A)P(B)$ 成立，称事件A、B相互独立，简称A、B独立。

## 区别

A、B相互独立

事件的发生不受对方影响

$$P(AB) = P(A)P(B)$$




$AB$

A、B互不相容

两事件不能同时发生

$$AB = \emptyset, P(AB) = 0$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$



$AB = \emptyset$

## 结 论

若 $P(A) > 0$ ,  $P(B) > 0$ , 则

A、B相互独立与A、B互不相容 **不能同时成立**。

若A、B相互独立  $P(AB) = P(A)P(B) > 0$

而A、B互不相容有 $P(AB) = 0$ , 故A、B不是互不相容

若A、B互不相容  $AB = \emptyset, P(AB) = 0$

而 $P(A)P(B) > 0$

则 $P(AB) \neq P(A)P(B)$ , 故A、B不是相互独立

## 举例

设随机试验E是在相同条件下重复抛掷一枚均匀的硬币，观察正反面出现的情况，设，

$A = \{\text{第一次出现正面}\}$

$B = \{\text{第二次出现正面}\}$

则  $A$  与  $\bar{A}$  是互不相容的？ 是

$A$  与  $\bar{A}$  是相互独立的？ 不是

则  $A$  与  $B$  是相互独立的？ 是

$A$  与  $B$  是互不相容的？ 不是

## 两事件独立性的性质

### 定理一

设A、B相互独立，且 $P(A) > 0$ ，则 $P(B|A) = P(B)$ ；  
反之亦然。



说明： A、B独立时，B发生的概率与A无关

### 定理二（独立性关于逆运算封闭）

若A,B相互独立，则A与 $\bar{B}$ ,  $\bar{A}$ 与B,  $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也相互独立。





**定理一** 设A、B相互独立，且 $P(A) > 0$ ，则 $P(B|A) = P(B)$ ；  
反之亦然。

证：

$$P(B|A) \xrightarrow{\text{条件P定义}} \frac{P(AB)}{P(A)} \overset{\text{AB独立}}{=} \frac{P(A)P(B)}{P(A)} = P(B)$$

反之

$P(AB)=P(A)P(B) \longrightarrow A、B\text{相互独立}$

得证



**定理二** 若A,B相互独立, 则A与 $\bar{B}$ ,  $\bar{A}$ 与B,  $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也相互独立。

**证:** 1) A与 $\bar{B}$ 独立, 需证 $P(A\bar{B})=P(A)P(\bar{B})$

$$P(A\bar{B}) \xrightarrow{\text{差事件}} P(A - AB) \xrightarrow{AB \subset A} P(A) - P(AB)$$

$$\xrightarrow{A,B \text{ 独立}} P(A) - P(A)P(B) = P(A)[1 - P(B)] = P(A)P(\bar{B})$$

2)  $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立, 需证 $P(\bar{A}\bar{B})=P(\bar{A})P(\bar{B})$

$$P(\bar{A}\bar{B}) \xrightarrow{\text{德摩根律}} P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$$

$$\xrightarrow{\text{加法公式}} 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)]$$

$$\xrightarrow{A,B \text{ 独立}} 1 - [P(A) + P(B) - P(A)P(B)]$$

$$\xrightarrow{\text{整理}} [1 - P(A)][1 - P(B)] = P(\bar{A})P(\bar{B}) \quad \text{得证}$$



可以将两事件独立性的概念推广到三事件情形：

**定义** 设A、B、C三事件，如果满足等式

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

$$P(BC) = P(B)P(C)$$

$$P(AC) = P(A)P(C)$$

称A、B、C事件**两两相互独立**。

若A、B、C事件两两相互独立，且还满足

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$$

称事件A、B、C**相互独立**。

例：四卡片分别标1， 2， 3， 4， 随机抽取一张，

记事件  $A = \{\text{取到1或2}\}$

$B = \{\text{取到1或3}\}$

$C = \{\text{取到1或4}\}$

可知  $P(A) = 1/2$ ,  $P(B) = 1/2$ ,  $P(C) = 1/2$

$P(AB) = 1/4$ ,  $P(BC) = 1/4$ ,  $P(AC) = 1/4$

$P(ABC) = 1/4 \neq P(A)P(B)P(C) = 1/8$

说明：A、B、C三事件？ 两两相互独立



相互独立



推广到 $n$ 个事件独立情形:

**定义** 设 $n (\geq 2)$ 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ , 如果其中任意 $k (2 \leq k \leq n)$ 个事件的积事件的概率都等于各事件概率之积, 则称事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$  **相互独立**。

若 $n$ 事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 即下列等式同时成立

$$P(A_i A_j) = P(A_i) P(A_j), \quad i \neq j, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

$$P(A_i A_j A_k) = P(A_i) P(A_j) P(A_k), \quad i \neq j \neq k,$$

$$i, j, k = 1, 2, \dots, n$$


$$\dots P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1) P(A_2) \dots P(A_n)$$

$$C_n^2$$

$$C_n^3$$

$$\vdots$$

$$C_n^n$$



等式总数

$$2^n - n - 1$$

由定义可以得到以下推论：

### 推论1

若事件 $A_1, A_2, \cdots A_n$  ( $n \geq 2$ )相互独立，则其中任意 $k$  ( $2 \leq k \leq n$ )个事件也是相互独立的。

### 推论2

若 $n$ 个事件相互独立，则将其中的任意多个事件换成他们各自的对立事件，所得的 $n$ 个事件仍相互独立的。（独立性关于逆运算封闭）

由推论2可知下列等式成立：

等式数

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2) \cdots P(A_n) \quad C_n^0$$

$$P(A_1 A_2 \cdots \bar{A}_i \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2) \cdots P(\bar{A}_i) \cdots P(A_n), \quad i=1,2,\cdots,n \quad C_n^1$$

$$P(A_1 A_2 \cdots \bar{A}_i \cdots \bar{A}_j \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2) \cdots P(\bar{A}_i) \cdots P(\bar{A}_j) \cdots P(A_n), \quad C_n^2$$

$$i \neq j = 1, 2, \cdots, n$$

⋮

$$P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_n) = P(\bar{A}_1) P(\bar{A}_2) \cdots P(\bar{A}_n) \quad C_n^n$$

等式总数  $= 2^n$

一般常用上述最后一个等式。

如：  $n$  个事件  $A_1, A_2, \dots, A_n$  相互独立，则可以利用**独立事件的性质**计算其**和事件的概率**。

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(A_i))$$



特别地，当  $P(A_i) = p$  时，  $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - (1 - p)^n$

**说明：** 实际应用中，往往不是根据定义来判断事件是否独立，而是根据实际意义来判断的。

如： 事件之间没有关联或关联很微弱时，则认为它们独立。





$$\mathbf{P}\left(\bigcup_{i=1}^n \mathbf{A}_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - \mathbf{P}(\mathbf{A}_i))$$

证:

$$\mathbf{P}\left(\bigcup_{i=1}^n \mathbf{A}_i\right) \xlongequal{\text{逆事件}} 1 - \mathbf{P}\left(\overline{\mathbf{A}_1 \cup \mathbf{A}_2 \cup \cdots \cup \mathbf{A}_n}\right)$$

$$\xlongequal{\text{德摩根律}} 1 - \mathbf{P}\left(\bar{\mathbf{A}}_1 \cap \bar{\mathbf{A}}_2 \cap \cdots \cap \bar{\mathbf{A}}_n\right)$$



$$\xlongequal{\text{事件独立}} 1 - \mathbf{P}(\bar{\mathbf{A}}_1) \mathbf{P}(\bar{\mathbf{A}}_2) \cdots \mathbf{P}(\bar{\mathbf{A}}_n)$$


$$= 1 - \mathbf{P}(1 - \mathbf{A}_1) \mathbf{P}(1 - \mathbf{A}_2) \cdots \mathbf{P}(1 - \mathbf{A}_n)$$

得证



例 一个元件(或系统)能正常工作的概率称为元件(或系统)的可靠度。如果一个系统由 $2n$ 个元件组成,每个元件能否正常工作是相互独立的,且可靠度为 $r$ ,求下列两个系统的可靠度。





解: 设  $B = \{\text{支路1正常工作}\}$ ,  $C = \{\text{支路2正常工作}\}$ ,


$B_i = \{\text{支路1中元件}i\text{正常工作}\}$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$

$C_i = \{\text{支路2中元件}i\text{正常工作}\}$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$

$$\text{法1 } R^I = P(B \cup C) \xrightarrow{\text{加法公式}} P(B) + P(C) - P(BC)$$

$$\xrightarrow{\text{B,C独立}} P(B) + P(C) - P(B)P(C) = r^n + r^n - r^n r^n = r^n (2 - r^n)$$

$$R^B = P(B) = P(B_1 B_2 \cdots B_n) \xrightarrow{\text{独立}} \prod_{i=1}^n P(B_i) = r^n \xrightarrow{\text{同理}} P(C)$$



设  $B = \{\text{支路1正常工作}\}$ ,  $C = \{\text{支路2正常工作}\}$ ,


$B_i = \{\text{支路1中元件}i\text{正常工作}\}$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$

$C_i = \{\text{支路2中元件}i\text{正常工作}\}$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$

法2  $R^I = P(\underline{B \cup C}) \stackrel{\text{逆}}{=} 1 - P(\overline{B \cup C}) = 1 - P(\bar{B}\bar{C})$

$\stackrel{\text{B,C独立}}{=} 1 - P(\bar{B})P(\bar{C}) = 1 - \underline{(1 - r^n)(1 - r^n)} = r^n(2 - r^n)$

即：独立事件和  $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(A_i))$



设  $A_i = \{\text{第}i\text{个并联子系统正常工作}\}$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$

$B_i, C_i = \{\text{元件}i\text{正常工作}\}$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$

$$R^{\text{II}} = P(A_1 A_2 \cdots A_n)$$

独立

$$\prod_{i=1}^n P(\underline{A_i}) = \prod_{i=1}^n P(\underline{B_i \cup C_i}) = \prod_{i=1}^n r(2-r) = r^n (2-r)^n$$



$(B_i \cup C_i)$

即：独立事件和



# 比较系统的可靠性

$$R^I = r^n (2 - r^n)$$

$$R^{II} = r^n (2 - r)^n$$



关键比较  $(2 - r^n)$  和  $(2 - r)^n$  的大小



当  $n \geq 1$  时,  $R^{II} \geq R^I \geq R^B = r^n$

# 小结

独立性的定义、结论、性质和应用。

# 作业

Page 28:

第35, 36, 37, 38, 40题



俗语“**三个臭皮匠，顶个诸葛亮**”是否正确？

假设诸葛亮解决问题的概率是0.9

臭皮匠A独立解决问题的概率为 $P(A)=0.5$

臭皮匠B独立解决问题的概率为 $P(B)=0.6$

臭皮匠C独立解决问题的概率为 $P(C)=0.6$

三个臭皮匠解决问题的概率为 ？

$$P(\underline{A \cup B \cup C}) = 1 - (1 - P(A))(1 - P(B))(1 - P(C))$$

$$= 0.92 > 0.9$$

即：独立事件和  $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(A_i))$