

I. Exercices**I.1. Vraies ou fausses**

Déterminer parmi les propositions suivantes lesquelles sont vraies :

- 136 est un multiple de 17 et 2 divise 167.
- 136 est un multiple de 17 ou 2 divise 167.
- $\exists x \in \mathbb{R}, (x + 1 = 0 \text{ et } x + 2 = 0)$.
- $(\exists x \in \mathbb{R}, x + 1 = 0) \text{ et } (\exists x \in \mathbb{R}, x + 2 = 0)$.
- $\forall x \in \mathbb{R}, (x + 1 \neq 0 \text{ ou } x + 2 \neq 0)$.
- $\exists x \in \mathbb{R}^*, \forall y \in \mathbb{R}^*, \forall z \in \mathbb{R}^*, z - xy = 0$;
- $\forall y \in \mathbb{R}^*, \exists x \in \mathbb{R}^*, \forall z \in \mathbb{R}^*, z - xy = 0$;
- $\forall y \in \mathbb{R}^*, \forall z \in \mathbb{R}^*, \exists x \in \mathbb{R}^*, z - xy = 0$;
- $\exists a \in \mathbb{R}, \forall t > 0, |a| < t$;
- $\forall t > 0, \exists a \in \mathbb{R}, |a| < t$.

II. Indicators

III. Vraies ou fausses

pas d'indication :(

IV. Corriges**V. Vraies ou fausses**

- Cette proposition est fausse, car 2 ne divise pas 167.
- Cette proposition est vraie, car 136 est un multiple de 17.
- Cette proposition est fausse, car x devrait être simultanément égal à -1 et à -2.
- Cette proposition est vraie car $(\exists x \in \mathbb{R}, x + 1 = 0)$ est vraie (il suffit de prendre $x = -1$) et de la même façon $(\exists x \in \mathbb{R}, x + 2 = 0)$ est vraie (il suffit de prendre $x = -2$).
- Cette proposition est vraie, par exemple car il s'agit de la négation de la proposition 3, qui est fausse.
- Cette assertion est fausse. Si on considère x n'importe quel réel non nul, alors le choix de $y = 1$ et de $z = 2x$ fait que z est différent de xy .
- Cette assertion est fausse. Prenons n'importe quel y dans \mathbb{R}^* . On voudrait trouver x dans \mathbb{R}^* tel que, pour tout z dans \mathbb{R}^* , on ait $z = xy$. Bien sûr, ce n'est pas possible, car le x que l'on choisit devrait convenir à toute valeur de z , ce qui n'est pas possible car il suffit de considérer un z différent de xy .
- Cette assertion est vraie, car on peut choisir x une fois y et z fixés. On choisit alors $x = z/y$.
- L'assertion est vraie, il suffit de prendre $a = 0$ (convient pour toute valeur de $gt; 0$).
- Cette assertion est "évidemment" vraie car elle est plus faible que la précédente (on peut choisir a après $gt; 0$).