

IMMUNORHO 300mcg PFS

Anti-D Immunoglobulin

در مورد دارو و کاربرد آن

"ایمونورو" محلولی حاوی ایمونوگلوبولین های انسانی بر ضد آنتی ژن های (Rh(D) گلبول قرمز انسان می باشد. از این فراورده برای پیشگیری پس از تماس با آنتی ژن های (Rh(D) سطح گلبول های قرمز در افرادی که فاقد این آنتی ژن ها هستند (Rh(D) استفاده می گردد.

بیمار قبل از مصرف دارو چه چیزهایی را باید بداند

اگر شما نسبت به ایمونوگلوبولین های انسانی و هر کدام از ترکیبات این دارو دارای حساسیت می باشید، نباید از این فراورده استفاده نمایید.

توصیه های عمومی

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. از توصیه آن به دیگران خودداری کنید حتی اگر علائم مشابه بیماری شما را دارند زیرا این موضوع می تواند به سلامت آنها آسیب برساند.

اگر بعد از مصرف این دارو، عوارض جانبی دارو در شما تشدید گردید یا اینکه عوارض جانبی جدیدی در خود مشاهده نمودید که در این بروشور ذکر نگردیده است، پزشک خود را آگاه نمایید.

شکل و قوت دارویی

سرنگ از پیش پر شده آماده تزریق حاوی ۳۰۰ میکروگرم (۱۵۰۰ واحد بین المللی) آنتی-دی ایمونوگلوبولین انسانی در دو میلی لیتر محلول

موارد مصرف

پیشگیری از ایمن سازی (Rh (D در زنان با (Rh (D منفی

درمان افراد با (Rh (D منفی پس از تزریق خون ناسازگار با (Rh (D مثبت یا سایر فراورده های حاوی سلولهای قرمز خون مانند پلاکت های کنسانتره

مقدار و نحوه مصرف

موارد مصرف دوز دارو توضیحات

پیشگیری پس از زایمان ۱۵۰۰-۱۰۰۰ IU (۲۰۰-۳۰۰ mcg) تزریق به صورت

داخل عضلانی حداکثر ۷۲ ساعت پس از زایمان

پیشگیری قبل و پس از زایمان ۱۵۰۰-۱۰۰۰ IU (۲۰۰-۳۰۰ mcg) تزریق به صورت

داخل عضلانی در طی هفته ۲۸ از بارداری، در صورتیکه مادر (Rh (D مثبت باشد باید یک دور اضافی ۱۵۰۰-۱۰۰۰ واحد بین المللی در طی ۷۲ ساعت بعد از زایمان تزریق گردد.

پس از توقف بارداری، حاملگی خارج رحمی و مول هیداتیفرم ۶۰۰-۷۵۰ IU (۱۲۰-۱۵۰ mcg)/قبل از هفته ۱۲ تزریق حداکثر ۷۲ ساعت پس از زایمان

۱۲۵۰-۱۵۰۰ IU (۲۵۰-۳۰۰ mcg)/ بعد از هفته ۱۲ تزریق حداکثر ۷۲ ساعت پس از زایمان

مصرف بیش از اندازه

نتایج مصرف بیش از اندازه این فراورده ناشناخته می باشد.

موارد منع مصرف

هرگونه حساسیت نسبت به ماده فعال یا مواد جانبی این دارو

هرگونه حساسیت نسبت به ایمونوگلوبولین های انسانی

عوارض جانبی احتمالی

شوک آنافیلاکتیک- سردرد- افزایش ضربان قلب- کاهش فشار خون- تهوع- استفراغ- حساسیت پوستی- خارش- درد مفاصل- تب- لرز- بی قراری- درد، تورم،

قرمزی و خارش در محل تزریق

تداخلات دارویی

اگر اخیراً از سایر داروها یا فراورده های دارویی بدون نیاز به نسخه استفاده کرده اید، پزشک یا داروساز خود را مطلع نمایید.

"ایمونورو" نباید با سایر فراورده های دارویی مخلوط گردد.

واکسن های حاوی ویروس زنده ضعیف شده:

مصرف "ایمونورو" ممکن است تا حداکثر سه ماه بر روی کارایی واکسن های زنده ضعیف شده مانند اربون، سرخجه، سرخک و آبله مرغان اختلال ایجاد نماید

بنابراین بعد از تزریق "ایمونورو" به مدت سه ماه نباید از این واکسن ها استفاده نمود. همچنین در صورت استفاده از واکسن های حاوی ویروس زنده ضعیف شده باید به مدت سه تا چهار هفته از تزریق "ایمونورو" خودداری نمود.

تداخل با آزمایشان سرولوژیک:

اگر بعد از تزریق "ایمونورو" تصمیم به انجام آزمایش خون دارید، پزشک یا پرستار خود را از این امر آگاه نمایید. این دارو ممکن است با برخی از آزمایشات خون

مربوط به آنتی بادی های گلبول قرمز تداخل ایجاد نماید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

این فراورده با هدف مصرف در دوره بارداری ایجاد گردیده است.

هشدار و احتیاط

تزریق این فراورده به صورت داخل عروقی به دلیل امکان ایجاد شوک ممنوع می باشد.

این فراورده جهت استفاده در زنان (Rh(D) مثبت و همچنین زنانی که از قبل نسبت به (Rh(D) ایمن هستند، در نظر گرفته نشده است.

مصرف آنتی-دی ایمونوگلوبولین ها ندرتا می تواند سبب ایجاد عوارضی مانند افت ناگهانی فشار خون همراه با اختلال در تنفس، غش، تب و عوارض پوستی گردد. این موارد حتی هنگامی که شما در تزریق قبلی خود مشکلی نداشته اید نیز می تواند بروز نماید.

اگر در حین تزریق این فراورده، پزشک معالج شما نسبت به بروز واکنش های آلرژیک یا آنافیلاکتیک مشکوک گردد باید بلافاصله تزریق را متوقف نماید. در

موارد بروز شوک، پزشک شما باید درمان استاندارد شوک را پیگیری نماید.

این فراورده حاوی مقادیر کمی از IgA می باشد. افرادی که دارای کمبود IgA می باشند بالقوه ممکن است آنتی بادی هایی بر علیه IgA تولید نمایند و در نتیجه

ممکن است پس از دریافت فراورده های خونی حاوی این ترکیب، واکنش های آنافیلاکتیک بروز دهند.

این فراورده حاوی ۳/۹ میلی گرم سدیم در هر میلی لیتر می باشد. بنابراین اگر شما در حال رعایت رژیم غذایی کم نمک هستید، این مورد را باید لحاظ نمایید.

تاثیر بر روی امکان رانندگی و یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند

تاثیری از مصرف ایمونوگلوبولین های هپاتیت "بی" بر روی رانندگی و استفاده از ماشین آلات مشاهده نگردیده است.

شرایط حمل و نگه داری دارو

دریخچالدردمای دو تا هشتدرجه سانتیگراد در بسته بندی اصلی

نگهداری و از یخزدگی محافظت نگردد

آدرس و تلفن تماس جهت پاسخگویی بیشتر

نماینده انحصاری در ایران: شرکت بهستان دارو

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پ ۱۰، ساختمان بهستان

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۷۴۲۰۰