

# Lipanthyl 200mg

## فنوفیبرات

لیپانتیل® ۲۰۰ میلی گرم  
فنوفیبرات میکرونیزه

مشخصات دارو

نام دارو

لیپانتیل® ۲۰۰ میکرونیزه، کپسول.

فنوفیبرات

ترکیبات دارو در هر کپسول

فنوفیبرات (INN): ۲۰۰ میلی گرم

سدیم لوریل سولفات، لاکتوز، نشاسته ژلاتینه شده، کروسپوویدون، منیزیوم

استئارات.

پوشش کپسول: ژلاتین، تیتانیوم دی اکساید (E۱۷۱)، اکسید آهن (E۱۷۲)،

ایریتروسین (E۱۲۷).

شکل دارویی

کپسول سخت.

گروه دارویی-درمانی

داروهای کاهش دهنده لیپید سرم/کاهش دهنده تری گلیسیرید و

کلسترول/فیبرات ها.

### موارد مصرف

این دارو در درمان هایپرکلسترولمی (افزایش غیرطبیعی سطوح کلسترول خون)

و یا هایپرتری گلیسریدمی (افزایش غیرطبیعی سطوح تری گلیسریدها-چربی-در

خون) در بالغین، در صورت پاسخ نامناسب به رعایت رژیم غذایی، مورد مصرف

دارد.

### موارد هشدار!

#### موارد منع مصرف

این دارو را در موارد زیر مصرف نکنید:

- اختلال کبدی

- اختلال کلیوی

- در کودکان

- حساسیت به فنوفیبرات و یا سایر ترکیبات موجود در دارو

- واکنش فتوتوکسیک یا فتوآلرژیک (واکنش های پوستی پس از برخورد نور

خورشید یا اشعه ماوراء بنفش مصنوعی) در طی مصرف فنوفیبرات یا داروهایی

که از نظر ساختاری مشابه آن می باشند، به خصوص کتوپروفن (داروی

ضدالتهابی).

هشدارهای ویژه

- در صورت ابتلا به درد عضلانی سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید (به "عوارض

جانبی ناخواسته" رجوع شود).

- قبل از شروع درمان آزمایش های کبدی انجام می گردد. این آزمایش ها در طی

سال اول درمان به طور منظم تکرار می گردند.

- بعلت دارا بودن لاکتوز در فرمولاسیون این فرآورده، مصرف این دارو در بیماران

مبتلا به گالاکتوزمی مادرزادی، بیماران دارای کمبود ژنتیکی لاکتاز (بیماری

متابولیک نادر) یا بیماران مبتلا به اختلال در جذب گلوکز- گالاکتوز، توصیه نمی

شود.

### موارد احتیاط

مصرف این دارو جایگزین رعایت رژیم غذایی نیست؛ ادامه رژیم غذایی مناسب

کاملاً ضروری است.آزمایش خون باید به طور منظم انجام شود.

### تداخلات دارویی و سایر تداخلات

لطفاً برای جلوگیری از بروز تداخلات دارویی، اگر در حال حاضر دارویی مصرف می

کنید، به پزشک خود اطلاع دهید. همچنین در صورت مشاهده هر گونه علائم

غیرطبیعی در طی دوره درمان، به خصوص در مصرف همزمان این فرآورده با یک

داروی ضد انعقاد یا یک داروی کاهش دهنده کلسترول دیگر (فیبرات، استاتین)،

پزشک یا داروساز خود را مطلع کنید.

### مصرف در بارداری و شیردهی

مصرف این دارو در دوران بارداری مطلقاً ممنوع است. در صورت بروز بارداری در

حین مصرف این دارو، دارو را سریعاً قطع نموده و پزشک خود را مطلع نمایید.

از آنجا که در مورد ترشح این دارو در شیر مادر اطلاعاتی در دست نیست، این دارو

را در دوران شیردهی مصرف نکنید.

### این دارو را چگونه باید مصرف کرد؟

مقدار مصرف

مقدار مصرف یک عدد کپسول در روز است.

همیشه لیپانتیل® ۲۰۰ میلی گرم را مطابق دستور پزشک مصرف کنید.

روش و راه مصرف

این دارو به صورت خوراکی مصرف می شود.

### میزان و زمان مصرف دارو

مقدار مصرف یک عدد کپسول در روز همراه با وعده غذایی و طبق دستور پزشک

معالج می باشد.

### مدت درمان

این دارو همراه با رعایت رژیم غذایی، در درمان علامتی طولانی مدت مصرف می

شود. بیمار باید به طور منظم تحت نظارت پزشک باشد.

جهت مصرف صحیح این دارو، بیمار باید به طور منظم تحت آزمایش های

پزشکی میان دوره ای قرار گیرد.

### عوارض جانبی ناخواسته

مانند تمام فرآورده‌های دارویی، کپسول های میکرونیزه لیپانتیل®۲۰۰میلی گرم،

ممکن است در برخی افراد، دارای عوارض جانبی باشند.

### این عوارض به ندرت بروز می کنند و خوش خیم می باشند:

- اختلالات گوارشی از جمله سوء هاضمه

- واکنش های پوستی آلرژیک یا حساس به نور از جمله التهاب و راش پوستی، یا

خارش (زیر نور آفتاب یا اشعه ماوراء بنفش مصنوعی). در برخی موارد، ممکن

است حتی بعد از چند ماه مصرف بدون عارضه دارو، در قسمت هایی از پوست

که در معرض نور خورشید یا اشعه ماوراء بنفش مصنوعی می باشند، واکنش های

پوستی رخ دهد.

- افزایش موقتی ترانس آمینازها (آنزیم های کبدی)

- سنگ های صفراوی

- بیماری های ریوی

- درد عضلانی (در برخی موارد همراه با افزایش آنزیم های عضلانی)

در موارد درد عضله، حساسیت دردناک عضله یا ضعف عضلانی، فوراً پزشک خود

را مطلع کنید زیرا اختلالات عضلانی ممکن است در موارد نادر شدید و تهدیدکننده

حیات شوند.

با مشاهده هر گونه عارضه جانبی غیر از آنچه در این برگه ذکر شده است، پزشک

یا داروساز خود را مطلع کنید.

### روش نگهداری

دارو را پس از سپری شدن تاریخ انقضای آن مصرف نکنید.

احتیاطات ویژه برای نگهداری

دارو را در جای خشک نگهداری کنید.

دارو را در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری کنید.