

• نام فرآورده و مورد مصرف آن:

الکر®؛ محصول کمپانی ابوت، یک شیر خشک هایپوآلرژنیک، حاوی آهن و بر پایه آمینو اسید است. این فرآورده در کودکان زیر یک سال که به اختلالات گوارشی و آلرژی های شدید غذایی دچار می باشند، مصرف می شود.

• قبل از مصرف این محصول چه چیزهایی را باید بدانید:

این فرآورده جهت مصرف وریدی نمی باشد.

• توصیه های عمومی:

- پودر شیر خشک استریل نیست و نباید جهت تغذیه نوزادان نارس و یا شیرخواران مبتلا به مشکلات سیستم ایمنی استفاده گردد، مگر توسط پزشک و کودک شما تجویز و نظارت شود.
- رعایت دقیق دستورالعمل های مصرف، جهت سلامت کودک شما ضروری است. بهداشت مناسب در هنگام آماده سازی و استفاده از شیر خشک بسیار مهم است و عدم رعایت آن می تواند به سلامت کودک آسیب برساند. از پزشک خود سؤال نمایید که آیا نیاز هست از آب جوشانده شده خنک شده و یا سر شیشه و شیشه شیر جوشانده شده (استریل) استفاده شود؟
- طبق دستور پزشک مصرف گردد.
- به تاریخ انقضای درج شده در کف قوطی توجه نمایید.

• شکل فرآورده:

پودر در قوطی ۴۰۰ گرمی

• موارد مصرف:

- جهت مصرف در کودکان زیر یک سال مبتلا به اختلالات گوارشی و آلرژی های شدید غذایی که نمی توانند پروتئین شیر، سویا و یا شیر خشک های حاوی پروتئین های هیدرولیز شده را تحمل کنند.

• مقدار و نحوه مصرف:

- جهت آماده سازی: ۱- دست ها، تمامی سطوح و ظروف مورد استفاده را بشویید. مقدار تجویز شده از آب را در بطری تمیز بریزید (به جدول راهنمای اندازه ها توجه کنید) ۲- به ازای هر ۵۹ میلی لیتر آب (۲ fl oz)، یک پیمانه سر صاف (معادل ۹/۴ گرم) از پودر شیر خشک را به آب اضافه نمایید، پیمانه را خشک کرده و به داخل قوطی بازگردانید. ۳- درب بطری را گذاشته و به خوبی تکان دهید. به محض اینکه مصرف یک وعده را شروع کردید، آن وعده را ظرف مدت یک ساعت مصرف نمایید و باقیمانده را دور بریزید.

راهنمای اندازه ها :

میزان آب مورد نیاز	تعداد پیمانه شیر خشک	حجم محلول نهایی
۶۰ میلی لیتر (۲ fl oz)	۱ پیمانه سر صاف (۹/۴ گرم)	۶۰ میلی لیتر
۱۱۸ میلی لیتر (۴ fl oz)	۲ پیمانه سر صاف (۱۸/۸ گرم)	۱۱۸ میلی لیتر
۱۷۷ میلی لیتر (۶ fl oz)	۳ پیمانه سر صاف (۲۸/۲ گرم)	۱۷۷ میلی لیتر

• هشدار

برای آماده سازی گرم کردن شیر خشک هرگز از دستگاه های میکروویو استفاده نکنید. متواند منجر به سوختگی-ها بجد شود.

• سایر اطلاعات:

تحت نظارت و دستور پزشک، الکر قابلیت استفاده در تیوب فیدینگ را دارد.

• شرایط نگهداری دارو:

به محض آماده سازی، ظرف حاوی محلول آماده شده را در داخل یخچال قرار دهید و ظرف مدت ۲۴ ساعت کودک را با آن تغذیه نمایید. قوطی باز نشده و یا باز شده را در دمای اتاق نگهداری نمایید؛ از نگهداری در دماهای بالا اجتناب نمایید. محتویات قوطی باز شده را طی مدت ۱ ماه مصرف نمایید.