



UMAN ALBUMIN 200g/ I 50 ml

Human Albumin

در مورد دارو و کاربرد آن

"اومن آلبومین"، آلبومین انسانی برگرفته شده از پلاسمای انسان می باشد. این فراورده به منظور بازیابی و حفظ حجم خون در گردش در بیماران نیازمند به این فراورده مورد استفاده قرار می گیرد.

بیمار قبل از مصرف دارو چه چیزهایی را باید بداند

اگر شما نسبت به آلبومین و هر کدام از ترکیبات این دارو دارای حساسیت می باشید، نباید از این فراورده استفاده نمایید.

توصیه های عمومی

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. از توصیه آن به دیگران خودداری کنید حتی اگر علائم مشابه بیماری شما را دارند زیرا این موضوع می تواند به سلامت آنها آسیب برساند.

اگر بعد از مصرف این دارو، عوارض جانبی دارو در شما تشدید گردید یا اینکه عوارض جانبی جدیدی در خود مشاهده نمودید که در این بروشور ذکر نگردیده است، پزشک خود را آگاه نمایید.

شکل و قوت دارویی

محلول تزریقی حاوی ۲۰۰ گرم در هر لیتر آلبومین انسانی

موارد مصرف

بازیابی و جایگزینی حجم خون در گردش در موارد کاهش حجم خون و در صورتیکه استفاده از کلئیدها مناسب باشد.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف این فراورده به عواملی چون اندازه بیمار، شدت بیماری یا تروما و میزان از دست رفت پیوسته مایعات و پروتئینهای بدن بیمار بستگی دارد.

موارد منع مصرف

هرگونه حساسیت نسبت به ماده فعال یا مواد جانبی این دارو

عوارض جانبی احتمالی

گرگرفتگی- کهیر- تب- تهوع

تداخلات دارویی

اگر اخیرا از سایر داروها یا فراورده های دارویی بدون نیاز به نسخه استفاده کرده اید، پزشک یا داروساز خود را مطلع نمایید اگرچه تداخل دارویی شناخته شده ای بین آلبومین انسانی با سایر فراورده های دارویی در دسترس نیست.

اومن آلبومین نباید با سایر فراورده های دارویی، خون کامل یا بسته های گلوبول قرمز مخلوط گردد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

اطلاعاتی در مورد ایمنی این فراورده جهت استفاده در دوران بارداری در دسترس نمی باشد بنابراین توصیه می گردد با احتیاط مصرف گردد اگرچه نتایج کارآزمایی های بالینی انجام گرفته بر روی آلبومینانسانی خطر خاصی را نشان نداده اند.

هشدار و احتیاط

اگر در حین تزریق این فراورده، پزشک معالج شما نسبت به بروز واکنش های آلرژیک یا آنافیلاکتیک مشکوک گردد باید بلافاصله تزریق را متوقف نماید. در موارد بروز شوک، پزشک شما باید درمان استاندارد شوک را پیگیری نماید.

آلبومین در مواردی که افزایش حجم خون یا رقیق شدن خون باعث ایجاد خطرات قابل توجهی برای بیمار گردد باید با احتیاط مصرف گردد. مثال هایی از این موارد شامل نارسایی قلبی، فشار خون شریانی، ادم ریوی، کم خونی شدید و نارسایی کلیوی می باشد.

این فراورده برای تزریق نباید با آب رقیق گردد زیرا این امر می تواند سبب ایجاد همولیز در بیمار گردد.

درموردی که با مصرف این فراورده حجم از دست رفته نسبتا زیادی جایگزین گردد، کنترل نمودن فاکتورهای انعقادی و هماتوکریت بیمار ضروری می باشد.

همچنین باید نسبت به کنترل سایر اجزای خونی مثل الکترولیت ها، پلاکت ها و گلبول های قرمز مراقبت ویژه ای صورت گیرد. در موارد کاهش هماتوکریت به کمتر از سی درصد، باید تزریق گلبول های قرمز بسته بندی شده به بیمار برای حفظ ظرفیت اکسیژن رسانی خون مدنظر قرار گیرد.

تاثیر بر روی امکان رانندگی و یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند تاثیری از مصرف این فراورده بر روی رانندگی و استفاده از ماشین آلات مشاهده نگردیده است.

شرایط حمل و نگه داری دارو

دردمایکمتر از سی درجه سانتیگرادو در بسته بندی اصلی نگهداریواریخزدگیمحافظتنگردد.

آدرس و تلفن تماس جهت پاسخگویی بیشتر

نماینده انحصاری در ایران: شرکت بهستان دارو

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پ ۱۰، ساختمان بهستان

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۷۴۲۰۰