

TETANUS GAMMA 250 IU/1 ml

Tetanus Immunoglobulin

در مورد دارو و کاربرد آن

"تتانوس گاما" محلولی حاوی ایمونوگلوبولین های انسانی بر ضد بیماری کزاز می باشد. از این فراورده برای پیشگیری پس از تماس با باکتری کلستریديم تتانی استفاده می گردد.

بیمار قبل از مصرف دارو چه چیزهایی را باید بداند

اگر شما نسبت به ایمونوگلوبولین های انسانی و هر کدام از ترکیبات این دارو دارای حساسیت می باشید، نباید از این فراورده استفاده نمایید.

توصیه های عمومی

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. از توصیه آن به دیگران خودداری کنید حتی اگر علائم مشابه بیماری شما را دارند زیرا این موضوع می تواند به سلامت آنها آسیب برساند.

اگر بعد از مصرف این دارو، عوارض جانبی دارو در شما تشدید گردید یا اینکه عوارض جانبی جدیدی در خود مشاهده نمودید که در این بروشور ذکر نگردیده است، پزشک خود را آگاه نمایید.

شکل و قوت دارویی

سرنگ از پیش پر شده آماده تزریق حاوی ۲۵۰ واحد بین المللی ایمونوگلوبولین انسانی تتانوس در یک میلی لیتر محلول

موارد مصرف

پیشگیری سریع از ابتلا به بیماری کزاز بعد از ایجاد زخم های مستعد به کزاز در افرادی که به میزان کافی واکسینه نشده اند، افرادی که وضعیت ایمنی آنها در برابر کزاز نامشخص می باشد و افرادی که نقص شدیدی در تولید آنتی بادی دارند.

درمان بیماری کزاز همراه با علائم بالینی-

مقدار و نحوه مصرف

اندیکاسیون علائم بالینی دوز

پروفیلاکسی(پیشگیری) زخم های مستعد به عفونت کزاز IU ۲۵۰

زخم های عفونی در شرایطی که درمان های جراحی مناسب آن طی مدت ۲۴ ساعت ممکن نباشد.

زخم های عمیق یا آلوده همراه با آسیب بافتی و کاهش میزان اکسیژن رسانی IU ۵۰۰

درمان کزاز همراه با علائم بالینی IU ۶۰۰۰-۳۰۰۰

مصرف بیش از اندازه

نتایج مصرف بیش از اندازه این فراورده ناشناخته می باشد

موارد منع مصرف

هرگونه حساسیت نسبت به ماده فعال یا مواد جانبی این دارو

هرگونه حساسیت نسبت به ایمونوگلوبولین های انسانی

عوارض جانبی احتمالی

شوک آنافیلاکتیک- سردرد- افزایش ضربان قلب- کاهش فشار خون- تهوع- استفراغ- حساسیت پوستی- خارش- درد مفاصل- تب- لرز- بی قراری- درد، تورم، قرمزی و خارش در محل تزریق

تداخلات دارویی

اگر اخیرا از سایر داروها یا فراورده های دارویی بدون نیاز به نسخه استفاده کرده اید، پزشک یا داروساز خود را مطلع نمایید.

"تتانوس گاما" نباید با سایر فراورده های دارویی مخلوط گردد.

واکسن های حاوی ویروس زنده ضعیف شده:

مصرف "تتانوس گاما" ممکن است تا حداکثر سه ماه بر روی کارایی واکسن های زنده ضعیف شده مانند اریون، سرخچه، سرخک و آبله مرغان اختلال ایجاد نماید بنابراین بعد از تزریق "تتانوس گاما" به مدت سه ماه نباید از این واکسن ها استفاده نمود. همچنین در صورت استفاده از واکسن های حاوی ویروس زنده ضعیف شده باید به مدت سه تا چهار هفته از تزریق "تتانوس گاما" خودداری نمود.

تداخل با آزمایشان سرولوژیک:

اگر بعد از تزریق "تتانوس گاما" تصمیم به انجام آزمایش خون دارید، پزشک یا پرستار خود را از این امر آگاه نمایید. این دارو ممکن است با برخی از آزمایشات خون مربوط به آنتی بادی های گلوبول قرمز تداخل ایجاد نماید.

مصرف در دوران بارداری

اطلاعاتی در مورد ایمنی این فراورده جهت استفاده در دوران بارداری در دسترس نمی باشد بنابراین توصیه می گردد با احتیاط مصرف گردد اگرچه نتایج کارآزمایی های بالینی انجام گرفته بر روی ایمونوگلوبولین ها خطر خاصی را نشان نداده اند.

مصرف در دوران شیردهی

ایمونوگلوبولین ها داخل شیر مادر ترشح می گردند و می توانند آنتی بادی های محافظ را به نوزاد انتقال دهند.

هشدار و احتیاط

تزریق این فراورده به صورت داخل عروقی به دلیل امکان ایجاد شوک ممنوع می باشد.

اگر شما ناقل هیپاتیت "بی" می باشید، مصرف این فراورده برای شما مفید نخواهد بود.

مصرف ایمونوگلوبولین های هیپاتیت "بی" ندرتا می تواند سبب عوارضی مانند افت ناگهانی فشار خون همراه با اختلال در تنفس، غش، تب و عوارض پوستی گردد. این موارد حتی هنگامی که شما در تزریق قبلی خود مشکلی نداشته اید نیز می تواند بروز نماید.

اگر در حین تزریق این فراورده، پزشک معالج شما نسبت به بروز واکنش های آلرژیک یا آنافیلاکتیک مشکوک گردد باید بلافاصله تزریق را متوقف نماید. در موارد بروز شوک، پزشک شما باید درمان استاندارد شوک را پیگیری نماید. این فراورده حاوی مقادیر کمی از IgA می باشد. افرادی که دارای کمبود IgA می باشند بالقوه ممکن است آنتی بادی هایی بر علیه IgA تولید نمایند و در نتیجه ممکن است پس از دریافت فراورده های خونی حاوی این ترکیب، واکنش های آنافیلاکتیک بروز دهند.

تاثیر بر روی امکان رانندگی و یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند تاثیری از مصرف ایمونوگلوبولین های هیپاتیت "بی" بر روی رانندگی و استفاده از ماشین آلات مشاهده نگردیده است.

شرایط حمل و نگه داری دارو

دریخچالدردمای دو تا هشتدرجهسانتیگرادو در بسته بندی اصلی نگهداریوایخزدگیمحافظتنگردد

آدرس و تلفن تماس جهت پاسخگویی بیشتر

نماینده انحصاری در ایران: شرکت بهستان دارو

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پ ۱۰، ساختمان بهستان

تلفن:۰۲۱-۸۸۷۷۴۲۰۰