

**ARTELAC 1.6MG/0.5ML****ARTIFICIAL TEARS SOLUTION****OPHTHALMIC 3.2 MG/1ML****(HYPROMELLOSES)**

لطفاً پیش از مصرف این دارو، راهنمای مصرف را کاملاً و به دقت مطالعه کنید. راهنما را نزد خود نگه دارید، چون ممکن است به مطالعه مجدد آن نیاز پیدا کنید. اگر به اطلاعات بیشتری نیاز داشتید، لطفاً از پزشک یا داروساز خود سوال کنید. این دارو تنها برای شما تجویز شده است. آن را به افراد دیگر ندهید چون ممکن است برای آنان مناسب نباشد، حتی اگر دارای علائمی مشابه علائم بیماری شما باشند.

درباره دارو:

آرتلاک، محلول ۱/۶ میلی گرم هایپرملوز در ۰/۵ میلی لیتر محلول است. آرتلاک نوعی قطره چشمی در ظروف یکبار مصرف ۰/۵ میلی لیتری است. هر جعبه حاوی ۶۰ عدد ظرف یکبار مصرف است.

ماده موثره: هایپرولوز ۱/۶ میلی گرم در ظروف یکبار مصرف ۰/۵ میلی لیتری سایر ترکیبات: سوربیتول، سدیم دی هیدروژن فسفات دی هیدرات، دی سدیم فسفات دودکاهیدرات، آب قابل تزریق.

موارد مصرف:

از این قطره چشمی برای درمان علامتی سندرم خشکی چشم استفاده می شود.

موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت به هر یک از ترکیبات موجود در این دارو

هشدارها:

در صورت مصرف همزمان این دارو با یک قطره چشمی دیگر، فاصله زمانی بین مصرف این دو قطره باید ۱۵ دقیقه می باشد.

ظروف یکبار مصرف این دارو را بلافاصله پس از مصرف دور اندازید.

بعد از بازشدن درب ظرف، از نگهداری آن برای مصرف مجدد خودداری کنید.

احتیاط ها:

در صورت هر گونه تردید و یا سوالی در مورد مصرف دارو و یا طریقه مصرف آن، حتماً از پزشک یا داروساز خود راهنمایی بخواهید.

تداخلات دارویی:

اگر در حال مصرف داروی دیگری هستید و یا اخیراً از داروی دیگری استفاده کرده اید، به خصوص در صورت مصرف قطره های چشمی، و یا حتی در صورت مصرف داروهای بدون نسخه، لطفاً به پزشک و داروساز خود اطلاع دهید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

پیش از مصرف دارو با پزشک و یا داروساز خود مشورت نمایید.

مصرف در حین رانندگی و کار با ماشین آلات:

تا چند دقیقه پس از چکاندن قطره چشمی، ممکن است تاری دید ایجاد شود.

روش مصرف:

میزان مصرف معمول، ۴ تا ۶ قطره در روز است.

در صورت احساس مشکلات چشمی (خشکی، سوزش، خارش)، یک قطره در چشم بچکانید.

اگر مشکل ادامه یافت یا بدتر شد، با پزشک مشورت کنید.

این دارو برای مصرف موضعی است.

روش چکاندن قطره در چشم: در حالی که به بالا نگاه می کنید و پلک پایین را به آرامی به سمت پایین می کشید، یک قطره از این محلول را در گوشه داخلی چشم بریزید.

هر ظرف یکبار مصرف باید بلافاصله پس از مصرف دارو دور انداخته شود.

از مصرف مجدد ظرفی که قبلاً استفاده شده است خودداری کنید.

اگر احساس می کنید که اثر قطره چشمی آرتلاک ضعیف تر یا قوی تر از حد لزوم است، لطفاً موضوع را با پزشک یا داروساز خود در میان بگذارید تا درمان را مورد بازنگری قرار دهد.

توصیه های عمومی:

در صورت مصرف بیش از حد قطره چشمی آرتلاک و بروز مشکل، بلافاصله با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، از دو برابر کردن میزان مصرف بعدی خودداری کنید و روال مصرف قبلی را کماکان ادامه دهید.

عوارض جانبی:

مثل سایر فراورده های دارویی، قطره چشمی آرتلاک نیز ممکن است باعث بروز

عوارض جانبی شود:

- سوزش مختصر و گذرای چشم هنگام چکاندن قطره

در صورت مشاهده عوارض جانبی دیگری که از آن ها در این برگه راهنما ذکری به میان نیامده است به پزشک و یا داروساز خود اطلاع دهید.

روش نگهداری:

هر ظرف یکبار مصرف باید بلافاصله پس از مصرف دور انداخته شود.

بعد از باز شدن درب ظرف، از نگهداری آن برای مصرف مجدد خودداری کنید.

دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهدارید.

تاریخ انقضای این دارو بر روی جعبه دارو چاپ شده است. دارو را پس از سپری شدن تاریخ انقضای آن مصرف نکنید.