

# Sevelagen800

## Sevelamer carbonate 800 mg tablet

### توضیح کوتاه در مورد دارو و کاربرد آن

- سولامر یک پلیمر غیر قابل جذب متصل شونده به فسفات است و برای کنترل هایپرفسفاتمی (افزایش سطح فسفات در خون) در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه که تحت درمان با دیالیز قرار دارند به کار میرود. بیماران مبتلا به نارسایی کلیه به دلیل نقص در دفع کلیوی فسفات به طور شایعی دچار هایپرفسفاتمی می شوند که خود می تواند عوارض ناتوان کننده ای را در پی داشته باشد. درمان های هایپرفسفاتمی شامل محدودیت در مصرف مواد غذایی حاوی فسفر، کاهش جذب گوارشی فسفات به کمک داروها و همچنین پاکسازی خون به روش دیالیز می باشد.
- سولامر با متصل شدن به فسفات در دستگاه گوارش از جذب آن جلوگیری می کند. سولامر فاقد کلسیم و آلومینیوم بوده و لذا فاقد عوارضی از قبیل افزایش کلسیم خون و یا مسمومیت با آلومینیوم می باشد که در مصرف سایر داروهای متصل شونده به فسفات شایع اند.

### قبل از مصرف دارو چه چیزهایی باید بدانید

#### مصرف سولامردر موارد زیر ممنوع است:

- افراد مبتلا به هایپوفسفاتمی (کاهش سطح فسفات در خون)
- بیماران مبتلا به انسداد روده
- افراد با سابقه حساسیت به سولامر یا سایر اجزای موجود در این فرآورده

### قبل از مصرف سولامرموارد زیر را به اطلاع پزشک برسانید:

- اختلال در بلع
- مشکلات حرکتی دستگاه گوارش از جمله یبوست شدید
- سابقه عمل جراحی در دستگاه گوارش

### توصیه های عمومی

- لطفاً پیش از مصرف این دارو، برگه راهنما را به دقت مطالعه کنید.
- این دارو جهت درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.
- اگر نیاز به اطلاعات بیشتری دارید، لطفاً با پزشک و یا داروساز خود مشورت کنید.

### شکل و قدرت دارویی

قرص روکشدار ۸۰۰ میلی گرم سولامر کربنات

### موارد مصرف

- قرص سولاژن® ۸۰۰ (سولامر کربنات) برای کنترل هایپرفسفاتمی (افزایش سطح فسفات در خون) در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه که تحت درمان با دیالیز قرار دارند به کار می رود.

### مقدار و نحوه مصرف

- این دارو را طبق تجویز پزشک معالج مصرف کنید. مقدار تجویز شده دارو بسته به سطح فسفات درخون بیمار تنظیم میشود.
- مقدارمتداولسولامردر شروع درمان در بزرگسالان و سالمندان یک یا دو قرص ۸۰۰ میلی گرمی سه بار در روز می باشد. این دارو باید همراه با وعده غذایی مصرف شود.
- هر قرص را به طور کامل ببلعید و از خراش دادن، جویدن یا خرد کردن آن بپرهیزید.
- مقدار تجویزی دارو ممکن است بر اساس پایش دوره ای سطح فسفات در خون بیمار تغییر نماید.

### موارد منع مصرف (در صورت دارا بودن شرایط زیر، دارو را مصرف نکنید)

- افراد مبتلا به هایپوفسفاتمی (کاهش سطح فسفات در خون)
- بیماران مبتلا به انسداد روده
- افراد با سابقه حساسیت به سولامر یا سایر اجزای موجود در این فرآورده

### عوارض جانبی احتمالی

- سولامر مانند سایر داروها بهموازاتاثردرمانیمطلوب،ممکناستعوارضی را سبب شود که البته در همه افراد و به طور یکسان بروز نمی کند.

- شایع ترین عوارض این دارو عبارتند از اسهال، تهوع و استفراغ، یبوست؛ احساس نفخ، سوء هاضمه، سرفه و دیگر مشکلات تنفسی، سرگیجه، افزایش یا کاهش فشار خون، ادم محیطی، تب و درد. انسداد روده، راش های پوستی و خارش نیز در اثر مصرف این دارو گزارش شده است.

- توصیه می شود در صورت بروز عوارض جانبی اعم از آنچه نام برده شد یا عوارضی دیگر، با پزشک یا داروساز مشورت نمائید.

### تداخل دارویی

- سولامر می تواند جذب خوراکی سایر داروها را در صورت مصرف همزمان تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین توصیه می شود قرص سولاژن® ۳ ساعت قبل یا ۱ ساعت بعد از دواهای خوراکی دیگر، از جمله آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین مصرف شود.
- توصیه می شود در صورت مصرف داروهای دیگر از جمله لووتیروکسین، داروهای آنتی آریتمی، ضد تشنج و با داروهای سرکوب گر ایمنی، قبل از مصرف قرص سولاژن® با پزشک خود مشورت کنید.

تداخل با غذا و مواد خوراکی که جذب دارو را تحت تاثیر قرار می دهند

- سولامر جذب ویتامین های محلول درچربی (ویتامین A,D,E,K) را کاهش می دهد وفراهمی زیستی کلسی تریول را نیزکم می کند. بنابراین مولتی ویتامین ها باید یک ساعت قبل و یا چهارساعت بعدازمصرف سولامر تجویزشوند.

### مصرف در دوران بارداری

- طبقه بندی مصرف در دوران بارداری: C
- پیش از مصرف سولامر در دوران بارداری مشورت با پزشک یا داروساز ضروری است. اثرات این دارو بر جنین ناشناخته است.

### مصرف در دوران شیردهی

- پیش از مصرف سولامر در دوران شیردهی مشورت با پزشک یا داروساز ضروری است. اثرات این دارو بر شیرخوار ناشناخته است.

### مصرف در کودکان

- کارایی و بی خطر بودن مصرف این دارو در بیماران زیر ۱۸ سال به اثبات نرسیده است.

### هشدار و احتیاط

#### قبل از مصرف سولامرموارد زیر را به اطلاع پزشک برسانید:

- اختلال در بلع
- مشکلات حرکتی دستگاه گوارش از جمله یبوست شدید
- سابقه عمل جراحی در دستگاه گوارش

#### رانندگی و کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند

- اطلاع دقیقی از اثر این دارو بر توانایی رانندگی و کارباسایرماشینآلات در دست نمی باشد.

### شرایط حمل و نگهداری دارو

- سولامر را در دمایاتاق کمتر از۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
- دارورادرآزدید و دسترساطفالقراردهید.
- درب قوطی محتوی دارو را برای جلوگیری از نفوذ رطوبت محکم ببندید.
- تاریخانقضایاینداروبررویستهبندیدکزشدهاست. پس ازسپری شدن تاریخ انقضاءزمصرف آن خودداری نمائید.

### توصیه های لازم به بیمار

- پایش غلظت های سرمی کلسیم و کلراید در طی درمان با این دارو ضروری است.
- در صورت فراموش نمودن یکنوبتمصرفدارو،ازمصرفآنصرفنظرکردهوبرایجبراننوبتفراموششده،دوزمصرفینوبتبع درادوبرابرکنید.

### سایر اطلاعات مورد نیاز بیمار

- به علت نارسایی کلیه و درمان با دیالیز، ممکن است همراه با مصرف این دارو مکمل های کلسیم، ویتامین د یا سایر ویتامین ها نیز توسط پزشک معالج تجویز گردد.
- قرص سولاژن® به صورت ۱۸۰ عددی در یک قوطی پلاستیکی به همراه برگه راهنما دریک جعبه بسته بندی می شود.