



Tyrex 1-

NA

• نام فرآورده و مورد مصرف آن:

تایرکس® - ۱، محصول کمپانی ابوت، شیر خشکی با ترکیب آمینو اسیدی اصلاح شده و حاوی آهن، جهت تأمین نیازهای تغذیه ای نوزادان و اطفال مبتلا بهتیروزینمی نوع ۱، ۲ و ۳ می باشد. این فرآورده فاقد اسید آمینه های فنیل آلانین و تیروزین می باشد.

• قبل از مصرف این محصول چه چیزهایی را باید بدانید:

- این فرآورده به عنوان تنها منبع تغذیه ای محسوب نمی شود. در کنار این محصول لازم است مایعات و پروتئین به میزان تجویز شده توسط پزشک مصرف گردد.

جهت مصرف وریدی نمی باشد.

• توصیه های عمومی:

پودرشیرخشک استریلنیست ونبایدجهت تغذیه نوزادان نارس و یاشیرخواران مبتلابه مشکلات سیستم ایمنی استفاده گردد، مگرتوسط پزشک کودک شماتجویزونظارت شود.

- رعایت دقیق دستورالعمل ها ی مصرف، جهت سلامت کودک شما ضروری است. بهداشت مناسب در هنگام آماده سازی و استفاده از شیر خشک بسیار مهم است و عدم رعایت آن می تواند به سلامت کودک آسیب برساند. از پزشک خود سؤال نمایید که آیا نیاز هست از آب جوشانده شده خنک شده و یا سر شیشه و شیشه شیر جوشانده شده (استریل) استفاده گردد؟

- طبق دستور پزشک معالج مصرف گردد.

- به تاریخ انقضای درج شده در کف قوطی توجه نمایید.

• شکل فرآورده:

پودر در قوطی ۴۰۰ گرمی

• موارد مصرف:

جهت تأمیننیازهای تغذیه ای نوزادان و اطفال مبتلا به تیروزینمی نوع ۱، ۲ و ۳

• مقدار و نحوه مصرف:

جهت آماده سازی:۱- دست ها، تمامی سطوح و ظروف مورد استفاده را بشویید. ۲- مقدار تجویز شده از آب را در بطری تمیز بریزید. مقدار تجویز شده از پودررا اضافه نمایید (و نیز سایر مواد در صورتی که توصیه شده باشد). ۳- برای مدت ۱۵-۱۰ ثانیه خوب تکان دهید؛ در صورتی که از مخلوط کن استفاده می نمایید بیشتر از ۵ ثانیه مخلوط نکنید. مخلوط را در بطری (شیشه شیر) و یا ظرف تمیز بریزید. به محض اینکه مصرف یک وعده را شروع کردید، آن وعده را ظرف مدت یک ساعت مصرف نمایید و باقیمانده را دور بریزید.

توجه:بسته به نیازهای تغذیه ای هر کودک، دستور العمل های آماده سازی مختلفی می تواند توسط پزشک تجویز شود. ممکن است نیاز باشد موارد دیگری را به مخلوط تایرکس®-۱ اضافه و یا به صورت جداگانه آماده نمایید. این موارد در صورت نیاز، توسط پزشک تعیین خواهد شد.

• هشدار

برای آمادهدسازیبیالگرمکردنشیرخشکهزگزاردستگاهمایکروویواستفاده نکنید. متواندمنجر بهسوختگی-هاجدشود.

• شرایط نگهداری:

به محض آماده سازی، ظرف حاوی محلول آماده شده را در داخل یخچال قرار دهید و ظرف مدت ۲۴ ساعت کودک را با آن تغذیه نمایید. قوطی باز نشده و یا باز شده را در دمای اتاق نگهداری نمایید؛ از نگهداری در دماهای بالا اجتناب نمایید. محتویات قوطی باز شده را طی مدت ۱ ماه مصرف نمایید.