

**Daivobet 50mcg/g 0.5 + mg/g Gel****CALCIPOTRIOL/BETAMETHASONE**  
**50mcg/g 0.5 + mg/g GEL****• نام فرآورده و مورد مصرف آن:**

ژل موضعی دایوبت، محصول کمپانی لئو فارما، به عنوان درمان موضعی پسوریازیس پوست سر و سایر نقاط پوست بدن و جهت درمان پسوریازیس پلاکی خفیف تا متوسط (پسوریازیس ولگاریس) در بزرگسالانمورد استفاده قرار می گیرد. در بیماری پسوریازیس، سرعت تکثیر سلول های پوست بیش از حد بالاست. در نتیجه پوست دچار قرمزی شده، پوسته پوسته و ضخیم می شود. دایوبت حاوی کلسی پوتریول و بتامتازون است. کلسی پوتریول به بازگشت سرعت تکثیر و رشد سلول های پوستی به حالت طبیعی کمک میکند و بتامتازون نیز سبب کاهش التهاب می گردد.

**• قبل از مصرف این دارو چه چیزهایی را باید بدانید:****ژل دایوبت را مصرف نکنید اگر:**

- به کلسی پوتریول، بتامتازون و یا هر یک از اجزاء تشکیل دهنده حساسیت دارید.  
- اگر دچار مشکلی در سطح کلسیم بدن هستید ( در این صورت با پزشک معالج خود مشورت کنید).

- اگر به نوع خاصی از پسوریازیس مانند اکسفولیاتیو، اریترودرمیک و پوستولار مبتلا هستید (در این صورت با پزشک معالج خود مشورت کنید).

- فقط برای استعمال خارجی می باشد.

پیش از مصرف این دارو، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید اگر

- از سایر داروهای کورتیکواستروئید استفاده می کنید، زیرا ممکن است سبب ایجاد عوارض جانبی گردد.

- این دارو را به مدت طولانی مصرف کرده اید و در نظر دارید تا مصرف آن را قطع نمایید، زیرا قطع ناگهانی مصرف استروئید می تواند خطر تشدید پسوریازیس یا ظهور ناگهانی علائم بیماری را به همراه داشته باشد.

- به دیابت مبتلا هستید زیرا استروئید موجود در دارو ممکن است برروی سطح گلوکز خون تأثیر بگذارد.

- حین مصرف دارو پوستتان دچار عفونت گردید، زیرا ممکن است نیاز باشد درمان قطع گردد.

- مبتلا به نوع خاصی از پسوریازیس به نام پسوریازیس قطره ای (Guttate Psoriasis) هستید.

- مبتلا به بیماری های شدید کبدی یا کلیوی هستید.

**• توصیه های عمومی:**

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- کاملاً مطابق با تجویز پزشک، روش مصرف و دستورالعمل ارائه شده توسط داروسازی که دارو را در اختیار شما قرار داده است، عمل نمایید. پزشک و داروساز در خصوص دارو تخصص و آگاهی کامل داشته و از مزایا و خطرات آن مطلع می باشند.

- فرآورده های دارویی از سایر فرآورده ها متفاوت هستند. دارو برروی سلامت شما تأثیر می گذارد و مصرف آن بر خلاف دستورالعمل های ارائه شده، ممکن است برای شما مخاطره آمیز باشد.

- دوره درمانی تجویز شده را خودسرانه قطع نکنید.

- بدون نظر و تشخیص پزشک معالج، مقدار مصرف دارو و یا دوره مصرف آن را کاهش و یا افزایش ندهید.

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. از تجویز آن به دیگران خودداری نمایید. حتی اگر علائم بیماری آن ها مشابه علائم شما باشد، ممکن است این دارو به آن ها آسیب برساند.

- داروها نباید از طریق سیستم فاضلاب و یا زباله های خانگی دور ریخته شوند. در صورتی که دیگر نیازی به مصرف دارو نداشتید، جهت چگونگی دور ریختن دارو با داروساز خود مشورت نمایید. این اقدامات به حفظ محیط زیست کمک خواهد کرد.

- دارو را پس از اتمام تاریخ انقضای درج شده برروی بسته بندی مصرف نکنید.

- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

**• شکل و قدرت دارویی:****ژل موضعی**

هر یک گرم ژل حاوی ۵۰ میکروگرم کلسی پوتریول + ۵/۰ میلی گرم بتامتازون

**• موارد مصرف**

درمان موضعی پسوریازیس پوست سر و سایر نقاط پوست بدن و درمان پسوریازیس پلاکی خفیف تا متوسط (پسوریازیس ولگاریس) در بزرگسالان

**• مقدار و نحوه مصرف:**

دایوبت را به صورت موضعی بر روی پوست و دقیقاً مطابق دستور پزشک معالج مصرف نمایید. چنانچه نیاز به اطلاعات بیشتر در ارتباط با نحوه مصرف دارو دارید، با پزشک معالج و یا داروساز خود مشورت کنید.

**نحوه مصرف صحیح**

- دارو را تنها برروی ناحیه مبتلا به پسوریازیس مورد استفاده قرار دهید و از به کارگیری آن در سایر نواحی پوست خودداری کنید.

- پیش از مصرف بطری را تکان داده و درپوش آن را بردارید.

- مقداری از ژل را با استفاده از نوک انگشتان کاملاً تمیز، برروی ناحیه مبتلا بمالید و به آرامی ماساژ دهید تا زمانی که تمامی آن ناحیه با لایه نازکی از ژل پوشیده شود.

- پس از مصرف دایوبت دست های خود را به خوبی بشویید. این کار از تماس تصادفی ژل با سایر نواحی بدن به خصوص صورت، دهان و چشم ها جلوگیری می کند.

- در صورتی که بخشی از ژل تصادفاً به پوست اطراف ناحیه مبتلا به پسوریازیس مالیده شد، نگران نشوید و آن را از این نواحی پاک نمایید.

- توصیه می شود به منظور بهبود اثربخشی دارو، بلافاصله پس از مصرف دایوبت دوش نگیرید.

- پس از مصرف دایوبت از تماس با پارچه هایی که به راحتی لکه دار می شوند (مانند پارچه ابریشمی) اجتناب نمایید.

**در صورت ابتلا به پسوریازیس پوست سر**

- پیش از مصرف ژل دایوبت برروی پوست سر، موهای خود را شانه کنید تا هرگونه پوسته شل را از روی پوست سر بردارید. سر را خم کنید تا مطمئن شوید هنگام استفاده ژل روی پوست صورتتان نریزد. می توانید پیش از شروع مصرف، موهایتان را تقسیم بندی کنید. ژل دایوبت را توسط نوک انگشتان برروی ناحیه مبتلا بمالید.

- به طور معمول جهت درمان پسوریازیس پوست سر، میزان ۱ تا ۴ گرم ژل در روز کافی است (۴ گرم ژل معادل یک قاشق چایخوری می باشد).

- پیش از مصرف ژل دایوبت نیازی به شستشوی موها نمی باشد.

- توصیه می شود به منظور اثربخشی بیشتر از شستشوی موها بلافاصله پس از مصرف ژل دایوبت خودداری نمایید. اجازه دهید تا دارو در طول شب و یا روز برروی پوست سر شما باقی بماند.

**دوره مصرف**

- روزی یک بار ژل را مصرف نمایید (ترجیحاً عصرها)

- طول دوره درمان اولیه برای پسوریازیس سر ۴ هفته و برای پوست سایر نواحی غیر از سر ۸ هفته می باشد.

- ممکن است پزشک معالج دوره درمان متفاوتی را برای شما تجویز نماید.

- ممکن است پزشک معالج تصمیم به تکرار دوره درمان بگیرد.

- روزانه بیش از ۱۵ گرم زل مصرف نکنید.

- چنانچه از سایر فرآورده های حاوی کلسی پوتریول نیز استفاده می کنید، مجموع میزان کلسی پوتریول در طول روز نباید بیش از ۱۵ گرم باشد. همچنین کل ناحیه تحت درمان نباید بیش از ۳۰٪ سطح کل بدن باشد.

**در صورت مصرف بیش از حد مجاز ژل دایوبت**

در صورت مصرف بیش از ۱۵ گرم ژل در روز با پزشک معالج خود تماس بگیرید. مصرف طولانی مدت بیش از مقدار مجاز از ژل دایوبت می تواند سبب بروز مشکلاتی در سطح کلسیم خون گردد که به طور معمول با قطع مصرف دارو به وضعیت طبیعی خود باز می گردد. ممکن است پزشک معالج جهت حصول اطمینان از عدم بروز مشکل در سطح کلسیم خون ناشی از مصرف بیش از حد ژل، انجام پاره ای آزمایشات را تجویز نماید. مصرف بیش از حد و طولانی مدت این دارو ممکن است سبب اختلال در عملکرد صحیح غده آدرنال گردد.

در صورت فراموش کردن مصرف دایوبت

جهت جبران میزان فراموش شده، دوز مصرف را دو برابر نکنید.

در صورت قطع مصرف دایوبت

دوره درمانی تجویز شده را خودسرانه قطع نکنید. قطع مصرف دایوبت باید طبق دستور پزشک معالج صورت گیرد. ممکن است نیاز باشد تا مصرف این دارو به صورت تدریجی قطع شود، به خصوص اگر دایوبت را به مدت طولانی مصرف