



Phenex 1-

NA

• نام فرآورده و مورد مصرف آن:

فنکس® ۱-، محصول کمپانی ابوت، شیر خشکی با ترکیب آمینو اسیدی اصلاح شده و حاوی آهن، جهت تأمین نیازهای تغذیه ای نوزادان و اطفال مبتلا به بیماری فنیل کتونوری (PKU) می باشد. این فرآورده فاقد اسید آمینه فنیل آلانین می باشد.

• قبل از مصرف این محصول چه چیزهایی را باید بدانید:

- این فرآورده به عنوان تنها منبع تغذیه ای محسوب نمی شود. در کنار این محصول لازم است مایعات و پروتئین به میزان تجویز شده توسط پزشک مصرف گردد.

- جهت مصرف وریدی نمی باشد.

• توصیه های عمومی:

- پودر شیرخشک استرلینست و نباید جهت تغذیه نوزادان نارس و یاشیرخواران مبتلا به مشکلات سیستم ایمنی استفاده گردد، مگرتوسط پزشک کودک شمتاجویز و نظارت شود.

- رعایت دقیق دستورالعمل ها ی مصرف، جهت سلامت کودک شما ضروری است. بهداشت مناسب در هنگام آماده سازی و استفاده از شیر خشک بسیار مهم است و عدم رعایت آن می تواند به سلامت کودک آسیب برساند. از پزشک خود سؤال نمایید که آیا نیاز هست از آب جوشانده شده خنک شده و یا سر شیشه و شیشه شیر جوشانده شده (استریل) استفاده گردد؟

- طبق دستور پزشک معالج مصرف گردد.

- به تاریخ انقضای درج شده در کف قوطی توجه نمایید.

• شکل فرآورده:

پودر در قوطی ۴۰۰ گرمی

• موارد مصرف:

جهت تأمین نیازهای تغذیه ای نوزادان و اطفال مبتلا به بیماری فنیل کتونوری (PKU)

• مقدار و نحوه مصرف:

جهت آماده سازی: ۱- دست ها، تمامی سطوح و ظروف مورد استفاده را بشویید. ۲- مقدار تجویز شده از آب را در بطری تمیز بریزید. مقدار تجویز شده از پودر را اضافه نمایید (و نیز سایر مواد در صورتی که توصیه شده باشد). ۳- برای مدت ۱۵-۱۰ ثانیه خوب تکان دهید؛ در صورتی که از مخلوط کن استفاده می نمایید بیشتر از ۵ ثانیه مخلوط نکنید. مخلوط را در بطری (شیشه شیر) و یا ظرف تمیز بریزید. به محض اینکه مصرف یک وعده را شروع کردید، آن وعده را ظرف مدت یک ساعت مصرف نمایید و باقیمانده را دور بریزید.

توجه: بسته به نیازهای تغذیه ای هر کودک، دستور العمل های آماده سازی مختلفی می تواند توسط پزشک تجویز شود. ممکن است نیاز باشد موارد دیگری را به مخلوط فنکس® ۱- اضافه و یا به صورت جداگانه آماده نمایید. این موارد در صورت نیاز، توسط پزشک تعیین خواهد شد.

• هشدار

برای آماد هسازیا گرم کردن شیر خشک هرگز از دستگاه های میکروویو استفاده نکنید. متواند منجر به سوختگی-ها جد شود.

• شرایط نگهداری:

به محض آماده سازی، ظرف حاوی محلول آماده شده را در داخل یخچال قرار دهید و ظرف مدت ۲۴ ساعت کودک را با آن تغذیه نمایید. قوطی باز نشده و یا باز شده را در دمای اتاق نگهداری نمایید؛ از نگهداری در دماهای بالا اجتناب نمایید. محتویات قوطی باز شده را طی مدت ۱ ماه مصرف نمایید.