



Daivonex 50mcg/g ointment

CALCIPOTRIOL 50ug/1G
OINTMENT

• نام فرآورده و مورد مصرف آن:

پماد دایونکس، محصول کمپانی لئوفارما، فرآورده ای جهت درمان بیماری پسوریازیس و لگاریس می باشد. این پماد از مشتقات ویتامین D - کلسی پوتریول - بوده که سبب القاء تمایز و سرکوب تکثیر سلول های پوستی (کراتینوسیت ها) می شود و تکثیر و تمایز غیر طبیعی سلولی را در پوست مبتلا به پسوریازیس به حالت طبیعی بر می گرداند.

• قبل از مصرف این دارو چه چیزهایی را باید بدانید:

- پماد دایونکس نباید در ناحیه صورت مصرف شود زیرا فرمولاسیون پماد ممکن است سبب تحریک پوست صورت گردد.
- شستشوی دقیق دست ها بعد از مصرف دارو توصیه می شود.
- فقط برای استعمال خارجی می باشد.

• توصیه های عمومی:

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- کاملاً مطابق با تجویز پزشک، روش مصرف و دستورالعمل ارائه شده توسط داروسازی که دارو را در اختیار شما قرار داده است عمل نمایید. پزشک و داروساز در خصوص دارو تخصص و آگاهی کامل داشته و از مزایا و خطرات آن مطلع می باشند.
- فرآورده های دارویی از سایر فرآورده ها متفاوت هستند. دارو بر روی سلامت شما تأثیر می گذارد و مصرف آن بر خلاف دستورالعمل های ارائه شده، ممکن است برای شما مخاطره آمیز باشد.
- دوره درمانی تجویز شده را خودسرانه قطع نکنید.
- بدون نظر و تشخیص پزشک معالج، مقدار مصرف دارو و یا دوره مصرف آن را کاهش یا افزایش ندهید.
- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. از تجویز آن به دیگران خودداری نمایید. حتی اگر علائم بیماری آن ها مشابه علائم شما باشد، ممکن است این دارو به آن ها آسیب برساند.
- دارو را پس از اتمام تاریخ انقضای درج شده بر روی بسته بندی مصرف نکنید.

• شکل و قدرت دارویی

پماد موضعی

هر یک گرم پماد حاوی ۵۰ میکروگرم کلسی پوتریول.

• موارد مصرف

درمان پسوریازیس و لگاریس

• مقدار و نحوه مصرف:

روزی دو بار به صورت لایه ای نازک در ناحیه مبتلا به پسوریازیس و لگاریس مالیده شود. در برخی بیماران درمان نگهدارنده ممکن است با تعداد دفعات مصرف کمتر تجویز شود. میزان مصرف در هفته نباید از ۱۰۰ گرم تجاوز نماید. در صورتی که پزشک معالج دوز متفاوتی را تجویز نمود، طبق دستورالعمل پزشک عمل نمایید. مصرف بیش از اندازه (بیش از ۱۰۰ گرم پماد دایونکس در هفته) ممکن است سبب افزایش سطح سرمی کلسیم شود که با قطع مصرف پماد به سرعت به حالت طبیعی باز می گردد.

• موارد منع مصرف:

اگر پماد دایونکس را مصرف نکنید :

- به هر یک از اجزاء تشکیل دهنده دارو حساسیت دارید.
- دچار اختلال در متابولیسم کلسیم هستید.

• عوارض جانبی احتمالی:

عوارض جانبی جزئی مانند تحریک موضعی گذرا و در موارد بسیار نادر، درماتیت صورت ممکن است رخ دهد.

• مصرف در دوران بارداری:

اگرچه مطالعات انجام شده در حیوانات هیچگونه اثر تراتوژنیکی را نشان نداده است، اما ایمنی دایونکس در بارداری انسانی ثابت نشده است.

• مصرف در کودکان:

ایمنی و اثربخشی این دارو درمان کودکان تاکنون بررسی نشده است.

• هشدار و احتیاط

- پماد دایونکس نباید در ناحیه صورت مصرف شود زیرا فرمولاسیون پماد ممکن است سبب تحریک پوست صورت گردد.
- شستشوی دقیق دست ها بعد از مصرف دارو توصیه می شود.
- فقط برای استعمال خارجی می باشد.

• شرایط نگهداری دارو:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.