

Daivobet 50mcg/g 0.5 + mg/g ointment

CALCIPOTRIOL/BETAMETHASONE
50mcg/g 0.5 + mg/g OINTMENT

• نام فرآورده و مورد مصرف آن:

پماد دایوبت®، محصول کمپانی لئو فارما، جهت درمان بیماری پسوریازیس به کار می رود. در پوست مبتلا بهپسوریازیس، سرعت تکثیرسلول ها آنقدر بالا است که سلول های پوست به درستی تمایز پیدا نمی کنند. همین امر سبب ایجاد قرمزی، پوسته پوسته شدن و ضخیم شدن پوست می گردد. پماد دایوبت® سرعت رشد و تمایزسلول های پوست را به حالت طبیعی باز می گرداند.

• قبل از مصرف این دارو چه چیزهایی را باید بدانید:

- پماد دایوبت®را در ناحیه صورت مصرف نکنید.
- در صورت مصرف دارو جهت درمان پسوریازیس دست، از تماس دست آغشته به پماد با صورت خودداری نمایید.
- از مصرف پماد دایوبت®در نواحی وسیعی از پوست و در زیر پانسمان پوشاننده به مدت طولانی خودداری نمایید، مگر با تشخیص پزشک معالج.
- باتوجه به اینکه استروئید موجود در پماد دایوبت®میتواند برروی سطح گلوکز خون اثر بگذارد، بنابراین در صورت ابتلا به بیماری دیابت پزشک معالج را مطلع سازید.
- فقط برای استعمال خارجی می باشد.
- از آفتاب گرفتن، استفاده بیش از حد از دستگاه های سولاریم و قرارگیری در معرض سایر پرتوها خودداری نمایید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- کاملاً مطابق با تجویز پزشک، روش مصرف و دستورالعمل ارائه شده توسط داروسازی که دارو را در اختیار شما قرار داده است عمل نمایید. پزشک و داروساز در خصوص دارو تخصص و آگاهی کامل داشته و از مزایا و خطرات آن مطلع می باشند.
- فرآورده های دارویی از سایر فرآورده ها متفاوت هستند. دارو برروی سلامت شما تأثیر می گذارد و مصرف آن بر خلاف دستورالعملهای ارائه شده ممکن است برای شما مخاطره آمیز باشد.
- دوره درمانی تجویز شده را خودسرانه قطع نکنید.
- بدون نظر و تشخیص پزشک معالج، مقدار مصرف دارو و یا دوره مصرف آن را کاهش و یا افزایش ندهید و یا دوره درمان را خودسرانه تکرار نکنید.
- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. از تجویز آن به دیگران خودداری نمایید. حتی اگر علائم بیماری آن ها مشابه علائم شما باشد، ممکن است این دارو به آن ها آسیب برساند.
- دارو را پس از اتمام تاریخ انقضای درج شده برروی بسته بندی مصرف نکنید.
- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

• شکل و قدرت دارویی

پماد موضعی

هر یک گرم پماد حاوی ۵۰ میکروگرم کلسی پوتریول (به صورت مونوهیدرات) + ۵/۰ میلی گرم بتامتازون (به صورت دیپروپیونات)

• موارد مصرف

درمان موضعی پسوریازیس

• مقدار و نحوه مصرف:

پماد را بر روی قسمت هایی از پوست که مبتلا به پسوریازیس می باشد بمالید. پس از استفاده دست ها را بشویید. پماد دایوبت باید روزی یکبار برروی موضع مبتلا استفاده شود. طول دوره درمان پیشنهادی ۴ هفته می باشد. پس از اتمام این دوره، درمان با دایوبت می تواند بنا بر تشخیص پزشک معالج تکرار گردد. حداکثر دوز مصرفی: ۱۵ گرم در روز و یا ۱۰۰ گرم در هفته از مصرف دارو در بیش از ۳۰ درصد سطح پوست بدن خودداری نمایید. در صورتی که پزشک معالج دوز متفاوتی را تجویز نمود، طبق دستورالعمل پزشک عمل نمایید.

احتیاط های لازم در صورت مصرف بیش از میزان تجویز شده:

مصرف بیش از حد پماد دایوبت®(بیش از ۱۰۰ گرم در هفته) می تواند سبب افزایش سطح کلسیم خون و / یا سرکوب عملکرد آدرنال - هیپوفیز شود که در نتیجه منجر به نارسایی ثانویه غده آدرنال می شود. البته به محض قطع مصرف پماد دایوبت®میزان کلسیم خون و عملکرد آدرنال به حالت طبیعی باز می گردند. در صورتی که به مصرف بیش از حد تجویز شده مشکوک شدید، فوراً پزشک خود را مطلع سازید. جعبه دارو را به پزشک نشان دهید.

• موارد منع مصرف:

پماد دایوبت® نباید مصرف شود:

- اگر به هر یک از اجزاء تشکیل دهنده دارو حساسیت دارید.
- اگر مبتلا به عفونت های پوستی هستید (مگر اینکه عفونت به طور همزمان در حال درمان باشد).
- در بیماران مبتلا به اختلالات متابولیسمی کلسیم به دلیل وجود کلسی پوتریول در محصول.
- در افراد مبتلا به بیماری های شدید کبدی و کلیوی.

• عوارض جانبی احتمالی:

مصرف پماد دایوبتدر برخی از بیماران ممکن است منجر به ایجاد خارش گذرا و ملایم گردد. در صورت ادامه خارش، به پزشک معالج خود مراجعه کنید. عوارض جانبی شایع عبارتند از خارش، راش و احساس سوزش در پوست. از عوارض جانبی غیرشایع پماد دایوبتمی توان به درد یا تحریک پوست، درماتیت، قرمزی پوست، تشدید پسوریازیس، فولیکولیت وتغییر پیگمان های رنگی پوست در محل استفاده از پماد اشاره کرد. همچنین پسوریازیس پوستولار از عوارض نادر مصرف این دارو می باشد. واکنش های موضعی دیگر از قبیل حساسیت موضعی گذرا، درماتیت، قرمز شدن پوست و تشدید پسوریازیس که در نتیجه مصرف کلسی پوتریول گزارش شده اند، ممکن است مشاهده شود. اگر چه مصرف موضعی استروئید ها به خصوص در طولانی مدت می تواند سبب آتروفی پوست، تلانژکتازی و استریا گردد، اما این موارد تاکنون در بررسی های بالینی پماد دایوبت مشاهده نشده اند. مانند سایر گلوکوکورتیکوئیدها، فولیکولیت، هایپرتریکوزیس، درماتیت اطراف دهانی، درماتیت تماسی آلرژیک و دپیگمانتاسیون پوست ممکن است رخ دهد که البته بسیار نادر است. در موارد بسیار نادر ممکن است عوارض سیستمیک با مصرفپماد دایوبت®رخ دهد. از جمله این عوارض می توان به هایپرکلسمی ناشی از مصرف کلسی پوتریول و یا مهار ترشح کورتیکواستروئید از قشر غده آدرنال اشاره کرد. در صورت بروز هرگونه عارضه جانبی و یا مشاهده عوارضیکه در این برگه راهنما ذکر نشده اند، پزشک معالج خود را مطلع سازید.

• مصرف در دوران بارداری:

مصرف پماد دایوبت® در بارداری تنها در صورت صلاحدید پزشک معالج مجاز است.

• مصرف در دوران شیردهی:

مصرف پماد دایوبت®در دوران شیردهی تنها در صورت صلاحدید پزشک معالج مجاز است.

• مصرف در کودکان:

مصرف در افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود.

• شرایط نگهداری دارو:

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گرادو دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- این دارو را می توان تا ۱۲ ماه پس از باز کردن اولیه درب تیوب مصرف نمود.
- از مصرف دارو پس از تاریخ انقضاء درج شده بر روی بسته بندی خودداری نمایید.

• سایر اطلاعات مورد نیاز بیمار:

- علاوه بر کلسیپوتریول و بتامتازون که مواد موثره تشکیل دهنده این دارو می باشند، سایر مواد تشکیل دهنده شامل پارافین مایع، پلی اکسی پروپیلن-۱۱- استتاریل اتر، بوتیل هیدروکسی تولوئن، آلفا توکوفرول تمام راسمیک و پارافین سفید نرم می باشد.