



Similac Neosure with LCPS NA

• نام فرآورده و مورد مصرف آن:

سیمیلاک نئوشور همراه با ال سی پی، محصولی از کمپانی ابوت می باشد. در صورتی که تغذیه با شیر مادر انجام نگیرد، سیمیلاک نئوشور به طور اختصاصی جهت تأمین نیازهای تغذیه ای نوزادان نارس و یا نوزادانی که با وزن کم متولد می شوند طراحی شده است و به محض ترخیص از بیمارستان و با تجویز پزشک قابل استفاده است. این فرآورده از بدو تولد تا ۱۲ ماهگی قابل مصرف می باشد.

• قبل از مصرف این فرآورده چه چیزهایی را باید بدانید:

پیش از تصمیم به تغذیه کودک با شیر خشک، با پزشک اطفال مشورت کنید.

• توصیه های عمومی:

- طبق دستور پزشک مصرف شود.
- اگر چه سیمیلاک نئوشور جهت مصرف در نوزادان نارس می باشد، اما از آنجا که پودر شیرخشک استرلینیزست، تجویز و نظارت پزشک جهت استفاده این فرآورده در نوزادان نارس و یا شیرخواران مبتلا به مشکلات سیستم ایمنی ضروری است.
- رعایت دقیق دستورالعمل های مصرف جهت سلامت کودک شما ضروری است. بهداشت مناسب هنگام آماده سازی و استفاده از شیر خشک بسیار مهم است و عدم رعایت آن می تواند به سلامت کودک آسیب برساند.
- فقط از پیمانه موجود در قوطی برای اندازه گیری شیر خشک استفاده شود.
- از آبی استفاده کنید که قبلاً به مدت ۵ دقیقه جوشانده و سپس سرد شده است.
- به تاریخ انقضای درج شده در کف قوطی توجه نمایید.

• شکل فرآورده:

۳۷۰ گرم پودر

• موارد مصرف:

جهت تأمین نیازهای تغذیه ای نوزادان نارس و یا نوزادانی که با وزن کم متولد می شوند از بدو تولد تا ۱۲ ماهگی

• مقدار و نحوه مصرف:

۱- شیشه شیر، سر شیشه، درپوش و همه لوازمی که برای آماده سازی استفاده می شوند را کاملاً بشویید ۲- پس از شستن لوازم، آن ها را به مدت ۵ دقیقه بجوشانید ۳- سطحی تمیز فراهم نمایید تا شیرخشک را روی آن آماده کنید ۴- در ظرفی دیگر، آب را به مدت ۵ دقیقه کاملاً بجوشانید و اجازه دهید تا خنک شود ۵- مقداری دقیق از آب ولرم و قبلاً جوشیده شده را در شیشه شیر استریل شده بریزید ۶- پیمانه موجود در داخل قوطی را پر نمایید، سپس سطح محتوای پیمانه را با لبه چاقو صاف کنید ۷- یک پیمانه سرصاف از پودر شیر خشک را به ازای هر ۶۰ میلی لیتر آب ولرم، داخل شیشه شیر اضافه کنید ۸- به هم بزنید تا کاملاً حل شود. دما را امتحان کنید و کودک را تغذیه نمایید. ۹- به محض شروع تغذیه کودک، آن وعده غذایی را ظرف مدت ۱ ساعت مصرف نمایید و باقیمانده را دور بریزید.

جدول تغذیه ای پیشنهادی

برای آماده سازی یک وعده غذایی			
وزن کودک (کیلوگرم)	آب (میلی لیتر)	تعداد پیمانه (سرفاف)	تعداد وعده غذایی در یک روز
کمتر از ۳/۶ کیلوگرم	60	1	تا ۱۰-۸
۳/۶ تا ۴/۳ کیلوگرم	120	2	۷-۶
بین ۴/۳ تا ۵ کیلوگرم	120	2	۷-۶
بین ۵ تا ۸ کیلوگرم	180	3	۶-۵
بیشتر از ۸ کیلوگرم	180	3	۵-۴

دریافت کنند.

• موارد منع مصرف:

برای کودکان مبتلا به گالاکتوزمیا مناسب نیست.

• هشدار:

- براباً آماد ه سازیا گرمکردن شیر خشک هرگز از دستگاه های میکروویو استفاده نکنید. متواند منجر به سوختگی ها بجد شود.
- آب جوشانده نشده، شیشه شیر جوشانده نشده و یا رقیق سازی نادرست می تواند کودک شما را بیمار کند.

• شرایط نگهداری:

- قوطی باز نشده را در دمای معمولی اتاق (حداکثر ۲۵ درجه سانتی گراد) نگه دارید. به محض باز شدن درب قوطی، محتویات آن باید ظرف مدت سه هفته مصرف شود. قوطی باز شده را به صورت سرپوشیده و در مکانی خشک و خنک (خارج از یخچال) نگهداری کنید.
- چنانچه بیش از یک وعده غذایی را آماده کرده اید باید آن را در یخچال در دمای ۲ الی ۴ درجه سانتی گراد نگهداری کرده و ظرف مدت ۲۴ ساعت مصرف نمایید. به محض شروع تغذیه کودک با یک وعده غذایی، آن وعده را ظرف مدت یک ساعت مصرف نموده و باقیمانده را دور بریزید.