



I -Valex 1-

NA

• نام فرآورده و مورد مصرف آن:

آی-ولکس®-۱، محصول کمپانی ابوت، شیر خشکی با ترکیب آمینو اسیدی اصلاح شده و حاوی آهن است که جهت تأمین نیازهای تغذیه ای نوزادان و اطفالیکه دچار اختلال در کاتابولیسم اسید آمینه لوسین می باشند، به کار می رود. این فرآورده فاقد اسید آمینه لوسین می باشد.

قبل از مصرف این محصول چه چیزهایی را باید بدانید:

- این فرآورده به عنوان تنها منبع تغذیه ای محسوب نمی شود. در کنار این محصول لازم است مایعات و پروتئین به میزان تجویز شده توسط پزشک مصرف گردد.

- جهت مصرف وریدی نمی باشد.

• توصیه های عمومی:

- پودر شیرخشک استرلینستو نباید جهت تغذیه نوزادان نارس و یا شیرخواران مبتلا به مشکلات سیستم ایمنی استفاده گردد، مگر توسط پزشک کودک شماتجویز و نظارت شود.

- رعایت دقیق دستورالعمل ها ی مصرف، جهت سلامت کودک شما ضروری است. بهداشت مناسب در هنگام آماده سازی و استفاده از شیر خشک بسیار مهم است و عدم رعایت آن می تواند به سلامت کودک آسیب برساند. از پزشک خود سؤال نمایید که آیا نیاز هست از آب جوشانده شده خنک شده و یا سر شیشه و شیشه شیر جوشانده شده (استریل) استفاده گردد؟

- طبق دستور پزشک معالج مصرف گردد.

- به تاریخ انقضای درج شده در کف قوطی توجه نمایید.

• شکل فرآورده:

پودر در قوطی ۴۰۰ گرمی

• موارد مصرف:

جهت تأمین نیازهای تغذیه ای نوزادان و اطفالی که دچار اختلال در کاتابولیسم اسید آمینه لوسین میباشند.

• مقدار و نحوه مصرف:

جهت آماده سازی: ۱- دست ها، تمامی سطوح و ظروف مورد استفاده را بشویید. ۲- مقدار تجویز شده از آب را در بطری تمیز بریزید. مقدار تجویز شده از پودر را اضافه نمایید (و نیز سایر مواد در صورتی که توصیه شده باشد). ۳- برای مدت ۱۵-۱۰ ثانیه خوب تکان دهید؛ در صورتی که از مخلوط کن استفاده می نمایید بیشتر از ۵ ثانیه مخلوط نکنید. مخلوط را در بطری (شیشه شیر) و یا ظرف تمیز بریزید. به محض اینکه مصرف یک وعده را شروع کردید، آن وعده را ظرف مدت یک ساعت مصرف نمایید و باقیمانده را دور بریزید.

توجه: بسته به نیازهای تغذیه ای هر کودک، دستور العمل های آماده سازی مختلفی می تواند توسط پزشک تجویز شود. ممکن است نیاز باشد موارد دیگری را به مخلوط آی-ولکس® - ۱ اضافه و یا به صورت جداگانه آماده نمایید. این موارد در صورت نیاز، توسط پزشک تعیین خواهد شد.

• هشدار

برای آماد هسازی گرم کردن شیر خشک هرگز از دستگاه های میکروویو استفاده نکنید. متواند منجر به سوختگی-ها بجد شود.

• شرایط نگهداری:

به محض آماده سازی، ظرف حاوی محلول آماده شده را در داخل یخچال قرار دهید و ظرف مدت ۲۴ ساعت کودک را با آن تغذیه نمایید. قوطی باز نشده و یا باز شده را در دمای اتاق نگهداری نمایید؛ از نگهداری در دماهای بالا اجتناب نمایید. محتویات قوطی باز شده را طی مدت ۱ ماه مصرف نمایید.