



600mg Teveten

اپروزارتان

شکل محصول: قرص روکشدار (film coat)

تعداد: در یک بسته ۲۸ عدد قرص در دو بلیستر

نحوه نگهداری: در دمای اتاق دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

توضیح کوتاه در مورد محصول:

قرص روکشدار (کیلت) که هر قرص در دوز ۶۰۰ میلی گرم می باشد که به صورت خوراکی همراه با مصرف آب استعمال می شود. بر روی یک طرف این قرص کد ۵۰۴۶ درج شده است.

علائم و استفاده

TEVETEN® برای درمان فشار خون بالا است. ایندارو ممکن است به تنهایی یا در ترکیب با سایر داروهای ضد فشار خون مانند دیورتیک ها و مسدود کننده های کانال کلسیم استفاده شود.

دوز مصرفی و توصیه های مهم:

همیشه دوز مصرفی باید با نظر پزشکی که شما تحت درمان آن هستید تعیین شده باشد. و اگر هر سوالی دارید بایستی با پزشک خود در میان بگذارید.

اگر دارو را در نوبت خود نخوردید به هیچ عنوان در یک زمان دو عدد با هم را میل نکنید. برای مشورت بیشتر در این مورد حتما با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

بهترین زمان مصرف در هنگام صبح می باشد اما در این مورد نظر پزشک خود را جویا شوید. مدت اثر این محصول بین ۲ تا ۳ هفته می باشد.

مدت زمان مصرف نامحدود و همچنین می توانید همراه یا بدون مصرف غذا میل کنید.

با دارو های نوع تiazid و یا بلاک کننده های کانال کلسیم هم بصورت ترکیبی قابل استفاده می باشد .

در افراد سالخورده نیاز به تطبیق دوز وجود ندارد.

در کودکان و نوجوانان اطلاعات کمی در دسترس وجود دارد در نتیجه در این دسته از مصرف آن خودداری کنند.

برای افرادی که مشکلات کبدی خفیف تا متوسط دارد نیاز به تطبیق دوز نیست اما در افرادی که مشکلات جدی کبدی دارند نباید استفاده شود.

برای افرادی که مشکلات متوسط تا جدی کلیوی دارند (کراتین کلیرانس کمتر از ۶۰ میلی لیتر در دقیقه) نباید بیشتر از دوز ۶۰۰ میلی گرم مصرف شود.

تعارضات دارویی

TEVETEN® در بیمارانی که حساسیت به این محصول یا هر یک از اجزای آن دارند استفاده نشود.

آلیسیرین را با TEVETEN در بیماران مبتلا به دیابت مصرف نکنید.

لیتیم

افزایش میزان غلظت لیتیم سرم و سمیت لیتیم در هنگام مصرف همزمان لیتیم با آگونیست های گیرنده آنژیوتانسین II گزارش شده است. نظارت بر سطح لیتیم سرم در طول استفاده همزمان نیاز می باشد.

بارداری:

اگر تصمیم به باردار شدن دارید یا متوجه بارداری خود شده اید سریعاً به پزشک معالج خود اطلاع دهید تا از درمان های جایگزین برای شما بکار برده شود.

شیر دهی:

در شیر دهی استفاده این دارو ممنوع است.

رانندگی یا کار با ماشین آلات:

موردی برای رانندگی و کار با ماشین آلات وجود ندارد مگر اینکه اگر فردی احساس سرگیجه و یا خستگی بکند از رانندگی باید خودداری کند.

در افرادی که کلیرانس کراتین آن ها بیشتر از ۳۰ میلی لیتر در دقیقه است نیاز به تطبیق دوز نیست اما کمتر از این مقدار و افراد دیالیزی باید احتیاط شود.

عوارض جانبی احتمالی:

درد قفسه سینه، خستگی، سرگیجه، مشکلات گوارشی نظیر اسهال ،هایپر کالمی (نا متداول)، تهوع ،مشکل در بلع، آنژیوادم (نا متداول)، مشکلات کبدی (نادر)