Universidade Federal de Minas Gerais

Programa de Graduação em Física

ICEX

Notas em Teoria Clássica de Campos

Autores:
Álvaro Cássia Henrique
João Monteiro Mariana
Matheus Paulo Vitor

Professor:
Filipe Menezes

6 de junho de 2025

Convenções e Notação

Soma de Einstein	$x_\mu y^\mu \equiv \sum_{\mu=0}^{3} x_\mu y^\mu$
Assinatura	(-,+,+,+)
Unidades Naturais	$c = \epsilon_0 = \mu_0 = 1.$
Índices	Índices gregos: 0,1,2,3; Índices latinos: 1,2,3.
Derivadas Parciais	$\partial_\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu}$

Sumário

Convenções e Notação **1**

1 Relatividade Especial, Notação de Índices e Cálculo Tensorial **3**

1.1 Postulados da Relatividade Especial e Espaço-Tempo 3

1.2 Invariância do Intervalo 4

2 Introdução ao Princípio Variacional **4**

3 Lagrangiana do Campo Eletromagnético **4**

1. Relatividade Especial, Notação de Índices e Cálculo Tensorial

Começar os estudos em Teoria Clássica de Campos com Relatividade Especial, além de ser usual nos livros mais adotados em cursos univesitários, é fundamental para a construção da base conceitual e do *framework* matemático necessário no tratamento de campos clássicos para as interações fundamentais. Talvez o principal e mais famoso exemplo de um campo clássico desse tipo é o campo eletromagnético, que, em sua natureza, é governado por leis físicas que são covariantes sob Transformações de Lorentz (i.e., são as mesmas após realizarmos mudanças de coordenadas entre referenciais inerciais). Começaremos agora a introduzir os conceitos mais importantes de relatividade especial para o tratamento de campos clássicos fundamentais.

1.1. Postulados da Relatividade Especial e Espaço-Tempo

Enunciados por Einstein em 1905, ao tratar, justamente, de questões fundamentais envolvendo o campo eletromagnético[1], os postulados da relatividade especial podem ser adaptados em linguagem moderna da seguinte forma:

I. As leis da Física são as mesmas para todos referenciais inerciais.

II. A velocidade da luz é finita, com valor definido c para todo e qualquer referencial.

Estes são os alicerces a partir dos quais construiremos toda a teoria. Usaremos principalmente o postulado (I) para nos guiar a respeito do estabelecimento de qualquer framework matématico que viermos a desenvolver. Para entender a motivação por trás dos postulados, vale conferir o primeiro parágrafo em [1].

Devido aos postulados, surge de forma natural um tratamento equivalente de espaço e tempo na relatividade especial, antes vistos como dois entes totalmente separados e independentes. Em outras palavras, devido à demanda de que as leis da Física sejam covariantes por Lorentz, acabamos, inevitavelmente, por tratar espaço e tempo de forma equivalente, fundindo-os no mesmo objeto que denominamos de "espaço-tempo". Cada ponto desse espaço-tempo, assinalado pelas coordenadas $(t, \vec{x})$, ou (t, r, θ, φ), ou qualquer outro sistema genérico de coordenadas é chamado de "Evento" nesse espaço-tempo.

Nessa nova forma de tratar o espaço e o tempo, de modo que as leis Físicas não mudem sob mudanças de referenciais inerciais, acabamos introduzindo uma nova métrica, isto é, uma nova forma de "medir distâncias" nesse novo "espaço" construído a partir dessa "fusão" entre espaço e tempo. Essa nova métrica é dada por ds^2, que não é para ser entendida como "um número pequeno elevado ao quadrado", mas sim como um objeto por si só, que dita a medida das "distâncias" nesse espaço-tempo. Em coordenadas cartesianas para um espaço-tempo plano, a métrica é dada por:

$$ds^2 = -dt^2 + d\vec{x}^2$$

onde $d\vec{x}^2$ representa $dx^2 + dy^2 + dz^2$ para o espaço tridimensional (notação boba). Novamente, dt e dx não representam "infinitesimais", mas podem ser entendidos como tal a um primeiro momento; mais adiante, pretendemos esclarecer o real significado matemático que esses objetos carregam, quando formos descrever a métrica de forma tensorial[1].

[1]Uma generalização de matrizes, ou melhor, de vetores; nada assustador.

1.2. Invariância do Intervalo

Em espaços euclidianos, integramos um elemento de arco[2] ds ao longo de uma curva C para obtermos o comprimento de arco dessa curva. De forma completamente análoga, o comprimento de arco de uma curva C no espaço-tempo também é dado pela integral do elemento de arco[3] ds ao longo da mesma:

$$S \equiv \int_C ds \tag{1}$$

E as semelhanças não param por aí: assim como distâncias são preservadas em espaços euclidianos ao mudarmos de sistema de coordenadas, o comprimento de um arco no espaço-tempo é o mesmo, independente do sistema de coordenadas adotado:

$$S = S' \tag{2}$$

para toda curva C nesse espaço-tempo, e para quaisquer sistemas de coordenadas que se relacionam por transformações de Lorentz ("com linha" e "sem linha" denotam referenciais diferentes). Para provar a afirmação (2), considere a forma explícita da transformação de Lorentz que faz a passagem de um referencial que observa os eventos do espaço-tempo com as coordenadas (t, x) para um outro que os observa com as coordenadas $(\mathrm{t}', \mathrm{x}')$.

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma \mathrm{v} \\ -\gamma \mathrm{v} & \gamma \end{pmatrix}$$

onde v é a velocidade relativa entre os dois referenciais, e γ é o fator de Lorentz, dado por $\gamma = (1 - \mathrm{v}^2)^{-1/2}$. Considere então a métrica descrita pelos referenciais sem linha e com linha:

$$ds^2 = -dt^2 + dx^2 \quad ; \quad ds'^{\,2} = -dt'^{\,2} + dx'^{\,2}$$

2. Introdução ao Princípio Variacional

3. Lagrangiana do Campo Eletromagnético

[2]Obtido a partir da métrica euclidiana: $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$, que é a raiz quadrada da métrica euclidiana.
[3]Mais adiante mostraremos como obter o elemento de arco a partir da métrica; adiantamos que não é tão trivial quanto em espaços euclidianos, onde basta tirar a raiz quadrada da métrica. O espaço-tempo guarda algumas nuâncias...

Referências

[1] Albert Einstein. "Zur Elektrodynamik bewegter Körper". Em: *Annalen der Physik* 322 (1905), pp. 891–921. DOI: 10.1002/andp.19053221004.