

Отчет по лабораторной работе №3

Модель боевых действий - вариант 48

Казаков Александр НПИбд-02-19

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
3.1	Теоретические сведения	6
3.2	Задача	10
3.3	Код программы	11
4	Выводы	14
	Список литературы	15

List of Figures

3.1	Жёсткая модель войны	8
3.2	Фазовые траектории для второго случая	9
3.3	График численности для первого случая	11
3.4	График численности для второго случая	11

1 Цель работы

Рассмотреть некоторые простейшие модели боевых действий – модели Ланчестера.

2 Задание

1. Изучить некоторые простейшие модели боевых действий – модели Ланчестера
2. Построить графики изменения численности войск
3. Определить победившую сторону

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Теоретические сведения

Рассмотрим три случая ведения боевых действий: 1. Боевые действия между регулярными войсками 2. Боевые действия с участием регулярных войск и партизанских отрядов 3. Боевые действия между партизанскими отрядами

В первом случае численность регулярных войск определяется тремя факторами:

- скорость уменьшения численности войск из-за причин, не связанных с боевыми действиями (болезни, травмы, дезертирство);
- скорость потерь, обусловленных боевыми действиями противоборствующих сторон (что связано с качеством стратегии, уровнем вооружения, профессионализмом солдат и т.п.);
- скорость поступления подкрепления (задаётся некоторой функцией от времени).

В этом случае модель боевых действий между регулярными войсками описывается следующим образом

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Потери, не связанные с боевыми действиями, описывают члены $-a(t)x(t)$ и $-h(t)y(t)$, члены $-b(t)y(t)$ и $-c(t)x(t)$ отражают потери на поле боя. Коэффи-

коэффициенты $b(t)$, $c(t)$ указывают на эффективность боевых действий со стороны y и x соответственно, $a(t)$, $h(t)$ - величины, характеризующие степень влияния различных факторов на потери. Функции $P(t)$, $Q(t)$ учитывают возможность подхода подкрепления к войскам X и Y в течение одного дня.

Во втором случае в борьбу добавляются партизанские отряды. Нерегулярные войска в отличие от постоянной армии менее уязвимы, так как действуют скрытно, в этом случае сопернику приходится действовать неизбирательно, по площадям, занимаемым партизанами. Поэтому считается, что темп потерь партизан, проводящих свои операции в разных местах на некоторой известной территории, пропорционален не только численности армейских соединений, но и численности самих партизан. В результате модель принимает вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Модель ведение боевых действий между партизанскими отрядами с учетом предположений, сделанном в предыдущем случае, имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)x(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -h(t)y(t) - c(t)x(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В простейшей модели борьбы двух противников коэффициенты $b(t)$ и $c(t)$ являются постоянными. Попросту говоря, предполагается, что каждый солдат армии x убивает за единицу времени c солдат армии y (и, соответственно, каждый солдат армии y убивает b солдат армии x). Также не учитываются потери, не связанные с боевыми действиями, и возможность подхода подкрепления. Состояние системы описывается точкой (x, y) положительного квадранта плоскости. Координаты этой точки, x и y - это численности противостоящих армий. Тогда модель принимает вид

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -by \\ \frac{dy}{dt} = -ax \end{cases}$$

Это - жесткая модель, которая допускает точное решение

$$\frac{dx}{dy} = \frac{by}{cx}$$

$$cxdx = bydy, cx^2 - by^2 = C$$

Эволюция численностей армий x и y происходит вдоль гиперболы, заданной этим уравнением (рис. -fig. 3.1). По какой именно гиперболе пойдет война, зависит от начальной точки.



Figure 3.1: Жёсткая модель войны

Эти гиперболы разделены прямой $\sqrt{cx} = \sqrt{by}$. Если начальная точка лежит выше этой прямой, то гипербола выходит на ось y . Это значит, что в ходе войны численность армии x уменьшается до нуля (за конечное время). Армия y выигрывает, противник уничтожен. Если начальная точка лежит ниже, то выигрывает армия x . В разделяющем эти случаи состоянии (на прямой) война заканчивается истреблением обеих армий. Но на это требуется бесконечно большое время: конфликт продолжает тлеть, когда оба противника уже обессилены. Вывод модели таков: для борьбы с вдвое более многочисленным противником

нужно в четыре раза более мощное оружие, с втрое более многочисленным - в девять раз и т. д. (на это указывают квадратные корни в уравнении прямой). Стоит помнить, что эта модель сильно идеализирована и неприменима к реальной ситуации. Но может использоваться для начального анализа. Если рассматривать второй случай (война между регулярными войсками и партизанскими отрядами) с теми же упрощениями, то модель принимает вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -by(t) \\ \frac{dy}{dt} = -cx(t)y(t) \end{cases}$$

Эта система приводится к уравнению $\frac{d}{dt} (\frac{b}{2}x^2(t) - cy(t)) = 0$ которое при заданных начальных условиях имеет единственное решение: $\frac{b}{2}x^2(t) - cy(t) = \frac{b}{2}x^2(0) - cy(0) = C_1$




Figure 3.2: Фазовые траектории для второго случая

Из Рисунка fig. 3.2 видно, что при $C_1 > 0$ побеждает регулярная армия, при $C_1 < 0$ побеждают партизаны. Аналогично противостоянию регулярных войск, победа обеспечивается не только начальной численностью, но и боевой вырубкой и качеством вооружения. При $C_1 > 0$ получаем соотношение $\frac{b}{2}x^2(0) > cy(0)$ Чтобы одержать победу партизанам необходимо увеличить коэффициент

c и повысить свою начальную численность на соответствующую величину. При этом это увеличение, с ростом начальной численности регулярных войск $x(0)$ должно расти не линейно, а пропорционально второй степени $x(0)$. Таким образом, можно сделать вывод, что регулярные войска находятся в более выгодном положении, так как неравенство для них выполняется при меньшем росте начальной численности войск. Рассмотренные простейшие модели соперничества соответствуют системам обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка, широко распространенным при описании многих естественно научных объектов.

3.2 Задача

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 84000 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 61000 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем $P(t), Q(t)$ непрерывные функции. Постройте графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

1. Модель ведения боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.37x(t) - 0.66y(t) + \sin(5t + 1) + 1 \\ \frac{dy}{dt} = -0.37x(t) - 0.4y(t) + \cos(3t + 2) + 1 \end{cases}$$




Figure 3.3: График численности для первого случая

Побеждает армия X.

2. Модель ведения боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.39x(t) - 0.91y(t) + |\sin(2t)| \\ \frac{dy}{dt} = -0.54x(t)y(t) - 0.29y(t) + |\cos(6t)| \end{cases}$$




Figure 3.4: График численности для второго случая

Побеждает армия X.

3.3 Код программы

model lab3

```

parameter Real a = 0.37;
parameter Real b = 0.66;
parameter Real c = 0.37;
parameter Real h = 0.4;

parameter Real x0 = 84000;
parameter Real y0 = 61000;

Real x(start = x0);
Real y(start = y0);

equation
der(x) = -a * x - b * y + sin(5 * time + 1) + 1;
der(y) = -c * x - h * y + 2 * cos(3 * time + 2) + 1;

end lab3;

model lab3_2

parameter Real a = 0.39;
parameter Real b = 0.91;
parameter Real c = 0.54;
parameter Real h = 0.29;

parameter Real x0 = 84000;
parameter Real y0 = 61000;

Real x(start = x0);

```

```
Real y(start = y0);
```

```
equation
```

```
der(x) = -a * x - b * y + abs(sin(2 * time));
```

```
der(y) = -c * x * y - h * y + 2 * abs(cos(6 * time));
```

```
end lab3_2;
```

4 Выводы

Рассмотрены некоторые простейшие модели боевых действий – модели Ланчестера, построены графики изменения численности войск, определена победившая сторона.

Список литературы

1. Документация по системе Modelica – Режим доступа: <https://www.modelica.org/>
2. Введение в математическое моделирование : учебное пособие / В.Н. Ашихмин, М.Б. Гитман, И.Э. Келлер [и др.]; Под ред. П.В. Трусова. - Электронные текстовые данные. - М. : Логос, 2015. - 440 с. : ил. - (Новая Университетская Библиотека). - ISBN 978-5-98704-637-1.