






PROTOSCOLOS

nad+, peptidos, control de peso






INDEX



- 3... TERAPIA IV CON NAD+
- 4... RECUPERACION Y REHABILITACION POST LESION
- 5... RECUPERACION DE LESIONES
- 6... PREVENCION DE LESIONES Y LONGEVIDAD ARTICULAR
- 7... REGENERACION CELULAR CORPORAL COMPLETA
- 8... QUEMA DE GRASA Y SUPRESION DEL APETITO
- 9... ANTIARRUGAS Y RESTAURACION DE COLAGENO
- 10... REJUVENECIMIENTO CUTANEO DESPUES DE PROCEDIMIENTOS..
- 11... PREVENCION DE LESIONES Y PROTECCON ARTICULAR
- 12... TERAPIA PEPTIDICA "GLOW"
- 13... CONT. TERAPIA PEPTIDICA "GLOW"
- 14... TERAPIA CON TIRZEPATIDA
- 15... CONT. TERAPIA CON TIRZEPATIDA
- 16... TERAPIA CON RETATRUTIDA
- 17... CONT. TERAPIA CON RETATRUTIDA
- 18... ESTRATEGIAS GENERALES PARA PREVENIR EFECTOS SECUNDARIOS
- 19... CONSEJOS Y EFECTOS SECUNDARIOS
- 20... PREPARACION Y RECONSTITUCION
- 21... INYECCION, SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO
- 22... SINERGIAS DE PEPTIDOS
- 23...



TERAPIA IV CON NAD⁺



Propósito:

Apoyar el metabolismo energético celular y la función mitocondrial; comúnmente utilizada para rejuvenecimiento, longevidad, fatiga, niebla mental, recuperación general y optimización del rendimiento.

Terapia:

NAD⁺: 100–500 mg por sesión, 1–2 veces por semana (los protocolos varían; empezar con la dosis más baja para principiantes y dependiendo en reacción se va escalando la dosis. Maximo 500MG en total al mes.)

Ciclo: 8–12 semanas, descansa 4 semanas.

Adjuntos:

Sueño adecuado y manejo del estrés

Hidratación y balance de electrolitos

Nutrición adecuada con suficiente proteína

Ejercicio aeróbico y de resistencia según tolerancia

Corrección de anemia, alteraciones tiroideas o deficiencias nutricionales si están presentes

Resultados esperados:

Promueve el colágeno y reducción del tiempo de recuperación postquirúrgica

Mejoría temporal en niveles de energía o claridad mental

Mejorar la recuperación muscular, tendinosa o ligamentaria

Efectos secundarios:

Náusea

Sensación de calor o enrojecimiento

Opresión o molestia torácica

Cefalea

Mareo o sensación de desmayo

Calambres musculares

Irritación o flebitis en el sitio IV

Por qué ocurre:

Respuesta autonómica y vasodilatación relacionadas con la velocidad de infusión
Efectos metabólicos y osmóticos por concentraciones elevadas de NAD circulante

Qué hacer:

Iniciar con una velocidad de infusión lenta y ajustar según tolerancia
Disminuir la velocidad o pausar si aparecen náusea, opresión torácica o enrojecimiento
Asegurar buena hidratación antes de la infusión
Administrar después de una comida ligera si hay tendencia a náusea
Usar fuentes de preparación estéril confiables
Suspender y evaluar si aparecen escalofríos intensos, vómito severo, fiebre o síntomas sistémicos significativo.



RECUPERACION Y REHABILITACION POST-LESION



Propósito:

Acelerar la curación de músculos, ligamentos y tejidos conectivos.

Péptidos:

BPC-157: 500 mcg subcutáneo 1-2 veces al día (aplicación localizada)

TB-500: 2-5 mg semanal

Ciclo: 8-12 semanas, descansa 4 semanas.

Adjuntos:

Fisioterapia + estimulación eléctrica (E-stim)

Suplementación con colágeno (tipo I/III)

Terapia de luz roja en el área lesionada

Resultados esperados:

Recuperación más rápida después de lesión o cirugía

Mejor remodelación del colágeno

Reducción de la inflamación y del tiempo de inactividad

Efectos secundarios:

Mareo leve

Cambios en el apetito

Irritación en el sitio de inyección

Por qué ocurre:

Remodelación tisular

Respuesta vascular

Qué hacer:

Reducir la frecuencia durante la fase inicial

Tomar con alimentos si se administra por vía oral

Inyectar lentamente y aplicar hielo si hay inflamación en el sitio de aplicación



RECUPERACION DE LESIONES (MUSCULO, TENDON, LIGAMENTO, ARTICULACION)



Péptidos:

BPC-157: 250-500 mcg subcutáneo cerca del sitio de la lesión, 1-2 veces al día

TB-500: 2-5 mg por semana (dosis divididas)

Ciclo: 8-12 semanas, descansa 4 semanas.

Terapias de apoyo:

Fisioterapia

Terapia de luz roja

Suplementación con colágeno

Ideal para:

Acelerar la curación de músculos, ligamentos y tejidos conectivos.

Tendinitis, desgarros ligamentarios

Distensiones musculares, recuperación postquirúrgica

Lesiones por sobreuso y dolor articular

Duración del ciclo:

Hasta la recuperación completa (generalmente 4-8 semanas)

Resultados esperados:

Aceleración del tiempo de curación

Reducción de inflamación y dolor

Mejor remodelación tisular y movilidad

Por qué ocurre:

Remodelación tisular

Respuesta vascular

Efectos secundarios:

Mareo leve

Cambios en el apetito

Irritación en el sitio de inyección

Qué hacer:

Reducir la frecuencia durante la fase inicial

Tomar con alimentos si se administra por vía oral

Inyectar lentamente y aplicar hielo si hay inflamación local



PREVENCIÓN DE LESIONES Y LONGEVIDAD ARTICULAR



Péptidos:

TB-500: 2 mg semanal

BPC-157: 250 mcg diarios

Colágeno hidrolizado: 10-15 g diarios (vía oral)

Ciclo: 8-12 semanas, descansa 4 semanas.

Ideal para:

Atletas mayores o con estrés articular crónico

Prehabilitación durante ciclos de entrenamiento intensos

Reducir el riesgo de degeneración del tejido conectivo

Resultados esperados:

Tejidos conectivos más fuertes

Mejor movilidad y resiliencia articular

Menor frecuencia de lesiones a largo plazo

Efectos secundarios:

Mareo leve

Cambios en el apetito

Irritación en el sitio de inyección

Por qué ocurre:

Remodelación tisular

Respuesta vascular

Qué hacer:

Reducir la frecuencia durante la fase inicial

Tomar con alimentos si es vía oral

Inyectar lentamente y aplicar hielo si hay inflamación



REGENERACION CELULAR CORPORAL COMPLETA (POST- ENFERMADAD O CIRUGIA)



Péptidos:

BPC-157: 250-500 mcg subcutáneo diario

TB-500: 2-5 mg por semana (dosis divididas)

Ciclo: 8-12 semanas, descansa 4 semanas.

Optimización del estilo de vida:

Dieta alta en proteína y antiinflamatoria

Movimiento suave (caminar, yoga)

Terapia de luz roja y optimización del sueño profundo

Uso:

Recuperación postquirúrgica

Lesiones de tejidos blandos, cicatrización

Fatiga crónica, fibromialgia o agotamiento por recuperación

Beneficios esperados:

Reparación acelerada de heridas y tejidos blandos

Mayor energía y resiliencia física

Reducción de inflamación sistémica

Por qué ocurre:

Remodelación tisular

Respuesta vascular

Efectos secundarios:

Mareo leve

Cambios en el apetito

Irritación en el sitio de inyección

Qué hacer:

Reducir la frecuencia durante la fase inicial

Tomar con alimentos si es vía oral

Injectar lentamente y aplicar hielo si hay inflamación



QUEMA DE GRASA Y SUPRESION DEL APETITO



Péptidos:

Tesamorelina: 2 mg subcutáneo una vez al día (idealmente por la noche)

Ciclo: 8-12 semanas, descansa 4 semanas.

Soporte opcional:

Extracto de té verde o EGCG

Dieta alta en proteína y baja en carga insulinogénica

Cardio en ayuno (3-4 veces por semana)

Beneficios esperados:

Reducción acelerada de grasa visceral y subcutánea

Aumento del metabolismo basal

Disminución de antojos y mejor control del apetito



ANTIARRUGAS Y RESTAURACION DE COLAGENO



Péptidos:

GHK-Cu (péptido de cobre): 1- 5 mg subcutáneo diario

Ciclo: 8 semanas, descansa 4 semanas.

Complementos de estilo de vida:

Suero de vitamina C (mañana) + retinol (noche)

Dieta rica en colágeno y colágeno oral

Hidratación diaria (2-3 L de agua)

Beneficios esperados:

Mayor firmeza y elasticidad cutánea

Reducción de líneas finas y arrugas

Piel más lisa y luminosa



REJUVENECIMIENTO CUTANEO DESPUES DE PROCEDIMIENTOS ESTETICOS



Péptidos:

BPC-157: 250 mcg subcutáneo cerca del área tratada o vía oral para soporte general

TB-500: 2 mg/semana durante 2-3 semanas post-tratamiento (microneedling, radiofrecuencia, láser)

GHK-Cu (péptido de cobre): 1- 5 mg subcutáneo diario

Ciclo: 8 semanas, descansa 4 semanas.

Adjuntos:

Terapia de luz roja

Sueros con ácido hialurónico

Nutrición antiinflamatoria (omega-3, polifenoles)

Uso:

Recuperación tras láser, microneedling, PRP o cirugía

Reducir el tiempo de recuperación y mejorar la renovación tisular

Beneficios esperados:

Recuperación más rápida y menor irritación

Mejor reconstrucción de colágeno

Menor hiperpigmentación postinflamatoria

Por qué ocurre:

Remodelación tisular

Respuesta vascular

Efectos secundarios:

Mareo leve

Cambios en el apetito

Irritación en el sitio de inyección

Qué hacer:

Reducir la frecuencia durante la fase inicial

Tomar con alimentos si es vía oral

Injectar lentamente y aplicar hielo si hay inflamación



PREVENCIÓN DE LESIONES Y PROTECCIÓN ARTICULAR



Propósito:

Reforzar tejidos conectivos, prevenir lesiones por sobreuso y mantener la salud articular.

Péptidos:

BPC-157: 250 mcg subcutáneo cerca de áreas vulnerables diariamente

TB-500: 2-5 mg semanal (soporte sistémico)

Ciclo: 8-12 semanas, descansa 4 semanas

Ideal para:

Atletas en deportes de alta carga (crossfit, MMA, atletismo)

Personas mayores o en recuperación por sobre entrenamiento

Prevención durante bloques de entrenamiento intensos

Resultados esperados:

Tendones y ligamentos más fuertes

Menor riesgo de distensiones o desgarros

Mayor movilidad y confianza en el movimiento

Efectos secundarios / manejo:

Igual que los descritos anteriormente



TERAPIA PEPTIDICA “GLOW”

Propósito:

Mejorar la calidad de la piel, estimular la producción de colágeno y elastina, apoyar la regeneración cutánea y fortalecer cabello y uñas.

Péptidos:

GHK-Cu (péptido de cobre): 1-5 mg subcutáneo de lunes a viernes

BPC-157: 250 mcg subcutáneo de lunes a viernes (soporte de reparación tisular)

TB-500: 2 mg semanal (dosis puede ser partidas (soporte regenerativo sistémico)

Las combinaciones y dosis varían por paciente, es ideal empezar con la dosis mas baja para principiantes en su primer mes y en caso de querer una dosis mas alta escalar 1mg cada 2 semanas monitoreando síntomas.

Adjuntos:

Suero de vitamina C por la mañana

Retinoide por la noche (si es tolerado)

Protección solar diaria (FPS 30-50)

Colágeno hidrolizado 10-15 g/día

Hidratación adecuada (2-3 L/día)

Dieta rica en proteínas y antioxidantes

Optimización del sueño

Ideal para:

Foto envejecimiento y daño solar

Líneas finas y pérdida de elasticidad

Piel opaca o deshidratada

Recuperación post-procedimientos estéticos (láser, microneedling, peelings)

Cabello frágil o efluvio telógeno relacionado con estrés o enfermedad

Duración del ciclo: 8-12 semanas, descansa 4



CONT. TERAPIA PEPTIDICA “GLOW”

Resultados esperados:

- Mejoría gradual en hidratación y textura de la piel
- Incremento moderado en firmeza y elasticidad
- Reducción leve a moderada de líneas finas
- Recuperación cutánea más rápida después de procedimientos
- Mejoría en fortaleza de cabello y uñas

Efectos secundarios:

- Mareo leve
- Cambios en el apetito
- Irritación o eritema en el sitio de inyección
- Con GHK-Cu: posible hiperpigmentación local leve (raro)

Por qué ocurre:

- Estimulación de fibroblastos y síntesis de colágeno/elastina
- Aumento de angiogénesis y remodelación tisular
- Respuesta vascular y metabólica sistémica

Qué hacer:

- Iniciar con dosis bajas y ajustar según tolerancia
- Reducir frecuencia si aparecen efectos sistémicos
- Inyectar lentamente y rotar sitios de aplicación
- Aplicar frío local si hay inflamación o irritación
- Suspender y evaluar si aparece hiperpigmentación persistente o reacción cutánea significativa



TERAPIA CON TIRZEPATIDA

Propósito:

Reducir el peso corporal, mejorar el control glucémico, disminuir el apetito, optimizar la sensibilidad a la insulina y mejorar parámetros metabólicos asociados.

Mecanismo de acción:

Agonista dual de los receptores GIP y GLP-1:

Disminuye el apetito y aumenta la saciedad

Retrasa el vaciamiento gástrico

Mejora la secreción de insulina dependiente de glucosa

Reduce la producción hepática de glucosa

Dosis:

Administración subcutánea semanal:

Semana 1-4: 2.5 mg

Semana 5-8: 5 mg

Escalar cada 4 semanas según tolerancia:

7.5 mg

10 mg

12.5 mg

15 mg (dosis máxima)

El ajuste debe basarse en tolerancia gastrointestinal y respuesta clínica.

Adjuntos:

Dieta alta en proteína (1.2-1.6 g/kg/día)

Entrenamiento de fuerza 2-4 veces por semana

Hidratación adecuada (2-3 L/día)

Electrolitos si hay disminución del apetito o ingesta

Sueño adecuado

Fibra dietética para prevenir estreñimiento



CONT. TERAPIA CON TIRZEPATIDA

Ideal para:

Obesidad moderada a severa

Pacientes con respuesta insuficiente a otros agonistas GLP-1

Resistencia a la pérdida de peso

Síndrome metabólico o adiposidad visceral significativa

Duración del ciclo: Uso continuo según objetivos clínicos y tolerancia. Reevaluar cada 3-6 meses.

Resultados esperados:

Disminución marcada del apetito

Pérdida de peso significativa (hasta ~20-25% en estudios clínicos)

Reducción de grasa visceral

Mejoría en parámetros metabólicos

Efectos secundarios:

Náusea

Vómito ocasional

Diarrea o estreñimiento

Fatiga

Aumento leve de la frecuencia cardiaca (relacionado con el efecto glucagón)



TERAPIA CON RETATRUTIDA



Propósito:

Inducir pérdida de peso significativa, mejorar el metabolismo energético, reducir el apetito y favorecer la movilización de grasa corporal.

Mecanismo de acción:

Agonista triple:

GLP-1: saciedad y control glucémico

GLP: mejora metabólica y sensibilidad a la insulina

Glucagón: aumento del gasto energético y lipólisis

Dosis: Administración subcutánea semanal (esquema de titulación gradual):

Semana 1-4: 1 mg

Semana 5-8: 2 mg

Semana 9-12: 4 mg

Posteriormente: 6-8 mg según tolerancia y respuesta

Escalar cada 4 semanas para minimizar efectos gastrointestinales.

Adjuntos:

Dieta alta en proteína (1.2-1.6 g/kg/día)

Entrenamiento de fuerza para preservar masa muscular

Hidratación adecuada (2-3 L/día)

Suplementación con electrolitos si la ingesta disminuye

Monitoreo de masa muscular y composición corporal

Optimización del sueño



CONT. TERAPIA CON RETATRUTIDA



Ideal para:

Obesidad moderada a severa

Pacientes con respuesta insuficiente a otros agonistas GLP-1

Resistencia a la pérdida de peso

Síndrome metabólico o adiposidad visceral significativa

Duración del ciclo: Uso continuo según objetivos clínicos y tolerancia. Reevaluar cada 3-6 meses.

Resultados esperados:

Disminución marcada del apetito

Pérdida de peso significativa (hasta ~20-25% en estudios clínicos)

Reducción de grasa visceral

Mejoría en parámetros metabólicos

Efectos secundarios:

Náusea

Vómito ocasional

Diarrea o estreñimiento

Fatiga

Aumento leve de la frecuencia cardiaca (relacionado con el efecto glucagón)

Por qué ocurre:

Activación de centros de saciedad

Retraso del vaciamiento gástrico

Aumento del gasto energético mediado por glucagón

Adaptación metabólica a la reducción calórica

Qué hacer:

Escalar dosis gradualmente

Mantener hidratación y consumo adecuado de proteínas

Reducir la dosis si los síntomas gastrointestinales son persistentes

Monitorear frecuencia cardiaca y tolerancia general

Suspender y evaluar ante dolor abdominal intenso, signos de pancreatitis o síntomas biliares.



ESTRATEGIAS GENERALES PARA PREVENIR EFECTOS SECUNDARIOS



1. Comenzar bajo y avanzar lentamente
2. Iniciar con la dosis efectiva más baja y aumentarla gradualmente según la tolerancia.
3. Hidratación y apoyo a la recuperación
4. La deshidratación puede empeorar el dolor de cabeza y la fatiga.
Beber al menos 2-3 litros de agua al día, especialmente con péptidos de GH.
5. Ciclar los péptidos cuando sea apropiado
6. Evitar la exposición continua tomando descansos estratégicos cada 8-12 semanas o según sea necesario.
7. Monitorear biomarcadores y respuestas subjetivas
8. Utilizar análisis de laboratorio, dispositivos de seguimiento o registros para detectar efectos secundarios sutiles de forma temprana y realizar ajustes informados.
9. Priorizar la calidad
10. Usar péptidos de grado farmacéutico de fuentes confiables con pruebas de terceros para reducir riesgos por contaminantes o impurezas.



Consejos para una combinación (stacking) atlética segura y eficaz

- Ciclar los péptidos cada 8-12 semanas para mantener la sensibilidad de los receptores.
- Siempre combinar con entrenamiento de fuerza y prácticas de recuperación; los péptidos amplifican el estímulo, no lo reemplazan.
- Mantener una adecuada hidratación, monitorear marcadores sanguíneos (IGF-1, glucosa) y rotar los sitios de inyección.
- Consultar a un profesional si se combinan 3 o más péptidos o si se usan junto con terapia hormonal.

Posibles efectos secundarios

- Rigidez articular (péptidos de GH)
- Retención leve de líquidos
- Cefalea o letargo por picos de GH/IGF-1



Preparación

Materiales necesarios

- Vial de péptido (polvo liofilizado)
- Agua bacteriostática (para reconstitución)
- Jeringas de insulina (generalmente calibre 29-31, 0.3-1 mL, aguja de ½ pulgada)
- Toallitas con alcohol
- Algodón o gasa
- Contenedor para objetos punzocortantes
- Área de trabajo limpia (superficie desinfectada o bandeja)

Reconstitución del péptido (proceso estéril)

1. Lavar bien las manos con agua y jabón.
2. Limpiar las tapas del vial del péptido y del agua bacteriostática con una toallita con alcohol.
3. Con una jeringa nueva, cargar la cantidad deseada de agua bacteriostática (generalmente 1-2 mL según las instrucciones del péptido).
4. Inyectar lentamente el agua en el vial del péptido, dirigiendo el líquido hacia la pared del vidrio para evitar espuma.
5. Girar suavemente el vial en movimientos circulares (no agitar) hasta que el polvo se disuelva completamente. La solución debe quedar clara.
6. Guardar el vial reconstituido en el refrigerador (36-46°F / 2-8°C), a menos que se indique lo contrario.



Inyección subcutánea

Sitios de aplicación

- Abdomen inferior (lejos del ombligo)
- Parte externa del muslo
- Región superior de los glúteos o flancos

Rotar los sitios para prevenir irritación o formación de tejido cicatricial.

Instrucciones

1. Limpiar el sitio con alcohol y dejar secar al aire.
2. Cargar la dosis en una jeringa nueva.
3. Pellizcar un pliegue de piel entre el pulgar y el índice.
4. Insertar la aguja en un ángulo de 45-90° en el tejido subcutáneo.
5. Inyectar lentamente hasta vaciar el contenido.
6. Retirar la aguja y aplicar presión suave con gasa o algodón.
7. Desechar la jeringa en un contenedor para punzocortantes.

Seguridad y almacenamiento

- Usar siempre material estéril y sellado.
- No agitar los viales; girar suavemente.
- No reutilizar agujas ni jeringas.
- Mantener los péptidos reconstituidos refrigerados y protegidos de la luz.
- Utilizar dentro del tiempo recomendado (generalmente 20-30 días tras la reconstitución).
- Desechar correctamente todo material punzocortante.



Sinergias entre péptidos, nutrición y suplementos

Los péptidos son potentes, pero no actúan de forma aislada. La efectividad de cualquier protocolo depende del entorno interno: disponibilidad de nutrientes, equilibrio hormonal, estado inflamatorio y función mitocondrial. Al combinar la terapia con nutrición dirigida y suplementación basada en evidencia, se mejora la absorción, la señalización, la recuperación y el impacto a largo plazo.

Esta sección explica cómo alinear estratégicamente los péptidos con patrones dietéticos y suplementos de apoyo para mejorar el rendimiento, la regeneración y la resiliencia.

Por qué la sinergia es importante

Los péptidos actúan en vías biológicas complejas influenciadas por:

- Estado de micronutrientes (zinc, magnesio, vitaminas del complejo B)
- Momento de ingesta de macronutrientes (proteínas y carbohidratos alrededor de la estimulación de GH)
- Carga inflamatoria (relación omega-6 / omega-3)
- Cofactores hormonales (insulina, tiroides, cortisol)
- Disponibilidad de sustratos para la función mitocondrial

Si la base nutricional es deficiente, incluso el protocolo de péptidos más avanzado puede tener un rendimiento subóptimo.

GET IN TOUCH

+52 1 81 3108 2689

