КУРС НЕМЕЦКОГО · ГРИГОРИЙ · C1 · МЕДИЦИНСКИЙ C1 · ДОКУМЕНТАЦИЯ · ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК

Урок 92. Arztbrief C1: «Die Beschwerden sind am ehesten auf … zurückzuführen»

Выписку читают семейный врач, следующий стационар и — при проблемах — юрист. Хорошее письмо короткое, логичное и написано так, как пишут немецкие врачи, а не как переводят с русского. В уроке — словарь «связок» эпикриза, которые сразу поднимают письмо на уровень C1, как оформить лекарства при выписке, как формулировать рекомендации и как выглядит правка черновика старшим врачом. Пишем выписку пациентки с рожей из урока 80. У каждой фразы [транскрипция].

1 ⭐ Структура выписки

Порядок почти везде одинаков. Эпикриз (*Epikrise / Verlauf*) — сердце письма: **почему поступила → что нашли → что сделали → как шло → чем кончилось**. Не повторяйте анамнез и все анализы — только то, что объясняет решения.

раздел	что писать
Diagnosen	**Hauptdiagnose, затем Nebendiagnosen**
Anamnese	**коротко: повод поступления**
Befunde	**только значимые: клиника, лаборатория, визуализация**
Epikrise / Verlauf	**логика лечения в 5–8 предложениях**
Medikation bei Entlassung	**с пометками neu / abgesetzt / geändert**
Procedere / Empfehlungen	**что делать семейному врачу и пациенту**

Wir berichten über unsere gemeinsame Patientin, Frau B., die sich vom zehnten bis vierzehnten Oktober in unserer stationären Behandlung befand.

[виа бэрихьтэн юбэр унзэрэ гэмайнзаамэ пациэнтин, фрау бэ, ди зихь фом цээнтэн бис фирцээнтэн октообэр ин унзэрэр штацьёнээрэн бэхандлунг бэфант]

Сообщаем о нашей общей пациентке Б., находившейся у нас на стационарном лечении с 10 по 14 октября.

Hauptdiagnose: Erysipel des linken Unterschenkels. Nebendiagnose: Interdigitalmykose links.

[хауптдиагноозэ: эризипээль дэс линкэн унтэршэнкэльс. нээбэндиагноозэ: интэрдигитаальмюкоозэ линкс]

Основной диагноз: рожа левой голени. Сопутствующий: межпальцевый микоз слева.

Die stationäre Aufnahme erfolgte bei Fieber und schmerzhafter Rötung des linken Unterschenkels.

[ди штацьёнээрэ ауфнаамэ эрфольгтэ бай фибэр унт шмэрцхафтэр рётунг дэс линкэн унтэршэнкэльс]

Госпитализирована с температурой и болезненным покраснением левой голени.

2 ⭐⭐⭐ Связки эпикриза — уровень C1

Именно эти обороты отличают письмо носителя. Каждый — с готовым медицинским примером. Выучите их как блоки.

оборот	значит
… ist am ehesten auf … zurückzuführen	**скорее всего объясняется …**
bei Vorhandensein von …	**при наличии …**
zum Ausschluss / zum Nachweis von …	**для исключения / подтверждения …**
anhand / auf Grundlage von …	**на основании …**
… stellt eine Indikation zu … dar	**… является показанием к …**
nach Nutzen-Risiko-Abwägung	**взвесив пользу и риск**
… wies … auf	**… обнаруживал(а) …**

Die Infektion ist am ehesten auf eine Interdigitalmykose als Eintrittspforte zurückzuführen.
[ди инфэкцьён ист ам ээстэн ауф айнэ интэрдигитаальмюкоозэ альс айнтритспфортэ цурюкцуфюрэн]
Инфекция, скорее всего, объясняется межпальцевым микозом как входными воротами.

Zum Ausschluss einer tiefen Venenthrombose erfolgte eine Duplexsonographie.
[цум аусшлюс айнэр тиифэн вээнэнтромбоозэ эрфольгтэ айнэ дуплэксзонографии]
Для исключения ТГВ проведено дуплексное сканирование.

Anhand des klinischen Bildes und der Entzündungswerte wurde die Diagnose gestellt.
[анханд дэс клинишэн бильдэс унт дэр энтцюндунгсвээртэ вурдэ ди диагноозэ гэштэльт]
Диагноз поставлен на основании клинической картины и маркеров воспаления.

Bei Vorhandensein einer Penicillinallergie wäre Clindamycin eine Alternative gewesen.
[бай форхандэнзайн айнэр пэницилиналергии вээрэ клиндамюцин айнэ альтэрнатиивэ гэвээзэн]
При наличии аллергии на пенициллин альтернативой был бы клиндамицин.

Die rezidivierende Symptomatik stellt eine Indikation zur weiteren Abklärung dar.

[ди рэцидивиирэндэ зюмптоматик штэльт айнэ индикацьён цур вайтэрэн апклеэрунг даа]
Рецидивирующая симптоматика является показанием к дальнейшему обследованию.

Nach Nutzen-Risiko-Abwägung verzichteten wir auf eine Antikoagulation.
[нах нуцэн-ризико-апвээгунг фэрцихьтэтэн виа ауф айнэ антикоагуляцьён]
Взвесив пользу и риск, от антикоагуляции отказались.

Die Patientin wies bei Aufnahme ein CRP von hundertachtzig Milligramm pro Liter auf.
[ди пациэнтин виис бай ауфнаамэ айн цэ-эр-пэ фон хундэртахтцихь милиграм про литэр ауф]
При поступлении у пациентки СРБ был 180 мг/л.

3 ⭐⭐ Лекарства при выписке

Семейный врач должен с первого взгляда видеть, **что изменилось**. Помечайте: **neu**, **abgesetzt**, **pausiert**, **Dosis geändert**, и пишите срок: *bis einschließlich …*, *für weitere fünf Tage*, *bis auf Weiteres*.

Penicillin V eins Komma fünf Mega dreimal täglich, neu, bis einschließlich zwanzigsten Oktober.
[пэницилин фау айнс комма фюнф мээга драймаль тээглихь, ной, бис айншлисслихь цванцихстэн октообэр]
Пенициллин V 1,5 млн ЕД трижды в день, новое, по 20 октября включительно.

Clotrimazol-Creme zweimal täglich zwischen die Zehen, neu, für vier Wochen.
[клотримацоль-крээм цваймаль тээглихь цвишэн ди цээн, ной, фюр фир вохэн]
Крем клотримазол дважды в день между пальцами, новое, на четыре недели.

Ibuprofen wurde abgesetzt.
[ибупрофээн вурдэ апгэээцт]
Ибупрофен отменён.

Die übrige Medikation wurde unverändert fortgeführt.
[ди юбригэ мэдикацьён вурдэ унфэрэндэрт фортгэфюрт]
Остальные препараты продолжены без изменений.

4 ⭐⭐ Рекомендации семейному врачу

Конкретно, проверяемо, со сроком. Просьбы к коллеге — вежливо: *Wir bitten um …, Wir empfehlen ….* Закрытие — *Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung. Mit freundlichen kollegialen Grüßen.*

Wir bitten um eine klinische Kontrolle und eine CRP-Bestimmung in einer Woche.

[виа битэн ум айнэ клинишэ контролле унт айнэ цэ-эр-пэ-бэштимунг ин айнэр вохэ]

Просим клинический контроль и СРБ через неделю.

Zur Rezidivprophylaxe empfehlen wir eine konsequente Behandlung der Fußmykose.

[цур рэцидиифпрофилаксэ эмпфээлен виа айнэ консэквэнтэ бэхандлунг дэр фусмюкоозэ]

Для профилактики рецидива рекомендуем последовательно лечить микоз стоп.

Bei erneutem Fieber oder zunehmender Rötung bitten wir um umgehende Wiedervorstellung.

[бай эрнойтэм фибэр одэр цунээмэндэр рётунг битэн виа ум умгээндэ видэрфоорштэлунг]

При повторной температуре или нарастании покраснения просим срочно направить обратно.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Mit freundlichen kollegialen Grüßen.

[фюр рюкфраагэн штээн виа инэн гэрн цур фэрфюгунг. мит фройндлихьэн колегиаален грюсэн]

Готовы ответить на вопросы. С уважением, коллеги.

5 Старший врач правит черновик

Anna — Oberärztin, Yannick — ассистент. Слушайте, какие формулировки она меняет и почему.

Корректура эпикриза

Ihr Brief ist inhaltlich gut, aber die Epikrise ist zu lang.
[иа брииф ист инхальтлихь гут, абэр ди эпикриизэ ист цу лянг]
Письмо по содержанию хорошее, но эпикриз слишком длинный.

Was würden Sie kürzen?
[вас вюрдэн зи кюрцэн]
Что бы вы сократили?

Die Laborwerte jeden Tag brauchen wir nicht. Schreiben Sie nur: CRP rückläufig von hundertachtzig auf sechzig.
[ди лабоорвээртэ йээдэн таак браухэн виа нихьт. шрайбэн зи нур: цэ-эр-пэ рюклойфихь фон хундэртахтцихь ауф зэхьцихь]
Анализы за каждый день не нужны. Напишите только: СРБ снизился со 180 до 60.

Und statt «Die Ursache war vielleicht der Fußpilz» besser: «am ehesten auf eine Interdigitalmykose zurückzuführen».
[унт штат ди уурзахэ ваа филяйхьт дэа фуспильц бэсэр: ам ээстэн ауф айнэ интэрдигитаальмюкоозэ цурюкцуфюрэн]
И вместо «причиной, возможно, был грибок» лучше: «скорее всего, объясняется межпальцевым микозом».

Verstanden. Soll ich bei der Medikation markieren, was neu ist?
[фэрштандэн. золь ихь бай дэр мэдикацьён маркиирэн, вас ной ист]
Понял. Отметить в лекарствах, что новое?

Unbedingt. Neu, abgesetzt, und beim Antibiotikum das Enddatum.
[унбэдингт. ной, апгэээцт, унт байм антибиотикум дас эндаатум]
Обязательно. Новое, отменённое, а у антибиотика — дата окончания.

Und die Empfehlung zur Kontrolle formuliere ich mit konkretem Termin.
[унт ди эмпфээлунг цур контролле формулиирэ ихь мит конкрээтэм тэрмиин]
А рекомендацию по контролю сформулирую с конкретным сроком.

Genau so. Dann unterschreibe ich heute noch.
[гэнау зо. дан унтэршрайбэ ихь хойтэ нох]

О Именно. Тогда подпишу сегодня же.

6 Частые ошибки

~~Die Ursache war vielleicht der Fußpilz.~~

… am ehesten auf eine Interdigitalmykose zurückzuführen.

Fachsprache + осторожность

~~Am 10.10. CRP 180, am 11.10. CRP 150, am 12.10. …~~

CRP rückläufig von 180 auf 60 mg/l.

динамика, не таблица

~~Wir haben eine Duplex gemacht, um eine Thrombose auszuschließen.~~

Zum Ausschluss einer TVT erfolgte eine Duplexsonographie.

Nominalstil

~~Medikamente: Penicillin, Creme.~~

Penicillin V 1,5 Mega 3×tgl., neu, bis einschl. 20.10.

доза, кратность, пометка, срок

~~Bitte kontrollieren.~~

Wir bitten um eine klinische Kontrolle und CRP in einer Woche.

что, когда

~~Die Patientin wies CRP 180 auf. (без «bei Aufnahme»)~~

Die Patientin wies bei Aufnahme ein CRP von 180 mg/l auf.

время и единицы

~~Mit freundlichen Grüßen, Ihr Doktor~~

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

коллеге — kollegial

7 Домашка

1. Перепишите в стиле C1: *Wir haben ein CT gemacht, weil wir sehen wollten, ob es eine Lungenembolie ist.*

2. С оборотом *zurückzuführen sein auf*: отёк ног из-за сердечной недостаточности.

3. Оформите медикацию при выписке: ривароксабан (новый, 15 мг 2 раза в день до 3.11., потом 20 мг 1 раз), диклофенак отменён.

4. Две рекомендации семейному врачу с конкретным сроком.

5. Своё: эпикриз (6–8 предложений) пациента после ЭВЛК с EHIT, использовав минимум четыре оборота из урока.

Ответы для самопроверки — нажми и послушай:

Zum Ausschluss einer Lungenembolie erfolgte eine CT-Angiographie.
[цум аусшлюс айнэр люнгэнэмболии эрфольгтэ айнэ цэ-тэ-ангиографии]
1.

Die Beinödeme sind am ehesten auf eine Herzinsuffizienz zurückzuführen.
[ди байнёдээмэ зинт ам ээстэн ауф айнэ хэрцинзуфициэнц цурюкцуфюрэн]
2.

Rivaroxaban fünfzehn Milligramm zweimal täglich, neu, bis dritten November, danach zwanzig Milligramm einmal täglich. Diclofenac abgesetzt.
[ривароксабан фюнфцээн милиграм цваймаль тээглихь, ной, бис дритэн новэмбэр, данах цванцихь милиграм айнмаль тээглихь. диклофэнак апгэзэцт]
3.

Wir bitten um eine Blutbildkontrolle in einer Woche. Eine Wiedervorstellung in unserer Ambulanz ist in drei Monaten geplant.
[виа битэн ум айнэ блютбильдконтролле ин айнэр вохэ. айнэ видэрфоорштэлунг ин унзэрэр амбулянц ист ин драй моонатэн гэпляант]
4.

📓 Все фразы урока уже в ЗУБРе — колода «Урок 92». Открыть тренажёр →
📘 Связано с уроками 55 (Arztbrief B1), 80 (тот же случай на обходе), 72 (Nominalstil) и 70 (сложные тексты).

🎬 Видео к уроку



Пишем Arztbrief: фразы, которые используют немецкие врачи

Работать врачом в Германии Natalia Dähne · 13:26 · смотреть на YouTube

▶

Наталья Дене, врач в Германии, по-русски разбирает фразы, которыми немецкие врачи на самом деле пишут Arztbrief: zurückzuführen sein auf, bei Vorhandensein, zum Ausschluss/Nachweis, auf Grundlage, eine Indikation darstellen, Nutzen-Risiko-Abwägung, aufweisen. Ровно второй блок урока — с её примерами и пояснениями, почему так пишут носители.

Где что в ролике:

- 1:38 — зачем эти фразы
- 2:38 — zurückzuführen sein auf
- 4:09 — bei Vorhandensein
- 6:30 — zum Ausschluss / Nachweis
- 8:04 — auf Grundlage
- 9:43 — eine Indikation darstellen
- 10:31 — Nutzen-Risiko-Abwägung
- 12:04 — aufweisen и рекомендации

Задания к видео:

1. Почему автор советует учить эти обороты, а не «книжные» фразы?
   ▶ ответ
2. Как сказать «объясняется чем-то» по-немецки?
   ▶ ответ
3. Какой оборот для «при наличии»?
   ▶ ответ
4. Как в письме сказать «является показанием к …»?
   ▶ ответ
5. Что значит Nutzen-Risiko-Abwägung и где её пишут?
   ▶ ответ

Урок 92 · C1 · медицинский C1 · документация · 29.10.2026 · Эпикриз и выписной Arztbrief на уровне C1