КУРС НЕМЕЦКОГО · ГРИГОРИЙ · B2 · МЕДИЦИНА · ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК

Урок 57. Флебология по-немецки: Varikose und CVI

Ваша специальность — на немецком. Как устроены вены ноги, какие бывают варикозы, как называются стадии (Hach, CEAP, Widmer), как пациент рассказывает о жалобах и как это звучит в медицинском языке, что спрашивать у дуплекса и как записать находки, какие есть методы лечения — и как всё это объяснить пациенту простыми словами и доложить старшему врачу. Факты сверены с учебником *Herold, Innere Medizin* (2020) — самым распространённым учебником терапии в Германии и Австрии. Врач озвучен мужским голосом. У каждой фразы **[транскрипция]**.

1 Анатомия: три системы вен

На ноге три системы (Herold):
1. Поверхностная (epifaszial) — *V. saphena magna* от внутренней лодыжки до **Crosse** (*Venenstern*, устье под паховой складкой) и *V. saphena parva* на задней поверхности голени. В разговоре с пациентом — **große / kleine Rosenvene**.
2. Глубокая — несёт около 90 % венозного оттока, главный мотор — **мышечная помпа** икры (и суставная).
3. Перфоранты — соединяют поверхностные вены с глубокими; группы Dodd (бедро), Boyd (под коленом), Cockett (нижняя треть голени изнутри).
Клапаны пропускают кровь только вверх и внутрь — «по принципу патерностера».

das oberflächliche Venensystem
[дас обэрфлэхьлихьэ вэнэнзюстэм]
поверхностная венозная система

das tiefe Venensystem
[дас тифэ вэнэнзюстэм]
глубокая венозная система

die Perforansvene, die Perforansvenen
[ди пэрфорансвэнэ, ди пэрфорансвэнэн]
перфорантная вена

die Vena saphena magna, die große Rosenvene
[ди вэна зафэна магна, ди гросэ розэнвэнэ]
большая подкожная вена (БПВ)

die Vena saphena parva, die kleine Rosenvene
[ди вэна зафэна парва, ди кляйнэ розэнвэнэ]
малая подкожная вена (МПВ)

die Crosse, der Venenstern
[ди кросэ, дэа вэнэнштэрн]
устье БПВ, «венозная звезда»

die Venenklappe, die Venenklappen
[ди вэнэнкляпэ, ди вэнэнкляпэн]
венозный клапан

die Muskelpumpe
[ди мускэльпумпэ]
мышечная помпа

die Leiste
[ди ляйстэ]
пах

die Kniekehle
[ди кникэлэ]
подколенная ямка

der Innenknöchel
[дэа инэнкнёхьэль]
внутренняя лодыжка

Die tiefen Beinvenen übernehmen etwa 90 % des venösen Rückstroms.
[ди тифэн байнвэнэн юбэрнээмэн этва нойнцихь процэнт дэс вэнёзэн рюкштромс]
Глубокие вены несут около 90 % венозного оттока.

Die Venenklappen verhindern, dass das Blut zurückfließt.
[ди вэнэнкляпэн фэрхиндэрн, дас дас блют цурюкфлист]
Клапаны не дают крови течь обратно.

2 ⭐ Какой бывает варикоз

die Varikose (или *Varikosis*) — болезнь, **die Varizen** — сами расширенные вены, **die Krampfadern** — то же самое по-простому (так говорят пациенты).
• **primär** (≈95 %) — клапаны поверхностных вен не закрываются, причины «изнутри» (наследственность — у половины, возраст, беременность, работа стоя/сидя);
• **sekundär** (≈5 %) — обходные пути после тромбоза глубоких вен.
Виды: **Stammvarikose** (ствол БПВ/МПВ), **Seitenastvarikose** (притоки), **retikuläre Varizen** (2–4 мм, сеточка), **Besenreiser** (< 1 мм, «веник» — дословно «прутья метлы»).

die Varikose, die Varikosis
[ди варикозэ, ди варикозис]
варикозная болезнь

die Varize, die Varizen
[ди варицэ, ди варицэн]
варикозная вена

die Krampfader, die Krampfadern
[ди крампфадэр, ди крампфадэрн]
варикозная вена (разговорное)

die Stammvarikose
[ди штамварикозэ]
стволовой варикоз

die Seitenastvarikose
[ди зайтэнаствварикозэ]
варикоз притоков

retikuläre Varizen
[рэтикулерэ варицэн]
ретикулярные вены

die Besenreiser
[ди бэзэнрайзэр]
телеангиэктазии, «сосудистые звёздочки»

primär, sekundär
[примэр, зэкундэр]

первичный, вторичный

Bei der primären Varikose schließen die Venenklappen nicht mehr richtig.

[бай дэр примэрэн варикозэ шлисэн ди вэнэнкляпэн нихьт мэр рихьтихь]

При первичном варикозе клапаны перестают нормально закрываться.

Die sekundäre Varikose entsteht meist nach einer tiefen Beinvenenthrombose.

[ди зэкундэрэ варикозэ энтштэт майст нах айнэр тифэн байнвэнэнтромбозэ]

Вторичный варикоз обычно возникает после тромбоза глубоких вен.

3 ⭐⭐ Стадии: Hach, CEAP, Widmer

Hach (ствол БПВ)	где кончается рефлюкс — distaler Insuffizienzpunkt
I	**только устьевой клапан (Crosseninsuffizienz)**
II	**до уровня выше колена**
III	**до уровня ниже колена**
IV	**до лодыжки**

CEAP — клиника (C)	по-немецки
C0	**keine sichtbaren Zeichen**
C1	**Besenreiser, retikuläre Varizen**
C2	**Varizen**
C3	**Ödem**
C4	**Hautveränderungen: Hyperpigmentierung, Ekzem (4a); Lipodermatosklerose, Atrophie blanche (4b)**
C5	**abgeheiltes Ulkus**
C6	**florides (offenes) Ulkus — Ulcus cruris venosum**

CVI по Widmer (немецкоязычная классика): I — обратимые отёки, Corona phlebectatica; II — стойкие отёки, гиперпигментация, липодерматосклероз, Atrophie blanche, Stauungsekzem; III — открытая или зажившая язва.
Herold честно пишет, что CEAP «для практики сложновата», — но в письмах и на конференциях её используют постоянно, а вам, флебологу, она привычна.

Stammvarikose der Vena saphena magna links, Stadium III nach Hach.
[штамварикозэ дэа вэна зафэна магна линкс, штадиум драй нах хах]
Стволовой варикоз БПВ слева, III стадия по Hach.

der distale Insuffizienzpunkt
[дэа дисталэ инзуфициэнцпункт]
дистальная точка несостоятельности

der Valsalva-Pressversuch
[дэа вальзальва-прэсфэрзух]

проба Вальсальвы

Reflux bis unterhalb des Kniegelenks.
[рэфлюкс бис унтэрхальп дэс книгэленкс]
Рефлюкс до уровня ниже коленного сустава.

Stadium C3 nach CEAP: Ödem.
[штадиум цэ драй нах цэ-э-а-пэ: ёдэм]
С3 по CEAP: отёк.

die chronisch-venöse Insuffizienz
[ди кроныш-вэнёзэ инзуфициэнц]
хроническая венозная недостаточность (ХВН)

die Hyperpigmentierung
[ди хюпэрпигмэнтирунг]
гиперпигментация

die Lipodermatosklerose
[ди липодэрматосклерозэ]
липодерматосклероз

die Atrophie blanche
[ди атрофи бланш]
белая атрофия

das Ulcus cruris venosum, das offene Bein
[дас ульцус крурис вэнозум, дас офэнэ байн]
венозная трофическая язва («открытая нога»)

das Stauungsekzem
[дас штауунгсэкцем]
застойная экзема

4 ⭐ Жалобы: как говорит пациент и как пишет врач

🩺 **Главный признак венозных жалоб** (Merke y Herold): хуже **вечером**, после долгого **стояния или сидения**, в **жару** — и лучше при ходьбе и лёжа. У артериальных (PAVK) наоборот: болит именно при ходьбе.

пациент говорит	врач пишет
Meine Beine sind schwer.	**Schweregefühl**
Abends sind meine Knöchel dick.	**abendliche Knöchelödeme**
Nachts habe ich Wadenkrämpfe.	**nächtliche Wadenkrämpfe**
Es juckt.	**Juckreiz**
Ich habe ein offenes Bein.	**Ulcus cruris venosum**

Meine Beine sind abends so schwer.
[майнэ байнэ зинт абэндс зо швэр]
Вечером ноги такие тяжёлые.

Abends sind meine Knöchel dick.
[абэндс зинт майнэ кнёхьэль дик]
Вечером отекают лодыжки.

Nachts habe ich Wadenkrämpfe.
[нахтс хабэ ихь вадэнкрэмпфэ]
Ночью сводит икры.

Es juckt am Unterschenkel.
[эс юкт ам унтэршэнкэль]
Чешется голень.

Im Sommer ist es schlimmer.
[им зомэр ист эс шлимэр]
Летом хуже.

Wenn ich laufe oder liege, wird es besser.
[вэн ихь лауфэ одэр лигэ, вирт эс бэсэр]
Когда хожу или лежу — легче.

das Schweregefühl
[дас швэрэгэфюль]
чувство тяжести

das Knöchelödem
[дас кнёхьэльёдэм]
отёк лодыжек

der Wadenkrampf
[дэа вадэнкрампф]
судорога икроножной мышцы

Die Beschwerden nehmen gegen Abend und nach langem Stehen zu.
[ди бэшвэрдэн нээмэн гэгэн абэнт унт нах лянгэм штээн цу]
Жалобы усиливаются к вечеру и после долгого стояния.

5 ⭐⭐ Дуплекс и Befund

Herold: дуплекс отвечает на **два вопроса**. 1) Глубокие вены проходимы? — сжимается ли вена датчиком (*Kompressionssonographie*), меняется ли кровоток с дыханием. 2) Состоятельны ли клапаны ствола? — есть ли **Reflux** при пробе Вальсальвы (*Valsalva-Pressversuch*); где он кончается — **distaler Insuffizienzpunkt**, это и есть стадия по Hach. Обследование варикоза — **стоя**. Старые функциональные пробы (Trendelenburg, Perthes) вытеснены дуплексом.

die Duplexsonographie
[ди дуплексзонографи]
дуплексное сканирование

Sind die tiefen Venen durchgängig?
[зинт ди тифэн вэнэн дурхьгэнгихь]
Проходимы ли глубокие вены?

Ist die Vene komprimierbar?
[ист ди вэнэ компримирбар]
Сжимается ли вена?

Gibt es einen Reflux beim Valsalva-Pressversuch?
[гипт эс айнэн рэфлюкс байм вальзальва-прэсфэрзух]
Есть ли рефлюкс при пробе Вальсальвы?

Tiefe Beinvenen beidseits frei durchgängig und komprimierbar.
[тифэ байнвэнэн байтзайтс фрай дурхьгэнгихь унт компримирбар]
Глубокие вены с обеих сторон проходимы и сжимаемы.

Insuffizienz der Vena saphena magna links mit Reflux bis zur Mitte des Unterschenkels.
[инзуфициэнц дэа вэна зафэна магна линкс мит рэфлюкс бис цур митэ дэс унтэршэнкэльс]
Несостоятельность БПВ слева с рефлюксом до середины голени.

Mündungsklappe insuffizient, Durchmesser 8 mm.
[мюндунгсклапэ инзуфициэнт, дурхьмэсэр ахт милимэтэр]
Остиальный клапан несостоятелен, диаметр 8 мм.

Insuffiziente Perforansvene am medialen Unterschenkel.

[инзуфициэнтэ пэрфорансвэнэ ам мэдиален унтэршэнкэль]

Несостоятельный перфорант на медиальной поверхности голени.

6 Лечение

Консервативно: компрессионный трикотаж — обычно хватает класса II (по Herold около 30 мм рт. ст. на лодыжке); ходить и лежать — хорошо, сидеть и стоять — плохо («SS schlecht, LL gut»); тепло расширяет вены — без сауны и долгого солнца, холодный душ полезен.
Оперативно (при жалобах; обязательное условие — проходимые глубокие вены): *Crossektomie* + *Stripping*, перевязка несостоятельных перфорантов, удаление притоков (*Miniphlebektomie*); **эндовенозно** — *Lasertherapie* и *Radiofrequenzablation* в тумесцентной анестезии.
Склеротерапия — *Sklerosierung*, в разговоре с пациентом **Verödung** («запаивание»): ретикулярные вены, Besenreiser, мелкие притоки.

der Kompressionsstrumpf, die Kompressionsstrümpfe
[дэа компрэсьёнсштрумпф, ди компрэсьёнсштрюмпфэ]
компрессионный чулок

die Kompressionsklasse II
[ди компрэсьёнсклясэ цвай]
второй класс компрессии

die Crossektomie
[ди кросэктоми]
кроссэктомия

das Stripping
[дас стрипинг]
стриппинг

die endovenöse Lasertherapie
[ди эндовэнёзэ лейзэртэрапи]
эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК)

die Radiofrequenzablation
[ди радиофрэквэнцаблацьён]
радиочастотная абляция (РЧА)

die Schaumsklerosierung, die Verödung
[ди шаумсклерозирунг, ди фэрёдунг]
пенная склеротерапия; «запаивание» (для пациента)

die Miniphlebektomie
[ди минифлебэктоми]
минифлебэктомия

die Tumeszenzlokalanästhesie
[ди тумэсцэнцлокальанэстэзи]
тумесцентная анестезия

Vor jeder Operation muss gezeigt werden, dass die tiefen Venen frei durchgängig sind.
[фор едэр опэрацьён мус гэцайкт вэрдэн, дас ди тифэн вэнэн фрай дурхьгэнгихь зинт]
Перед любой операцией нужно показать, что глубокие вены проходимы.

Liegen und Laufen sind gut, Sitzen und Stehen sind schlecht.
[лигэн унт лауфэн зинт гут, зицэн унт штээн зинт шлехьт]
Лежать и ходить — хорошо, сидеть и стоять — плохо.

Wärme erweitert die Venen. Deshalb keine Sauna und kein langes Sonnenbad.
[вэрмэ эрвайтэрт ди вэнэн. дэсхальп кайнэ зауна унт кайн лянгэс зонэнбат]
Тепло расширяет вены. Поэтому без сауны и долгого загара.

7 ⭐⭐ Объяснить пациенту

Без латыни, короткими фразами (урок 49): вместо *Insuffizienz* — **undicht**, вместо *Reflux* — «кровь течёт обратно вниз», вместо *Tumeszenzlokalanästhesie* — **örtliche Betäubung**.

Ihre große Rosenvene ist undicht. Die Klappen schließen nicht mehr richtig.
[ирэ гросэ розэнвэнэ ист ундихьт. ди кляпэн шлисэн нихьт мэр рихьтихь]
Ваша большая подкожная вена «протекает»: клапаны плохо закрываются.

Deshalb fließt das Blut zurück nach unten und staut sich im Bein.
[дэсхальп флист дас блют цурюк нах унтэн унт штаут зихь им байн]
Поэтому кровь течёт обратно вниз и застаивается в ноге.

Die tiefen Venen sind in Ordnung. Das ist wichtig, denn sie transportieren fast das ganze Blut.
[ди тифэн вэнэн зинт ин ордунг. дас ист вихьтихь, дэн зи транспортирэн фаст дас ганцэ блют]
Глубокие вены в порядке — это важно, они несут почти всю кровь.

Wir können die kranke Vene von innen mit einem Laser verschließen. Das Blut nimmt dann andere, gesunde Wege.
[виа кёнэн ди кранкэ вэнэ фон инэн мит айнэм лейзэр фэршлисэн. дас блют нимт дан андэрэ, гэзундэ вэгэ]
Больную вену можно закрыть изнутри лазером — кровь пойдёт по здоровым путям.

Der Eingriff dauert etwa eine Stunde und wird in örtlicher Betäubung gemacht.
[дэа айнгриф дауэрт этва айнэ штундэ унт вирт ин ёртлихьэр бэтойбунг гэмахт]
Вмешательство около часа, под местной анестезией.

Danach tragen Sie zwei Wochen einen Kompressionsstrumpf.
[данах трагэн зи цвай вохэн айнэн компрэсьёнсштрумпф]
Потом две недели носите компрессионный чулок.

Besenreiser sind harmlos. Man kann sie veröden, wenn sie Sie stören.
[бэзэнрайзэр зинт хармлёс. ман кан зи фэрёдэн, вэн зи зи штёрэн]
Сосудистые звёздочки безобидны; если мешают — их можно склерозировать.

8 Диалоги

Первичный приём: Herr Gruber (Австрия, на Sie)

Grüß Gott, Herr Gruber. Was führt Sie zu mir?
[грюс гот, хэр грубэр. вас фюрт зи цу миа]
Здравствуйте, господин Грубер. Что вас привело?

Y

Meine Frau sagt, ich habe Krampfadern. Und abends sind die Beine schwer.
[майнэ фрау загт, ихь хабэ крампфадэрн. унт абэндс зинт ди байнэ швэр]
Жена говорит, у меня варикоз. И вечером ноги тяжёлые.

P

Seit wann haben Sie die Beschwerden?
[зайт ван хабэн зи ди бэшвэрдэн]
С каких пор жалобы?

Y

Seit ein paar Jahren. Im Sommer ist es schlimmer. Meine Mutter hatte auch Krampfadern.
[зайт айн паар ярэн. им зомэр ист эс шлимэр. майнэ мутэр хатэ аух крампфадэрн]
Несколько лет. Летом хуже. У мамы тоже был варикоз.

P

Ich schaue mir Ihre Venen jetzt mit Ultraschall an. Bitte stellen Sie sich hin.
[ихь шауэ миа ирэ вэнэн йэцт мит ультрашаль ан. битэ штэлен зи зихь хин]
Сейчас посмотрю ваши вены на УЗИ. Встаньте, пожалуйста.

Y

Die tiefen Venen sind frei. Aber die große Rosenvene links ist undicht, bis unter das Knie.
[ди тифэн вэнэн зинт фрай. абэр ди гросэ розэнвэнэ линкс ист ундихьт, бис унтэр дас кни]
Глубокие вены свободны. Но большая подкожная слева несостоятельна — до уровня ниже колена.

Y

Muss ich operiert werden?
[мус ихь опэрирт вэрдэн]
Мне нужна операция?

P

Es ist keine Notfalloperation. Aber weil Sie Beschwerden haben, empfehle ich eine Behandlung. Am schonendsten ist der Laser.

[эс ист кайнэ нотфальопэрацьён. абэр вайль зи бэшвэрдэн хабэн, эмпфэле ихь айнэ бэхандлунг. ам шонэндстэн ист дэа лейзэр]

Это не срочно. Но раз есть жалобы, советую лечение. Самое щадящее — лазер.

Y

Und bis dahin?

[унт бис дахин]

А пока?

P

Tragen Sie tagsüber Kompressionsstrümpfe, bewegen Sie sich viel und legen Sie abends die Beine hoch.

[трагэн зи таксюбэр компрэсьёнсштрюмпфэ, бэвэгэн зи зихь филь унт легэн зи абэндс ди байнэ хох]

Днём носите компрессионные чулки, больше двигайтесь, вечером поднимайте ноги.

Y

Коротко доложить старшему врачу

Was hat der Herr in Kabine zwei?

[вас хат дэа хэр ин кабинэ цвай]

Что у мужчины во второй кабине?

O

Primäre Stammvarikose der Vena saphena magna links, Stadium III nach Hach, klinisch C3.

[примэрэ штамварикозэ дэа вэна зафэна магна линкс, штадиум драй нах хах, клиниш цэ драй]

Первичный стволовой варикоз БПВ слева, III по Hach, клинически С3.

Y

Tiefe Venen?

[тифэ вэнэн]

Глубокие вены?

O

Beidseits frei durchgängig und komprimierbar.

[байтзайтс фрай дурхьгэнгихь унт компримирбар]

С обеих сторон проходимы и сжимаемы.

Y

Gut. Dann planen wir eine endovenöse Lasertherapie.

[гут. дан планэн виа айнэ эндовэнёзэ лейзэртэрапи]

Хорошо. Тогда планируем ЭВЛК.

O

🩺 Доклад — телеграфом, но в правильном порядке: **диагноз → стадия → глубокие вены**. Именно так строят Befund и Arztbrief (уроки 48, 50, 54).

9 Частые ошибки

~~Ich habe eine Varikose an der Vene.~~

Ich habe Krampfadern am linken Bein.

Varikose — сама болезнь вен; пациент говорит Krampfadern

~~Die Vene ist kaputt.~~

Die Vene ist insuffizient. (пациенту: undicht)

kaputt — про сломанную вещь

~~Wir machen eine Laserung.~~

Wir machen eine endovenöse Lasertherapie.

«лазерование» — калька

~~Die tiefen Venen sind offen.~~

Die tiefen Venen sind frei durchgängig.

«проходимы» — durchgängig

~~Reflux bis Knie.~~

Reflux bis unterhalb des Kniegelenks.

для стадии важно: выше или ниже колена

Пары на слух — сначала как не надо, сразу следом как надо:

Ich habe eine Varikose an der Vene.

[ихь хабэ айнэ варикозэ ан дэр вэнэ]

❌

Ich habe Krampfadern am linken Bein.

[ихь хабэ крампфадэрн ам линкэн байн]

✅

Die Vene ist kaputt.

[ди вэнэ ист капут]

❌

Die Vene ist insuffizient.

[ди вэнэ ист инзуфициэнт]

✅

Wir machen eine Laserung.

[виа махэн айнэ лейзэрунг]

❌ калька

Wir machen eine endovenöse Lasertherapie.

[виа махэн айнэ эндовэнёзэ лейзэртэрапи]

✅

Die tiefen Venen sind offen.

[ди тифэн вэнэн зинт офэн]

❌

Die tiefen Venen sind frei durchgängig.

[ди тифэн вэнэн зинт фрай дурхьгэнгихь]

✅

Reflux bis Knie.

[рэфлюкс бис кни]

❌ неточно

Reflux bis unterhalb des Kniegelenks.

[рэфлюкс бис унтэрхальп дэс книгэленкс]

✅

10 Домашка

1. Определение. Одной фразой по-немецки: что происходит при первичном варикозе?

2. Merke. Когда венозные жалобы лучше и когда хуже?

3. Befund. Запиши: несостоятельность малой подкожной вены справа, рефлюкс до середины голени, глубокие вены проходимы.

4. Пациенту. То же самое — простыми словами, одной-двумя фразами.

5. Своё. Возьми любого пациента со своего приёма и доложи его старшему врачу по-немецки: диагноз, стадия по Hach и CEAP, глубокие вены, что предлагаешь.

Ответы для самопроверки — нажми и послушай:

Bei der primären Varikose schließen die Venenklappen der oberflächlichen Venen nicht mehr.
[бай дэр примэрэн варикозэ шлисэн ди вэнэнкляпэн дэр обэрфлэхьлихьэн вэнэн нихьт мэр]
1. Определение.

Beschwerden besser im Liegen und beim Gehen, schlechter abends und bei Wärme.
[бэшвэрдэн бэсэр им лигэн унт байм гээн, шлехьтэр абэндс унт бай вэрмэ]
2. Merke.

Insuffizienz der Vena saphena parva rechts mit Reflux bis zur Mitte der Wade. Tiefe Venen frei.
[инзуфициэнц дэа вэна зафэна парва рэхьтс мит рэфлюкс бис цур митэ дэр вадэ. тифэ вэнэн фрай]
3. Befund.

Ihre kleine Rosenvene ist undicht. Wir können sie von innen verschließen.
[ирэ кляйнэ розэнвэнэ ист ундихьт. виа кёнэн зи фон инэн фэршлисэн]
4. Пациенту.

📓 Все фразы урока уже в ЗУБРе — колода «Урок 57». Открыть тренажёр →
📘 Связано с уроками 47–51 (фрау Крэмер и ЭВЛК), 52–53 (тромбоз), 54 (Arztbrief).
📚 Источник фактов: Herold, Innere Medizin 2020, разделы «Varikosis» и «Chronisch-venöse Insuffizienz» (с. 821–824). Объяснения, диалоги и примеры — свои.

Урок 57 · B2 · медицина · 21.10.2026 · Varikose und CVI