

## Лекция 6

1

### Взаимное расположение двух прямых на плоскости | плоскостей, заданных общими уравнениями

Пусть

$$l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0,$$

$$l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$$

прямые на плоскости, заданные  
в аффинной системе координат.

$$\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0,$$

$$\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

плоскости в 3-х в-е,  
плоскости заданные в аффинной системе координат.

Тогда

$$\textcircled{1} l_1 \equiv l_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}, \quad \textcircled{1} \pi_1 \equiv \pi_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2},$$

(совпадают)

$$\textcircled{2} l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}, \quad \textcircled{2} \pi_1 \parallel \pi_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2},$$

$$\textcircled{3} l_1 \cap l_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}. \quad \textcircled{3} \pi_1 \cap \pi_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2} \text{ или } \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2} \text{ или } \frac{A_1}{A_2} \neq \frac{C_1}{C_2}.$$

Если система координат прямоугольная, то

$$\textcircled{4} l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 = 0 \quad \textcircled{4} \pi_1 \perp \pi_2 \Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$$

Док-во.

① ( $\Leftarrow$ ) Пусть все коэф-ты уравнений пропорциональны, т.е.

$$A_1 = kA_2, B_1 = kB_2, C_1 = kC_2$$

$$| \quad \text{и} \quad D_1 = kD_2$$

Подставим эти равенства в ур-е

$$l_1: kA_2x + kB_2y + kC_2z = 0 \quad | \quad \pi_1: kA_2x + kB_2y + kC_2z + kD_2 = 0$$

сократим на  $k$ , получим ур-е

$$l_2: A_2x + B_2y + C_2z = 0 \quad | \quad \pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

т.е. все решения 1-го ур-я явл. решениями 2-го ур-я (и наоборот). Это означает

$$l_1 \equiv l_2$$

$$\pi_1 \equiv \pi_2$$


( $\Rightarrow$ ) Пусть  $l_1 \equiv l_2$ . Пусть  $\pi_1 \equiv \pi_2$ .

Не будем дока-ть.


Док-м (2), (3), (4) только для прямых сск. <sup>к-5</sup>  
рас. нормами

$$\vec{n}_1 \{A_1, B_1\} \perp l_1, \\ \vec{n}_2 \{A_2, B_2\} \perp l_2$$


$$\vec{n}_1 \{A_1, B_1, C_1\} \perp \pi_1, \\ \vec{n}_2 \{A_2, B_2, C_2\} \perp \pi_2$$




$$l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1, \vec{n}_2 \text{ коллин.} \Leftrightarrow \text{пропорциональны}$$




$$\pi_1 \parallel \pi_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1, \vec{n}_2 \text{ коллин.} \Leftrightarrow \text{пропорц.}$$




$$l_1 \cap l_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1, \vec{n}_2 \text{ не коллин.} \Leftrightarrow \text{не пропорц.}$$



$$\pi_1 \cap \pi_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1, \vec{n}_2 \text{ не коллин.} \Leftrightarrow \text{не пропорц.}$$



$$l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$$




$$\pi_1 \perp \pi_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$$


распишем скал. произв.




# Взаимное расположение прямых в пространстве, заданных точкой и направляющим вектором




$l_1$  и  $l_2$  скрещиваются  $\Leftrightarrow$  смеш. произв.  $\overrightarrow{M_1 M_2}, \vec{m}_1, \vec{m}_2 \neq 0$   
(т.е.  $\overrightarrow{M_1 M_2}, \vec{m}_1, \vec{m}_2$  не компланарны)



$l_1 \cap l_2 \Leftrightarrow$  1)  $\overrightarrow{M_1 M_2}, \vec{m}_1, \vec{m}_2 = 0$   
(т.е.  $\overrightarrow{M_1 M_2}, \vec{m}_1, \vec{m}_2$  компланарны) и  
2)  $\vec{m}_1$  и  $\vec{m}_2$  не коллинеарны.



$l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow$  1)  $\vec{m}_1$  и  $\vec{m}_2$  коллин. и  
2)  $\overrightarrow{M_1 M_2}$  и  $\vec{m}_1$  (или  $\overrightarrow{M_1 M_2}$  и  $\vec{m}_2$ )  
не коллинеарны




$l_1 \equiv l_2 \Leftrightarrow \overrightarrow{M_1 M_2}, \vec{m}_1, \vec{m}_2$   
(совпадают) коллинеарны.

## Условие принадлежности двух прямых одной плоскости

$l_1$  и  $l_2$  лежат в одной пл.  $\Leftrightarrow \overrightarrow{M_1 M_2}, \vec{m}_1, \vec{m}_2 = 0$   
(т.е.  $\overrightarrow{M_1 M_2}, \vec{m}_1, \vec{m}_2$  компланарны)


Рисунки — это три последних рисунка)

Взаимное расположение прямой, заданной точкой и направл. вектором, и плоскости, заданной общим уравнением, в прямоугольной системе координат




$$l \cap \pi \Leftrightarrow Aa + Bb + Cc \neq 0$$

(т.е.  $\vec{n} \vec{m} \neq 0$ )



$$l \parallel \pi \Leftrightarrow \begin{aligned} &1) Aa + Bb + Cc = 0 \\ &\text{(т.е. } \vec{n} \vec{m} = 0) \text{ и} \\ &2) Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0 \\ &\text{(т.е. } M_0 \notin \pi) \end{aligned}$$



$$l \subset \pi \Leftrightarrow \begin{aligned} &1) Aa + Bb + Cc = 0 \\ &\text{(т.е. } \vec{n} \vec{m} = 0) \text{ и} \\ &2) Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0 \\ &\text{(т.е. } M_0 \in \pi) \end{aligned}$$

(прямая лежит в плоскости)

Зам. Верно в произвольной аффинной системе координат.




# Расстояние от точки


до прямой  
на плоскости,

до плоскости,

заданной общим уравнением в  
прямоугольной системе координат.



$$\rho(M_0, l) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$



$$\rho(M_0, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

## Доказательство (для плоскости; для прямой аналог)

1)  $\rho(M_0, \pi) = |\vec{HM}_0|$ , где  $\vec{HM}_0 = \{x_0 - x_H, y_0 - y_H, z_0 - z_H\}$ .

Рас. нормаль  $\vec{n} \{A, B, C\}$ .

Возможны 2 случая:  $\vec{n} \uparrow \vec{HM}_0$  и  $\vec{n} \downarrow \vec{HM}_0$ .

Найдём  $\vec{n} \cdot \vec{HM}_0 = |\vec{n}| \cdot |\vec{HM}_0| \cos(\angle \vec{n}, \vec{HM}_0) = \pm |\vec{n}| |\vec{HM}_0|$

След.,  $|\vec{n} \cdot \vec{HM}_0| = |\vec{n}| |\vec{HM}_0|$   $0^\circ \text{ или } 180^\circ$

модуль скал. произв.

Выразим  $|\vec{HM}_0| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{HM}_0|}{|\vec{n}|}$

2) Знаменатель  $|\vec{n}| = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$ .

3) Числитель:  $\vec{n} \cdot \vec{HM}_0 = A(x_0 - x_H) + B(y_0 - y_H) + C(z_0 - z_H) =$   
 $= Ax_0 + By_0 + Cz_0 - (Ax_H + By_H + Cz_H) = Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D.$   
 $-D \text{ т.к. } H \in \pi (\Rightarrow Ax_H + By_H + Cz_H + D = 0)$

4) Подставим 2), 3) в 1),  
получим треб. формулу.

ч.т.д.

### Следствие

Расстояние между параллельными  
прямыми напл, | плоскостями,  
заданными общими ур-ми в  
прямоугольной системе координат.

$$\frac{Ax + By + C_1 = 0}{l_1}$$

$$\frac{Ax + By + C_2 = 0}{l_2}$$

$$\rho(l_1, l_2) = \frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$\frac{Ax + By + Cz + D_1 = 0}{\pi_1}$$


$$\frac{Ax + By + Cz + D_2 = 0}{\pi_2}$$

$$\rho(\pi_1, \pi_2) = \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

(без док-ва)



# Расстояние от точки до прямой в пространстве в декарт. сист. координат



$$r(M_0, L) = \frac{|\overrightarrow{M_1 M_0} \times \vec{m}|}{|\vec{m}|} =$$

$$= \frac{\sqrt{\left| \begin{vmatrix} y_0 - y_1 & z_0 - z_1 \\ c & c \end{vmatrix} \right|^2 + \left| \begin{vmatrix} x_0 - x_1 & z_0 - z_1 \\ a & c \end{vmatrix} \right|^2 + \left| \begin{vmatrix} x_0 - x_1 & y_0 - y_1 \\ a & b \end{vmatrix} \right|^2}}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Док-во.

1) Рас. параллелограмма, построенного на  $\overrightarrow{M_1 M_0}$  и  $\vec{m}$ .

Площа  $r(M_0, L) = h$  высота паралл-ма.  
Найдём

$$h = \frac{S_{\text{паралл-ма на } \overrightarrow{M_1 M_0}, \vec{m}}}{|\vec{m}|} = \frac{|\overrightarrow{M_1 M_0} \times \vec{m}|}{|\vec{m}|}$$

2) Знаменатель:  $|\vec{m}| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$


3) Числитель:  $\overrightarrow{M_1 M_0} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_0 - x_1 & y_0 - y_1 & z_0 - z_1 \\ a & b & c \end{vmatrix} =$

$$= \begin{vmatrix} y_0 - y_1 & z_0 - z_1 \\ b & c \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} x_0 - x_1 & z_0 - z_1 \\ a & c \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} x_0 - x_1 & y_0 - y_1 \\ a & b \end{vmatrix} \vec{k} \Rightarrow |\overrightarrow{M_1 M_0}| = \sqrt{\text{сумма квадратов координат}}$$

4) Подставим 2), 3) в 1).

Ч.т.д.

# Расстояние между скрещивающимися прямыми в пространстве в декартовой системе координат.



$$\rho(l_1, l_2) = \frac{|\vec{M_1M_2} \vec{m_1} \vec{m_2}|}{|\vec{m_1} \times \vec{m_2}|} = \frac{\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\sqrt{|\vec{b_1} \vec{c_1}|^2 + |\vec{a_1} \vec{c_1}|^2 + |\vec{a_1} \vec{b_1}|^2}}$$

Док-во. 1) Рас. параллелепипеда, построенного на  $\vec{M_1M_2}, \vec{m_1}, \vec{m_2}$ .

Пусть  $\pi_1$  и  $\pi_2$  — плоскости нижнего и верхнего оснований (см. рис.). Тогда  $\rho(l_1, l_2) = \rho(M_2, \pi_1) = h$  параллелепипеда на  $\vec{M_1M_2}, \vec{m_1}, \vec{m_2}$ .

Найдём  $h = \frac{V_{\text{паралл-да на } \vec{M_1M_2}, \vec{m_1}, \vec{m_2}}}{S_{\text{парал-да на } \vec{m_1}, \vec{m_2}}} = \frac{|\vec{M_1M_2} \vec{m_1} \vec{m_2}|}{|\vec{m_1} \times \vec{m_2}|}$

2) Числитель:  $|\vec{M_1M_2} \vec{m_1} \vec{m_2}| = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}$ .

3) Знаменатель:  $\vec{m_1} \times \vec{m_2} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = |\vec{b_1} \vec{c_1}| \vec{i} - |\vec{a_1} \vec{c_1}| \vec{j} + |\vec{a_1} \vec{b_1}| \vec{k}$ ,  
 $|\vec{m_1} \times \vec{m_2}| = \sqrt{\text{сумма квадратов координат}}$

4) Подставим 2), 3) в 1). Ч.т.д.



# Угол между

прямыми на пл. | плоскостями,

для которых известны нормальные векторы  
в декарт. системе координат



Пусть  $\alpha$  - искомый угол.

Тогда  $\cos \alpha = |\cos(\vec{n}_1, \vec{n}_2)| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} =$

$$= \frac{|A_1 A_2 + B_1 B_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2}} \quad \left| \quad = \frac{|A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}} \right.$$

(в декарт. системе координат).

Док-ю (не нужно).



$$\cos \alpha = \begin{cases} \cos(\vec{n}_1, \vec{n}_2) & \text{в Сл.1} \\ \cos(180^\circ - (\vec{n}_1, \vec{n}_2)) = -\cos(\vec{n}_1, \vec{n}_2) & \text{в Сл.2} \end{cases}$$

где

Сл.1 - угол острый или прямой,

Сл.2 - угол тупой.

$\cos(\vec{n}_1, \vec{n}_2) \geq 0$

$\cos(\vec{n}_1, \vec{n}_2) < 0$



Ч.т.д.

Угол между прямыми  
(на плоскости или в пространстве)  
для которых известны направляющие  
векторы. В премах. сист. к-т.

Пусть  $\alpha$  - искомый угол.

Тогда  $\cos \alpha = |\cos(\vec{m}_1, \vec{m}_2)| = \frac{|\vec{m}_1 \cdot \vec{m}_2|}{|\vec{m}_1| |\vec{m}_2|}$

Док-во (не нужно).



$$\cos \alpha = \begin{cases} \cos(\vec{m}_1, \vec{m}_2) & \text{в сл. 1} \\ \cos(180^\circ - (\vec{m}_1, \vec{m}_2)) = -\underbrace{\cos(\vec{m}_1, \vec{m}_2)}_{\substack{< 0 \\ > 0}} & \text{в сл. 2} \end{cases} =$$

$$= |\cos(\vec{m}_1, \vec{m}_2)|$$



Ч.т.д.



Угол между прямой в пр-ве, для которой известен направляющий вектор, и плоскостью, для которой известна нормаль, в премоу. сист. к-т.

Пусть  $\alpha$ -искомый угол (он равен углу между прямой и её проекцией на плоскость).

$$\text{Потому } \sin \alpha = |\cos(\vec{n}, \vec{m})| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{m}|}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{|Aa + Bb + Cc|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \quad (\text{в премоу. сист. к-т})$$



Док-во. Пусть  $\beta$ -угол между  $\vec{n}$  и  $\vec{m}$ .  
(не нужно) Тогда

$$\sin \alpha = \begin{cases} \sin(\frac{\pi}{2} - \beta), & \text{если } \beta \text{ острый или тупой} \\ \sin(\beta - \frac{\pi}{2}), & \text{если } \beta \text{ тупой} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \cos \beta \\ -\cos \beta \end{cases} = |\cos \beta| = |\cos(\vec{n}, \vec{m})| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{m}|}{|\vec{n}| |\vec{m}|}$$

ч.т.д.