

TD3: StabilitéExercice 1:

Étudier la stabilité au sens de Von Neumann du θ -schéma:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - (1-\theta) \nu \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta x^2} - \theta \nu \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{\Delta x^2} = 0 \quad (*)$$

On injecte un mode de Fourier : $u_j^n = \hat{a}(\xi) e^{2i\pi j \Delta x \xi}$, $\omega = j \Delta x \xi$

$$(*) \Leftrightarrow \frac{\hat{a}^{n+1}(\xi) e^{2i\pi j \Delta x \xi} - \hat{a}^n(\xi) e^{2i\pi j \Delta x \xi}}{\Delta t} - (1-\theta) \nu \frac{\hat{a}^n(\xi) e^{2i\pi j \Delta x \xi} - 2\hat{a}^n(\xi) e^{2i\pi j \Delta x \xi} + \hat{a}^n(\xi) e^{2i\pi j \Delta x \xi}}{\Delta x^2} - \theta \nu \frac{\hat{a}^{n+1}(\xi) e^{2i\pi j \Delta x \xi} - 2\hat{a}^{n+1}(\xi) e^{2i\pi j \Delta x \xi} + \hat{a}^{n+1}(\xi) e^{2i\pi j \Delta x \xi}}{\Delta x^2} = 0$$

on divise par ce terme ($\hat{a}(\xi) \neq 0$)

On pose : $\sigma = \frac{\nu \Delta t}{\Delta x^2}$

En supposant $\hat{a}(\xi) \neq 0$, $\forall \xi \in \mathbb{R}$, on a :

$$\hat{a}(\xi) - 1 - (1-\theta)\sigma \left(e^{2i\pi \xi \Delta x} - 2 + e^{-2i\pi \xi \Delta x} \right) - \theta \sigma \hat{a}(\xi) \left(e^{2i\pi \xi \Delta x} - 2 + e^{-2i\pi \xi \Delta x} \right) = 0$$

$$= 2 \cos(2\pi \xi \Delta x) - 2$$

$$= 2(-2 \sin^2(\pi \xi \Delta x))$$

$$= -4 \sin^2(\pi \xi \Delta x) \ll 0$$

d'où :

$$\hat{a}(\xi) (1 - 4\theta \sigma \sin^2(\pi \xi \Delta x)) = 1 - 4(1-\theta)\sigma \sin^2(\pi \xi \Delta x)$$

$$\hat{a}(\xi) = \frac{1 - 4(1-\theta)\sigma \sin^2(\pi \xi \Delta x)}{1 - 4\theta \sigma \sin^2(\pi \xi \Delta x)} \in \mathbb{R} \quad |\hat{a}(\xi)| \leq 1, \forall \xi$$

Prenons : $\alpha (= \alpha(\xi)) := 4\sigma \sin^2(\pi \xi \Delta x) \in [0, 4\sigma]$

de sorte à ce que : $\hat{a}(\xi) = \frac{1 - (1-\theta)\alpha}{1 + \theta\alpha}$

et on veut $|\hat{a}(\xi)| \leq 1, \forall \xi \in \mathbb{R}$

ie $\forall \alpha \in [0, 4\sigma]$

Comme $\hat{a}(\xi) \in \mathbb{R}$, la condition est : $-1 \leq \hat{a}(\xi) \leq 1 \leftarrow \text{Vrai} \checkmark$

De plus : $\begin{cases} 1 - (1-\theta)\alpha \leq 1 \\ 1 + \theta\alpha \geq 1 \end{cases} \Rightarrow \frac{1 - (1-\theta)\alpha}{1 + \theta\alpha} \leq 1$

$$\begin{aligned} -1 &\leq \hat{a}(\xi) \\ \Leftrightarrow -1 &\leq \frac{1 - (1-\theta)\alpha}{1 + \theta\alpha} \\ \Leftrightarrow -1 &\leq \frac{1 - \alpha + \theta\alpha}{1 + \theta\alpha} \\ \Leftrightarrow -1 &\leq 1 - \frac{\alpha}{1 + \theta\alpha} \end{aligned}$$

Si $\theta \in [\frac{1}{2}, 1]$, $(2\theta - 1)\alpha \geq 0 \geq -2$.

Stabilité inconditionnelle

Si $\theta \in [0, \frac{1}{2}[$, $(2\theta - 1)\alpha \geq -2$

$$\Leftrightarrow (1 - 2\theta)\alpha \leq 2$$

$$\Leftrightarrow 4\sigma \sin^2(\pi \xi \Delta x) = \alpha \leq \frac{2}{1 - 2\theta}, \forall \xi \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Delta t}{\Delta x^2} = \sigma \leq \frac{1}{2(1 - 2\theta)} \quad \text{CFL si } \theta \in [0, \frac{1}{2}]$$

$\xrightarrow{\theta \rightarrow \frac{1}{2}} +\infty$

EXERCICE 2: Stabilité du schéma de Crank-Nicolson pour l'équation

d'advection ($V \neq 0, \nu = 0$):

vitesse d'advection \nearrow
 \emptyset diffusion

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + \frac{1}{2} V \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2\Delta x} + \frac{1}{2} V \frac{u_{j+1}^{n+1} - u_{j-1}^{n+1}}{2\Delta x} = 0$$

On injecte un mode Fourier (ξ), $u_j^n = a^n(\xi) e^{\frac{2i\pi \xi j \Delta x}{\Delta x}}$ et on pose: $\sigma = \frac{V\Delta t}{\Delta x}$, ainsi:

$$\frac{a^n(\xi) e^{2i\pi \xi j \Delta x} - a^n(\xi) e^{2i\pi \xi (j-1) \Delta x}}{\Delta t} + \frac{1}{2} V \frac{a^n(\xi) e^{2i\pi \xi (j+1) \Delta x} - a^n(\xi) e^{2i\pi \xi (j-1) \Delta x}}{2\Delta x} + \frac{1}{2} V \frac{a^{n+1}(\xi) e^{2i\pi \xi (j+1) \Delta x} - a^{n+1}(\xi) e^{2i\pi \xi (j-1) \Delta x}}{2\Delta x} = 0$$

on divise par: $\frac{1}{\Delta t} a^n(\xi) e^{2i\pi \xi (j-1) \Delta x}$, avec $|a(\xi)| \neq 0$.

d'où:

$$a(\xi) - 1 + \frac{1}{2} \sigma i \sin(2\pi \xi \Delta x) + a(\xi) \frac{1}{2} \sigma i \sin(2\pi \xi \Delta x) = 0$$

$$\Rightarrow a(\xi) \left(1 - \frac{1}{2} \sigma i \sin(2\pi \xi \Delta x) \right) = 1 - \frac{1}{2} \sigma i \sin(2\pi \xi \Delta x)$$

$$a(\xi) = \frac{1 - \frac{1}{2} \sigma i \sin(2\pi \xi \Delta x)}{1 + \frac{1}{2} \sigma i \sin(2\pi \xi \Delta x)} = 1 \quad \leftarrow \quad \left| \frac{z}{\bar{z}} \right| = \frac{|z|}{|\bar{z}|} = \frac{|z|}{|z|} = 1$$

$\Rightarrow |a(\xi)| = 1, \xi \in \mathbb{R}$ On a donc stabilité inconditionnelle.

EXERCICE 3:

1) Schéma Leapfrog (chaleur, $\nu > 0$):

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2\Delta t} - \nu \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta x^2} = 0$$

DF (différences finies) centrée
 en temps (consistance améliorée)

On injecte un mode de Fourier (ξ), $u_j^n = a^n(\xi) e^{2i\pi \xi j \Delta x}$, $\xi \in \mathbb{R}$.

$$\frac{a^{n+1}(\xi) e^{2i\pi \xi j \Delta x} - a^{n-1}(\xi) e^{2i\pi \xi j \Delta x}}{2\Delta t} - \nu \frac{a^n(\xi) e^{2i\pi \xi (j+1) \Delta x} - 2a^n(\xi) e^{2i\pi \xi j \Delta x} + a^n(\xi) e^{2i\pi \xi (j-1) \Delta x}}{\Delta x^2} = 0$$

Supposons $a(\xi) \neq 0, \xi \in \mathbb{R}$, ainsi on divise par $a^n(\xi) e^{2i\pi \xi (j-1) \Delta x}$.

On a:

$$\frac{a^2 - 1}{2\Delta t} - \nu a \frac{e^{2i\pi \xi \Delta x} - 2 + e^{-2i\pi \xi \Delta x}}{\Delta x^2} = 0 \Rightarrow a^2 - 1 - 2\nu \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (2\cos(2\pi \xi \Delta x) - 1) = 0$$

$$a^2 + 8\nu \sin^2(\pi \xi \Delta x) - 1 = 0$$

$$\Delta = 8^2 \nu^2 \sin^4(\pi \xi \Delta x) + 4 > 0 \Rightarrow \exists 2 \text{ solutions } a_1(\xi), a_2(\xi) \neq 0 \text{ tq } |a_1(\xi)| \leq 1, \forall i \in \mathbb{Z}, \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_1(\xi) + a_2(\xi) = -8\nu \sin^2(\pi \xi \Delta x) \neq 0 \text{ (en général)} \\ a_1(\xi) a_2(\xi) = \frac{1}{-1} = -1 \end{cases}$$

$\Rightarrow |a_1(\xi)| = |a_2(\xi)| = 1$ ce serait le cas ± 1 racines mais alors la somme serait nulle.
 on n'a pas

\Rightarrow au moins une des 2 est de $|1| > 1$: JAMAIS de stabilité.

Rappel: on doit avoir les 2 racines de module ≤ 1 . cf relat° de récurrence linéaire

sur $\hat{u}^n(\xi)$, $\xi \in \mathbb{R}$, en appliquant la TF au schéma discret:

$$\hat{u}^{n+1}(\xi) - \hat{u}^{n-1}(\xi) - \nu \frac{\hat{u}^n(\xi + \Delta x) - 2\hat{u}^n(\xi) + \hat{u}^n(\xi - \Delta x))}{\Delta x^2} = 0$$

$$\stackrel{\text{TF}}{\Rightarrow} \frac{\hat{u}^{n+1}(\xi) - \hat{u}^{n-1}(\xi)}{2\Delta t} - \nu \frac{\hat{u}^n(\xi)(e^{-i\xi\Delta x} - 2 + e^{i\xi\Delta x})}{\Delta x^2} = 0$$

D'où la récurrence linéaire de longueur 2 en $\hat{u}^n(\xi)$

$$\hat{u}^{n+2}(\xi) - \hat{u}^n(\xi) + 8\nu \sin^2(\pi \xi \Delta x) \hat{u}^{n+1}(\xi) = 0$$

$$\hat{u}^n(\xi) = \alpha a_1^n(\xi) + \beta a_2^n(\xi)$$

où $a_1(\xi)$ et $a_2(\xi)$ sont les 2 racines $\neq 1$ ($\Delta \neq 0 \dots$)

de l'équation caractéristique

$$r^2 + 8\nu \sin^2(_) \cdot r - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{matrix} |a_1(\xi)| \leq 1 \\ |a_2(\xi)| \leq 1 \end{matrix}, \forall \xi \in \mathbb{R}.$$