TEMEL EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEBİ

2026-2027

SAYISAL BÖLÜM

LGS

1. DENEME

ADI VE SOYADI

OKUL ADI

ADAYIN İMZASI

ADAYIN DİKKATİNE!

1. Bu sınavda Matematik (20 soru) - Fen Bilimleri (20 soru) olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır.
2. Sınavın süresi 80 dakikadır.
3. Deneme ekim ayı sonuna kadar olan konuları kapsamaktadır.

MEBİ

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığının yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta **40 soru** bulunmaktadır.

Matematik Testi: 20 soru

Fen Bilimleri Testi: 20 soru

2. Bu sınav için verilen cevaplama süresi **80 dakikadır** (1 saat 20 dakika).

3. Bu sınavda her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının üçte biri çıkarılacak ve kalan sayı o bölümle ilgili ham puanınız olacaktır.

4. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

5. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

6. Bu kitapçıkta yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Cevap kâğıdında bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

1. a ve b birer tam sayı olmak üzere, 2^a ifadesinin değeri 5^{-2} ifadesinin değerinden küçük, 5^b ifadesinin değeri ise 3^{-3} ifadesinin değerinden büyüktür.

Buna göre, a'nın en büyük ve b'nin en küçük değeri için a^b ifadesinin değeri kaçtır?

A) $-\frac{1}{64}$ B) $-\frac{1}{125}$ C) $\frac{1}{25}$ D) $\frac{1}{16}$

2. Bir tabletin modemden aldığı sinyal gücü, modeme olan uzaklığı arttıkça azalmaktadır.

Bir odada bulunan aynı özelliklere sahip P, R, S ve T tabletlerinin modeme olan uzaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo: Tabletlerin Modeme Olan Uzaklıkları

Tablet Adı	Uzaklık (m)
P	$5\sqrt{3}$
R	$4\sqrt{5}$
S	$2\sqrt{19}$
T	$6\sqrt{2}$

Tabletlerin, aldıkları sinyal gücüne göre küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) T < P < S < R B) R < P < S < T
C) T < S < P < R D) R < S < P < T

3. Kapasitesi 20 000 ml olan bir kovada bulunan sıvı, 420 ml'lik veya 600 ml'lik kaplarla tam olarak ölçülebilmektedir.

Buna göre, bu kovadaki sıvı miktarı en fazla kaç litredir?

A) 12,6 B) 16,8 C) 18,4 D) 19,2

4. a ve b 1'den farklı doğal sayılar olmak üzere, $\sqrt{648}$ sayısı $a\sqrt{b}$ şeklinde yazılacaktır.

a ve b aralarında asal olduğuna göre, a + b işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 17 B) 20 C) 24 D) 164

5. Bir telefon uygulaması, dosyaların boyutlarını gerçek boyutunun $\frac{1}{4}$'üne düşürerek depolamaktadır.

Aşağıdaki tabloda dört kişinin telefonundaki dosyaların gerçek boyutları ve depolama boyutları verilmiştir.

Tablo: Dosyaların Gerçek ve Depolama Boyutları

Kişiler	Gerçek Boyutu (KB)	Depolama Boyutu (KB)
Aylin	16^3	8^4
Çağrı	8^5	4^6
Efe	4^8	8^4
Rana	8^4	32^2

Buna göre, tablodaki kişilerden hangisi bu uygulamayı kullanmıştır?

A) Aylin B) Çağrı C) Efe D) Rana

6. Bir zekâ küpü yarışmasında dört öğrencinin, küpü saniye cinsinden çözme sürelerinin çözümlenmiş şekli aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo: Öğrencilerin Zekâ Küpünü Çözme Süreleri

Öğrenci	Süre (sn.)
Doruk	$6 \cdot 10^0 + 5 \cdot 10^{-2}$
Ece	$6 \cdot 10^0 + 4 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-2}$
Furkan	$6 \cdot 10^0 + 8 \cdot 10^{-2}$
Gökçe	$6 \cdot 10^0 + 1 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-2}$

Buna göre, zekâ küpünü <u>en kısa</u> sürede çözen öğrenci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doruk B) Ece C) Furkan D) Gökçe

7. Aşağıda 1'den 64'e kadar numaralandırılmış birim karelerden oluşan kare biçiminde bir parkur görseli verilmiştir.


1	2	3	4	5	6	7	8
16	15					10	9
64	63						

1 numaralı kareden başlayıp 64 numaralı kareye kadar sırasıyla ilerleyen bir robot, bulunduğu karedeki sayı tam kare değilse sadece 1 kez, tam kare ise o sayının karekökünün değeri kadar sayıda sinyal vermektedir.

Buna göre, parkuru tamamladığında robot toplam kaç kez sinyal verir?

A) 84 B) 92 C) 100 D) 108

8. Bazı dilimlerinin üzerinde sayıların yazılı olduğu sekiz eş dilime ayrılmış bir daire aşağıda verilmiştir.




Bu dairede yan yana bulunan daire dilimlerindeki sayılar aralarında asal olacak şekilde boş bırakılan dilimlerin her birine iki farklı asal çarpanı bulunan birer doğal sayı yazılacaktır.

Buna göre, boş dilimlere yazılacak sayıların toplamı <u>en az</u> kaçtır?

A) 126 B) 136 C) 170 D) 200

9. Aşağıda uzunlukları ve fiyatları gösterilen kırmızı, mavi ve sarı renkli bantlardan yeterli sayıda verilmiştir.



Aynı renkteki bantlar uç uca eklenerek eşit uzunlukta iki farklı şerit elde edilecektir.

Elde edilecek şeritler 1 m'den uzun olduğuna göre, bu iki şerit için toplam maliyet en az kaç Türk lirası olur?

A) 72 B) 76 C) 93 D) 98

10. Fabrikaların doğaya saldığı yıllık karbon gazı miktarını inceleyen bir gözlemci, dört fabrikanın karbon salınımını ölçmüş ve aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur.


Tablo: Fabrikaların Yıllık Karbon Gazı Salınımları

Fabrika	Karbon Gazı Miktarı (kg)
K	$0{,}123 \cdot 10^9$
L	$0{,}384 \cdot 10^8$
M	$27{,}8 \cdot 10^6$
N	$0{,}0256 \cdot 10^9$

Buna göre, en fazla ve en az karbon salınımı yapan fabrikalar aşağıdakilerden hangisidir?

A) K ve M B) L ve M C) K ve N D) L ve N

11. Bir festival için tasarlanan aşağıdaki dev ekran yatayda 32, dikeyde ise 25 adet eş kare modülün boşluksuz dizilmesiyle oluşturulmuştur.




Bu modüllerden birinin içinde her biri 1 saniyede 125^5 nanojul enerji tüketen 1024 adet piksel bulunmaktadır.

Buna göre, ekranın 1 saniyede tükettiği toplam enerjinin joule cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? (1 Jul = 10^9 nanojul)

A) $2{,}5 \cdot 10^5$ B) $2{,}5 \cdot 10^7$ C) $25 \cdot 10^6$ D) $25 \cdot 10^{24}$

12. Aşağıda uzun kenar uzunluğu 90 m olan dikdörtgen şeklindeki futbol sahası verilmiştir.



Sahanın ortasında yer alan daire biçimindeki bölümünün alanı 252 m^2 olup penaltı noktasının bu daireye en yakın mesafesi 25 m'dir.

Buna göre, aynı yarı saha içerisinde bulunan penaltı noktası ile kale çizgisi arasındaki metre cinsinden uzaklık hangi tam sayıya daha yakındır? (π yerine 3 alınız.)

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14

13. Bir grafik tasarım programında; logo, metin, zemin ve bağlantı olmak üzere dört farklı bölümden oluşan bir afiş hazırlanmıştır. Bölümlerin piksel yoğunluğuna bağlı veri boyutları aşağıda gösterilmiştir.



Tablo: Bölümlerin Boyutları


Katman	Boyut (Bayt)
Logo	16^5
Metin	4^{10}
Zemin	32^4
Bağlantı	8^7

Tasarımcı veri boyutlarını incelediğinde üç bölümün veri boyutunun birbirine eşit, bir bölümün veri boyutunun ise diğerlerinden farklı olduğunu görmüştür.

Buna göre, veri boyutu farklı olan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Logo B) Metin C) Zemin D) Bağlantı

14. Aşağıda uzunluğu $12\sqrt{5}$ cm olan, esnemeyen bir ip verilmiştir.



Bu ip, kenar uzunluğu santimetre cinsinden tam sayı olan karenin çevresi boyunca bir tam tur sarıldığında bir miktar ip artmıştır.


Buna göre, artan parçanın santimetre cinsinden uzunluğu aşağıda verilen hangi ardışık iki doğal sayı arasında olabilir?

A) 4 ile 5 B) 5 ile 6 C) 6 ile 7 D) 7 ile 8

15. Aşağıda ayrıt uzunlukları verilen küp biçimindeki S, M ve L kolilerinden yeterli sayıda vardır.




Bu koliler kullanılarak her biri yalnızca tek tür koliden oluşan üç kule yapılmıştır. S ve M kolilerinden oluşturulan kulelerin yükseklikleri eşittir. Bu iki kuleden daha yüksek olacak şekilde, en az sayıda L kolisi kullanılarak oluşturulan kulenin yüksekliği ise bu iki kuleden x cm daha uzundur.



Buna göre, x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

A) 6 B) 7 C) 9 D) 10

16. Bir spor salonunda 1'den 60'a kadar numaralanmış dolaplar aşağıda gösterilmiştir.



Mert'in dolap numarası, 60 sayısının kendisi hariç en büyük iki pozitif tam sayı çarpanının toplamına eşittir. Ecrin'in dolap numarası ise Mert'in dolap numarasından küçüktür ve iki adet asal çarpanı vardır.

Mert ve Ecrin'in dolap numaraları aralarında asal olduğuna göre, Ecrin'in dolap numarasının alabileceği kaç farklı değer vardır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

17. Kütlesi gram cinsinden üç basamaklı doğal sayı olan bir baharat paketi, biri diğerinden 1 gram fazla tartan iki tartıda aşağıdaki gibi tartılmıştır.



1. Tartı



2. Tartı

a, b ve c tam sayılar olmak üzere, paketin kütlesi 1. tartıda $(2^a \cdot 3^b)$ gram, 2. tartıda ise $(5^c \cdot 13)$ gram olarak ölçülmüştür.

Tartılardan biri doğru ölçüm yaptığına göre, a + b + c işleminin sonucu kaçtır?


A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

18. Origami bir kâğıt katlama sanatıdır.

Arda, kısa kenar uzunluğu 2^{20} birim ve uzun kenarı kısa kenarının 1,5 katı olan arka yüzü mavi dikdörtgen biçiminde bir kâğıt kullanarak origami ile uçak yapmak istemektedir.



Arda'nın uçağı yaparken uyguladığı ilk 5 adım aşağıda gösterilmiştir.




- 1. adımda uzun kenarları üst üste gelecek şekilde kâğıdı katlamış, tekrar açtığında kat çizgisi oluştuğunu görmüştür.
- 2. adımda kısa kenarının katlama sonucu oluşan parçaları, kat çizgisiyle çakışacak biçimde katlamıştır.
- 3. adımda oluşan üçgen kısmı, tabanı boyunca aşağıya doğru katlamıştır.
- 4 ve 5. adımda ise kâğıdı ok yönünde şekildeki gibi katlamıştır.

Buna göre, 5. adımda elde edilen dörtgen biçimindeki kâğıdın görünen yüzünün alanı kaç birimkaredir?

A) $3 \cdot 2^{36}$ B) $3 \cdot 2^{37}$ C) $6 \cdot 2^{37}$ D) $6 \cdot 2^{38}$

19. Kenar uzunlukları verilen mavi, yeşil ve sarı renkli kare biçiminde kâğıtlar aşağıda gösterilmiştir.




Bu karelerden mavi olan en küçük, sarı olan ise en büyük alana sahiptir.


x ve y tam sayı olmak üzere, x + y işleminin sonucu en fazla kaçtır?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13

20. Alanı 12^{10} birimkare olan kare şeklindeki karton, kenar uzunlukları 1 birimden büyük ve aralarında asal olacak şekilde en az sayıda eş dikdörtgen parçalara aşağıdaki gibi ayrılmıştır.



Elde edilen bu parçalar, uzun kenarları çakıştırılarak aşağıdaki gibi dikdörtgen biçiminde bir yapı oluşturulmuştur.



Buna göre, bu yapının uzun kenar uzunluğu kaç birimdir?

A) 24^{10} B) 48^{5} C) 24^{5} D) 6^{10}

1. Aşağıda nükleotidleri oluşturan yapılar, numaralar ile verilmiştir.

Numara	Şekil	Temsil Ettiği Yapı
1		Adenin bazı
2		Timin bazı
3		Guanin bazı
4		Sitozin bazı
5		Fosfat
6		Deoksiriboz şekeri

Tüm organik bazlar kullanılarak oluşturulan hatasız bir DNA molekülü için,

I. En fazla sayıda kullanılanlar 5 ve 6 numaralı yapılardır.
II. DNA molekülünde kullanılan 5 numaralı yapının sayısı, 1 ve 2 numaralı yapıların sayıları toplamına eşittir.
III. DNA molekülünün bir zincirinde kullanılan 3 numaralı yapının sayısı, aynı zincirde bulunan 4 numaralı yapının sayısına eşittir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

2. Adli vakalarda olay yerinden toplanan biyolojik delillerin kaynağının tespit edilmesi amacıyla olayla ilgisi olabilecek kişi ya da kişilerden (mağdur, şüpheli, vb.) biyolojik örnek (kan, tükürük vb.) alınarak karşılaştırma yapılmaktadır. Bu karşılaştırmaya DNA analizi denir. Suçlu dışındaki kişilerden elde edilen DNA analizi sonuçları ile olay yerinden elde edilen sonuçların aynı olma olasılığı, kişiler tek yumurta ikizi değilse imkânsızdır.

DNA analizi ile suçlu tespitinin temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) DNA'daki nükleotid sayısının her insanda farklı olması
B) DNA'daki gen sayısının her insanda farklı olması
C) DNA'daki nükleotid diziliminin her insanda farklı olması
D) DNA'daki nükleotid çeşidinin her insanda farklı olması

3. Bezelye bitkisinin tohum şekli karakteri ile ilgili özellikler tabloda verilmiştir.

Bezelye Genotipi	Bezelye Fenotipi
AA	Düz tohumlu
Aa	Düz tohumlu
aa	Buruşuk tohumlu

Buna göre aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?


A) Düz tohumlu bezelyeler birbiriyle çaprazlandığında buruşuk tohumlu bezelye oluşma ihtimali yoktur.

B) Aa genotipli bezelye ile aa genotipli bezelye çaprazlanırsa oluşan 80 bezelyenin tamamı buruşuk tohumlu olabilir.

C) Buruşuk tohumlu bezelyeler birbiriyle çaprazlanırsa düz tohumlu bezelyeler oluşmaz.

D) AA genotipli bezelye ile aa genotipli bezelye çaprazlandığında oluşabilecek bezelyelerin tamamı düz tohumlu olur.

4. Bir karakterin kalıtımını anlamak isteyen öğrenci, uzun ve kısa çubukları kullanarak çaprazlamalar yapıyor.



Uzun çubuklar baskın alelleri, kısa çubuklar çekinik alelleri temsil ettiğine göre öğrencinin yapacağı çaprazlamalarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?


A) Genotipinde 1 ve 3 numaralı alelleri bulunduran birey ile 2 ve 4 numaralı alelleri bulunduran birey çaprazlanırsa oluşabilecek bireylerin saf döl olma ihtimali %50'dir.

B) Genotipinde 1 ve 2 numaralı alelleri bulunduran birey ile 3 ve 4 numaralı alelleri bulunduran birey çaprazlanırsa oluşabilecek bireylerin genotipinde çekinik alel bulunur.

C) Genotipinde 2 ve 3 numaralı alelleri bulunduran birey ile 3 ve 4 numaralı alelleri bulunduran birey çaprazlanırsa saf döl baskın genotip oluşma ihtimali %50'dir.

D) Genotipinde 1 ve 2 numaralı alelleri bulunduran birey ile 1 ve 4 numaralı alelleri bulunduran birey çaprazlanırsa oluşabilecek bireylerin melez döl olma ihtimali %50'dir.

5. Bir hücrenin çekirdeğinde bulunan kalıtsal yapılar arasındaki ilişki aşağıdaki görselde modellenmiştir.



Buna göre, görselde numaralandırılmış yapılarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) I numaralı yapı, DNA molekülünün özel proteinlerle birleşerek kısalıp kalınlaşması sonucunda oluşur.

B) II numaralı yapı, nükleotidlerin belirli bir düzende dizilmesiyle oluşur ve belirli kalıtsal özelliklerden sorumludur.

C) III numaralı yapının dört farklı çeşidi vardır ve bulunduğu nükleotide ismini verir.

D) IV numaralı yapı, tüm nükleotidlerde farklılık gösterir ve canlılar arasındaki kalıtsal çeşitliliği sağlar.

6. Akraba evliliği, aralarında kan bağı bulunan bireylerin yaptığı evliliktir. Kardeş çocuklarının yaptığı evliliklere birinci derece akraba evliliği, kardeş torunlarının yaptığı evliliklere ise ikinci derece akraba evliliği denir. Türkiye'de evli çiftlerin yaklaşık olarak üçte biri akrabadır. Genel olarak toplumda doğan her 100 çocuktan 3'ünde çeşitli nedenlerden kaynaklanan genetik hastalıklar saptanırken bu risk akraba evliliği yapmış olan çiftlerde daha fazladır. Akraba evliliklerinden doğan her 100 çocuğun 9'unda genetik hastalık görülür.

Örneğin bir genetik hastalık, akraba evliliğinin olmadığı toplumlarda ortalama 20.000 yeni doğanda bir görülmesine rağmen ülkemizde 4.000 yeni doğanda bir görülmektedir. Çekinik genlerle taşınan genetik hastalıkların ortaya çıkma olasılığı akrabalık bağı yakınlaştıkça yükselmektedir. Bu nedenle akraba evliliği yapacak çiftlerin evlilik öncesi gerekli genetik testleri yaptırmaları önemlidir.

Verilen metne göre akraba evliliğiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


A) Akraba evliliği yapılan ailelerde doğan her çocukta genetik hastalık ortaya çıkma ihtimali %9'dur.

B) Akraba evliliğinde çekinik genlerin bir araya gelme ihtimali artacağından çocuklarda genetik hastalık görülme olasılığı artar.

C) Akraba olmayan kişilerin yaptığı evliliklerden doğacak çocuklarda genetik hastalık ortaya çıkma ihtimali yoktur.

D) Genetik hastalıklar sadece akraba olan kişilerin yaptığı evliliklerden doğacak çocuklarda ortaya çıkar.

7. Bezelye bitkileriyle yapılan iki ayrı çaprazlamada oluşabilecek bezelyelerin fenotipleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



Birinci çaprazlamadan elde edilen mor çiçekli bezelye bitkileriyle ikinci çaprazlamadan elde edilen bezelye bitkileri çaprazlanacaktır.

Bu çaprazlamalardan elde edilebilecek sonuçlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi <u>kesinlikle</u> doğrudur?

A) İkinci çaprazlamadan mor çiçekli bezelye seçilirse saf döl mor çiçekli bezelye oluşma ihtimali %50'dir.
B) İkinci çaprazlamadan mor çiçekli bezelye seçilirse beyaz çiçekli bezelye oluşma ihtimali %50'dir.
C) İkinci çaprazlamadan beyaz çiçekli bezelye seçilirse melez döl mor çiçekli bezelye oluşma ihtimali %50'dir.
D) İkinci çaprazlamadan mor çiçekli bezelye seçilirse mor çiçekli bezelye oluşma ihtimali %50'dir.


8. Aşağıda bazı kalıtsal yapılara ait özellikler verilmiştir:

K: Yönetici molekülü meydana getiren yapı birimleridir.
L: Hücre içindeki tüm yaşamsal faaliyetleri yöneten moleküldür.
M: Kalıtsal özelliklerin belirlenmesini sağlar. Yönetici molekülün görev birimidir.

Buna göre özellikleri açıklanan yapılar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

	K	L	M
A)	Gen	DNA	Nükleotid
B)	Nükleotid	DNA	Gen
C)	Nükleotid	Gen	Kromozom
D)	Kromozom	Nükleotid	Gen

9. Aşağıda bir DNA molekülü verilmiştir.




Bu DNA molekülünün hatasız eşlenmesi sürecinde zincirler birbirinden ayrılmış ve iki yeni DNA molekülü oluşmuştur.

Buna göre, adenin, timin, guanin ve sitozin nükleotidlerinin ikinci zincirdeki sayıları ile bu zincirden elde edilen yeni DNA molekülündeki sayıları aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru gösterilmiştir?

A)




B)



C)



D)



10. Öğretmenin öğrencilerine verdiği kapalı kutu üzerinde aşağıdaki bilgi kartı bulunmaktadır:


Bu kutu içerisinde bulunan boncukların temsil ettiği yapılar ve sayıları altlarında yazmaktadır.

A	G	T	C	D	P
50 Adet Adenin Organik Bazı	45 Adet Guanin Organik Bazı	25 Adet Timin Organik Bazı	30 Adet Sitozin Organik Bazı	90 Adet Şeker Molekülü	120 Adet Fosfat Molekülü


Öğretmen, öğrencilerinden bu boncukları kullanarak nükleotidler oluşturmalarını istemiştir.

Aşağıdaki grafiklerden hangisi öğrencilerin oluşturdukları nükleotidlerin sayılarını doğru gösteriyor olabilir?


A)




B)



C)



D)




11. Yüksek miktarda C vitamini içeren gilaburu meyvesi daha çok yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı iklim tipinde yetişmeye uygun bir meyvedir.




Gilaburu

Aşağıdaki seçeneklerde 30 yıllık sıcaklık ve yağış ortalamaları verilen şehirlerden hangisi gilaburu bitkisinin yetişmesi için en uygundur?


A)




B)




C)



D)



12. Dünya üzerindeki konumları bilinmeyen K ve L şehirlerine ait 21 Haziran tarihinde çizilen grafik aşağıda verilmiştir.



Grafikte "?" ile gösterilen özellik hakkında yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?


A) K şehri Yengeç Dönencesi ile Ekvator arasında, L şehri Ekvator'da ise "?" yerine gölge boyu yazılabilir.

B) K şehri Ekvator ile Oğlak Dönencesi arasında, L şehri Yengeç Dönencesi üzerinde ise "?" yerine Güneş ışınlarının yüzeyle yaptığı açı yazılabilir.


C) K şehri Oğlak Dönencesi üzerinde, L şehri güney kutup dairesine yakın bir konumda ise "?" yerine birim yüzeye düşen enerji miktarı yazılabilir.

D) K şehri Oğlak Dönencesi ile Ekvator arasında, L şehri Ekvator'da ise "?" yerine gündüz süresi yazılabilir.

13. Ayşe ve Ahmet, yaşadıkları şehirlerde özdeş cisimlerin gölge boylarını yıl boyunca Güneş en yüksek konumdayken ölçerek aşağıdaki grafikleri elde etmişlerdir.



Ayşe'nin Oluşturduğu Grafik



Ahmet'in Oluşturduğu Grafik

Grafikler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


A) Ayşe'nin yaşadığı şehirde 21 Mart tarihi sonbahar mevsiminin başlangıcıdır.

B) Ahmet'in yaşadığı şehirde 21 Haziran tarihinden sonra gece süresi kısalır.

C) Ayşe'nin yaşadığı şehirde 21 Aralık tarihi yaz mevsiminin başlangıcıdır.

D) Ahmet'in yaşadığı şehre 21 Aralık tarihinde Güneş ışınları en küçük açıyla gelir.


14. Aşağıda bir şehirde 1990-2025 yılları arasında gerçekleşen sıcaklık ve yağış verilerinin ortalamasını gösteren grafik verilmiştir.



Buna göre grafik ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Verilen grafik şehrin iklim özellikleri hakkında bilgi verebilir.
B) Grafik verilerinin oluşturulması ve yorumlanması klimatoloji biliminin çalışma alanına girer.
C) Grafiğe bakılarak şehre en fazla yağışın mayıs ayında düştüğü söylenebilir.
D) Şehre ait verilerin oluşturulmasında meteoroloji biliminin katkısı olmamıştır.

15. Yüksek basınç alanlarında merkezden çevreye hava hareketleri gözlemlenirken alçak basınç alanlarında çevreden merkeze hava hareketleri gözlemlenir. Görselde birbirine komşu K ve L bölgelerine ait hava hareketlerinin yönleri gösterilmiştir.



K Bölgesi L Bölgesi


Buna göre,

I. K bölgesinde hava genellikle bulutludur ve yağış oluşma ihtimali fazladır.
II. L bölgesinde alçalıcı hava hareketi gözlemlenir.
III. Oluşabilecek rüzgârın yönü K bölgesinden L bölgesine doğrudur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III

16. Aşağıdaki görselde Dünya'nın Güneş etrafında dolanma hareketine ait bir konum verilmiştir.




Görselde verilenler dikkate alındığında,

I. Dünya'nın dolanma düzlemi ile Ekvator çizgisi arasındaki açı, eksen eğikliği olarak adlandırılır.
II. Kuzey yarım küredeki gündüz süresi, güney yarım küredeki gündüz süresinden fazladır.
III. Yengeç Dönencesi'nde birim yüzeye düşen enerji miktarı, Oğlak Dönencesi'nden fazladır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III


17. 21 Aralık tarihinde K, L ve M şehirlerine ait gece ve gündüz sürelerini gösteren grafikler aşağıda verilmiştir.



Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


A) 21 Mart tarihinde L şehrinde sonbahar mevsimi yaşanmaya başlar.
B) Bu tarihte Güneş en yüksek konumdayken ışınlar K şehrine dik açıyla gelir.
C) M şehri Ekvator ile Yengeç Dönencesi arasındadır.
D) Bu tarihten sonra L şehrinde gündüz süresi artar.

18. Görselde verilen şehirlerden K Yengeç Dönencesi, L Ekvator, M ise Oğlak Dönencesi üzerindedir.




Buna göre K, L ve M şehirleriyle ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır?


A) Gece Süresi




B) Birim Yüzeye Düşen Enerji




C) Gündüz Süresi



D) Işınların Yüzeyle Yaptığı Açı



19. Aşağıdaki grafikte Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 2025 yılı yaz mevsimi bölgesel yağış ortalamalarının mevsim normalleri ile bir önceki yıla göre karşılaştırması verilmiştir.



Verilen grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Karadeniz Bölgesi'nde 2025 yılı yağış ortalaması bir önceki yıla göre artmıştır.

B) Doğu Anadolu Bölgesi'nin 2024 yılı yağış ortalaması, Akdeniz Bölgesi'nin 2025 yılı yağış ortalamasından azdır.

C) İç Anadolu Bölgesi'nin 2025 yılı yağış ortalaması, aynı yılın Türkiye ortalamasının altındadır.

D) 2025 yılında Marmara ve Karadeniz Bölgeleri mevsim normallerinin üstünde yağış almıştır.

20. Bir şehirde öğlen saatlerinde 30 °C ölçülen hava sıcaklığının, gece saatlerinde -2 °C'a kadar düştüğü ve kar yağışının başladığı görülmüştür.

Meydana gelen bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Şehrin bulunduğu bölgenin iklim koşullarının değiştiği

B) Hava olaylarında ani değişikliklerin görülebileceği

C) Gelecek yıl aynı olayın kesinlikle tekrarlanacağı

D) Bu verilerin klimatologlar tarafından elde edildiği

707487

TEMEL EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEBİ

MEBİ DENEME RAPORLARI

CEVAPLARINI GİR, RAPORUNU İNCELE!

Denemeyi çöz, cevaplarını süresi içinde MEBİ'ye gir; sonuçlarını ayrıntılı raporlarla incele.

Deneme Sınavı Raporlarım

Ders ve soru bazındaki sonuçlarını ayrıntılı olarak incele; hangi konuda güçlü, hangi konuda eksik olduğunu gör.

İlerleme Raporlarım

Önceki deneme sonuçlarınla karşılaştırmalı grafikler sayesinde zaman içindeki gelişimini takip et.

Hedef Raporlarım

Deneme sonuçlarını hedeflediğin liselerle birlikte değerlendir, hedefine ne kadar yaklaştığını gör.

Her denemeden sonra uzman öğretmenlerin hazırladığı ayrıntılı video çözümler de MEBİ'de seni bekliyor!

RAPORLARINA NASIL ULAŞIRSIN?

1. Deneme yayımlandığında soruları çöz.
2. Cevaplarını deneme süresi içinde mebi.eba.gov.tr adresindeki ya da MEBİ mobil uygulamasındaki çevrim içi optik forma gir.
3. Raporların oluştuğunda Deneme Sınavı Raporlarım, İlerleme Raporlarım ve Hedef Raporlarım bölümlerini incele.

TARA, HEMEN BAŞLA!

Raporlar yalnızca süresi içinde cevapları girilen denemeler için oluşur.

mebi.eba.gov.tr