

한빛대학교종합병원	퇴원요약서 및 복약안내	문서번호 DC-260728-2054
HANBIT UNIVERSITY GENERAL HOSPITAL	Discharge Summary & Medication Instructions	발행구분: 합성/테스트

환자성명	배성호 (가상)	성별/나이	남 / 46세	등록번호	DC-260728-2054
입원기간	2026-07-28 ~ 2026-08-04	진료과	외과	병동	61병동
주치의	외과 전문의 조현우 (가상)	퇴원형태	정상 퇴원	퇴원장소	자가

1. 진단 및 수술

주진단	급성 결석성 담낭염 (Acute calculous cholecystitis)		
부진단	비알코올성 지방간, 비만 1단계, 일시적 간기능 수치 상승		
수술명	복강경 담낭절제술 (Laparoscopic cholecystectomy)		
수술일	2026-07-30	집도의	외과 조현우 (가상)
병리결과	만성 염증을 동반한 급성 담낭염. 악성 소견 없음.		

2. 입원 경과 요약

경과	환자는 우상복부 통증과 발열로 응급실에 내원하였고, 복부 CT에서 담낭 경부 결석 및 급성 담낭염 소견이 확인되었습니다. 입원 후 금식, 정맥수액, 진통제 및 광범위 항생제를 투여하였습니다. 2026-07-30 전신마취하 복강경 담낭절제술을 시행하였으며, 수술 중 담낭 천공이나 담관 손상은 없었습니다. 수술 후 1일째부터 맑은 유동식을 시작하여 일반식으로 진행하였고, 보행과 배뇨가 가능했습니다. 발열은 재발하지 않았으며 간기능 수치도 감소 추세였습니다. 배액관은 수술 후 3일째 제거하였고, 수술 상처는 깨끗하며 삼출이 없습니다. 통증은 경구 진통제로 조절되어 퇴원합니다.
----	--

3. 퇴원 시 상태

혈액징후	BP 126/78 mmHg, HR 72/min, RR 18/min, BT 36.6 °C
식이/활동	일반식 섭취 가능. 독립 보행 가능.
상처	배꼽 및 우상복부 포함 4개 절개부위 건조, 발적·고름 없음.
통증	안정 시 NRS 1, 움직임 시 NRS 2.
퇴원검사	WBC 7.1, Hb 13.6, AST 41, ALT 58, Total bilirubin 0.8, CRP 1.2

4. 퇴원약

약품명	1회량	횟수	기간	복용방법/주의사항
Acetaminophen 500 mg	1정	하루 3회	3일	식후 복용. 다른 감기약과 중복 성분 주의.
Cefditoren pivoxil 100 mg	1정	하루 3회	4일	식후 복용. 발진·호흡곤란 발생 시 즉시 중단 후 진료.
Rebamipide 100 mg	1정	하루 3회	7일	식후 복용.
Simethicone 80 mg	1정	하루 3회	5일	복부 팽만이 없으면 중단 가능.

5. 퇴원 후 관리 및 경고 증상

식이	퇴원 후 1~2주간 기름진 음식과 과식을 피하고, 소량씩 나누어 드십시오. 이후 증상이 없으면 일반식으로 천천히 전환합니다.
상처관리	방수 드레싱은 2일 후 제거할 수 있습니다. 샤워는 가능하나 탕 목욕·수영은 외래 확인 전까지 피하십시오.
활동	걷기는 권장합니다. 2주간 5 kg 이상의 물건 들기와 격렬한 운동을 피하십시오. 운전은 진통제 복용이 끝나고 통증 없이 움직일 수 있을 때 시작합니다.
즉시 진료가 필요한 경우	38 °C 이상 발열, 악화되는 복통, 지속적인 구토, 눈이나 피부가 노래짐, 상처 부위의 고름·심한 붓기, 숨참 또는 흉통.
외래예약	2026-08-12 10:20 외과 외래 - 수술 상처 및 병리 결과 확인.

6. 환자/보호자 교육 확인

교육내용	설명 완료	이해 확인
퇴원약 복용법		환자가 약 이름과 복용 횟수를 말로 재진술함
상처 관리 및 샤워		보호자가 드레싱 제거 시점을 확인함
경고 증상과 응급실 방문 기준		환자 및 보호자 모두 이해함
외래 예약		예약 안내문 수령

퇴원요약 작성: 외과 전공의 김서후 (가상)	최종 확인: 외과 전문의 조현우 (가상)
환자/보호자 서명: _____	교육 담당 간호사: 이가은 (가상)