неравна, $n=25 \Rightarrow \xi_{13}$

$$\xi_k \sim \sum_{i=k}^{n} C_n^i (F(t))^i (1-F(t))^{n-i} = \tilde{\varphi}(t)$$

$$\tilde{\varphi}(t) = \sum_{i=k}^{n} C_n^i \left[i(F(t))^{i-1} (1-F(t))^{n-i} - (n-i)(F(t))^i \cdot \right.$$

$$\left. \cdot (1-F(t))^{n-i-1} \right] \cdot F'(t)$$

$$F'(t) = p(t) = e^{-t}$$

$$F(t) = \int_0^t e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_0^t = 1 - e^{-t}$$

$$\tilde{\varphi}(t) = \sum_{i=k}^{n} C_n^i e^{-t} (1-e^{-t})^{i-1} (e^{-t})^{n-i-1} \left[i e^{-t} - \right.$$

$$\left. -(n-i)(1-e^{-t}) \right] =$$

$$= \sum_{i=k}^{n} C_n^i e^{-t(n-i)} (1-e^{-t})^{i-1} \left[\cancel{i e^{-t}} - (n-i) + n e^{-t} - \right.$$

$$\left. - \cancel{i e^{-t}} \right] =$$

$$= \sum_{i=k}^{n} C_n^i e^{-t(n-i)} (1-e^{-t})^{i-1} \left[n e^{-t} - n + i \right]$$