# Physikalische Formeln für die Oberstufe

### Mechanik

Gleichförmige Bewegung:

$$\vec{s} = \vec{v} \cdot t$$

gleichmäßig beschleunigte Bewegung:

$$\vec{s} = \frac{1}{2}\vec{a}t^2 + \vec{v_0}t + \vec{s_0}$$
$$\vec{v} = \vec{a} \cdot t$$

Kraft und Beschleunigung:

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

Feder/Hooke'sches Gesetz:

$$\vec{F} = -D \cdot \vec{s}$$

Kreisbewegung:

$$\vec{F}_z = \frac{m \cdot \vec{v}^2}{|\vec{r}|}$$

Impuls:

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

Energie:

$$E_{kin} = \frac{1}{2}m\vec{v}^2$$
 
$$E_{pot} = m \cdot g \cdot h$$
 
$$E_{Feder} = \frac{1}{2}D \cdot \vec{s}^2$$

Arbeit (mechanisch):

$$W = \Delta E = \vec{F} \cdot \vec{s}$$

Gravitationsgesetz:

$$|\vec{F}| = G \frac{m_1 m_2}{|\vec{r}|^2}$$

# elektrische- und magnetische Felder

Coulombkraft:

$$|\vec{F}| = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q \cdot Q}{|\vec{r}|^2}$$

El. Feldstärke:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

Plattenkondensator:

$$\vec{E} = \frac{U}{\vec{d}}$$

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{d}$$

El. Potential (= Energie):

$$E = \Phi = Q \cdot U$$

Lorenzkraft:

$$\vec{F_L} = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$$

Induktionsspannung:

$$U_{ind} = |\vec{B} \cdot l \times \vec{v}|$$

Induktivität (Spule):

$$L = \mu_0 \mu_r \cdot \frac{n^2}{l} A$$

Magn. Feld (lange Spule):

$$|\vec{B}| = \mu_0 \mu_r \frac{n \cdot I}{l}$$

Energie (lange Spule):

$$E = \frac{1}{2}L \cdot I^2$$

## Schwingungen und Wellen

Allgemeine Schwingungsgleichung:

$$A \cdot sin(\omega t - \varphi)$$

Schwingungsdauer und (Kreis-)Frequenz:

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Federpendel:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{D}}$$

Fadenpendel:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{q}}$$

El. Schwingkreis:

$$T = 2\pi\sqrt{L \cdot C}$$

Wellenlänge:

$$\lambda = c \cdot T$$

## Quantenphysik

Interferenzbedingung:

$$g \cdot sin(\alpha) = n \cdot \lambda$$

Bragg-Bedingung:

$$2g \cdot sin(\alpha) = n \cdot \lambda$$

deBroglie-Wellenlänge:

$$\lambda = \frac{h}{n}$$

Photonenenergie:

$$E = h \cdot f$$

Heisenberg'sche Unschärfe:

$$\Delta E \cdot \Delta t = \Delta x \cdot \Delta p \ge \frac{h}{2\pi} = \hbar$$

# Relativitätstheorie

Energie-Masse-Beziehung:

$$E = mc^2$$

Lorenz-Transformation:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}}$$

## weitere

Zerfallsgesetz:

$$N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{t_{\frac{1}{2}}}}$$

Universelle Gasgleichung:

$$p \cdot V = n_{Teilchen} \cdot k_B \cdot T$$

<u>Hinweis:</u> Formelzeichen mit Pfeien  $(\vec{Z})$  sind richtungsabhängige (=vektorielle) Größen, ggf. muss die Richtung, z.B. als Vorzeichen, beachtet werden!

Ist dabei das  $Kreuzprodukt \times$  angegeben müsssen die Größen senkrecht zueinander sein um mit den Zahlenwerten (=  $Beträgen \ |\vec{Z}|$ ) und · rechnen zu können. ( $\rightarrow$  linke/rechte-Hand-Regeln)

## Formelzeichen und (Grund-)Einheiten

#### Mechanik

 $\vec{s}$ : Strecke (m)

 $\vec{r}/\vec{d}$ : Radius/Abstand (m)

 $\vec{v}$ : Geschwindigkeit  $(\frac{m}{\epsilon})$ 

 $\vec{a}$ : Beschleunigung  $(\frac{m}{s^2})$ 

t: Zeit (s)

 $\vec{F}$ : Kraft  $(N = \frac{kg \cdot m}{s^2})$ 

 $\vec{p}$ : Impuls  $(\frac{kg \cdot m}{s})$ 

D: Federkonstante  $(\frac{N}{m})$ 

E: Energie (J = Nm)

p: Druck  $(p = \frac{N}{m^2})$ 

W: Arbeit=Energieänd. (J)

## El. & Magn. Felder

q: Ladung (einzeln) (C = As)

Q: Gesamtladung (C)

U: Spannung  $(V = \frac{J}{C})$ 

A: Fläche  $(m^2)$ 

C: Kapazität  $(F = \frac{C}{V})$ 

 $\vec{B}$ : Magn. Flussdichte (T)

 $\vec{E}$ : el. Feldstärke  $(\frac{N}{C})$ 

R: el. Widerstand  $(\Omega = \frac{V}{A})$ L: Induktivität  $(H = \Omega s)$ 

## Schwingungen

 $\omega$ : Kreisfrequenz  $(Hz = \frac{1}{s})$ 

T: Schwingungsdauer (s)

f:Frequenz (Hz)

 $\lambda \text{: Wellenlänge } (m)$ 

#### weitere

n: ganze Zahl

 $\Delta$ : Differenz/Änderung

# Wichtige Konstanten

Erdbeschl.(Mitteleuropa):

$$9,81\frac{m}{s^2}$$

Erdmasse:

$$5,974 \cdot 10^{24} kg$$

Erdradius (mittlerer):

6367km

Lichtgeschwindigkeit:

$$2,998*10^8\frac{m}{s}$$

Gravitationskonstante:

$$6,674 \cdot 10^{-11} \frac{m^3}{kg \cdot s^2}$$

Elektrische Feldkonstante:

$$\varepsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm}$$

Magnetische Feldkonstante:

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{N}{A^2}$$

Elementarladung:

$$e = 1,602 \cdot 10^{-19}C$$

Elektronenvolt:

$$1eV = 1,602 \cdot 10^{-19} J$$

Elektronenmasse:

$$m_e = 9,109 \cdot 10^{-31} kq$$

Protonenmasse:

$$m_p = 1,673 \cdot 10^{-27} kg$$

Planck'sches Wirkungsquantum:

$$h = 2\pi\hbar = 6,626 \cdot 10^{-34} Js$$

Avogadro-Konstante:

$$6,022 \cdot 10^{23} \frac{1}{mol}$$

Boltzmann-Konstante:

$$k_B = 1,381 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$$