

Indoxyl sulfát a kognitívne zhoršenie pri chronickej chorobe obličiek: čo vieme z derivátov tryptofánu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 03.10.2026



Poloschematická vizualizácia. Toxín, ktorý oblička neodstráni, nezostáva bez následku — zasahuje aj myslenie.

Pacienti s chronickou chorobou obličiek (CKD) majú vyššie riziko neurologických komplikácií, ale biologické mechanizmy a využiteľné biomarkery nie sú úplne jasné. V poslednom prehľade na Medscape sa rieši súvislosť medzi metabolitmi odvodenými od tryptofánu, najmä uremickým toxínom **indoxyl sulfátom (IS)**, a kognitívnym poškodením u pacientov s CKD.

Cieľ štúdie

Autori skúmali, či sa hladiny tryptofánových uremických derivátov (**indoxyl sulfát, kynurenín, indole-3-acetát**) viažu na **kognitívne zhoršenie** u dospelých s CKD.

Dizajn a populácia

Ide o **prierezovú (cross-sectional) analýzu** francúzskej kohorty (2013 až 2016). Do analýzy bolo zahrnutých **2389 dospelých** s CKD **stupňa 2 až 5**, bez predchádzajúcej dialýzy alebo transplantácie, ktorí mali dostupné:

- merania uremických toxínov (voľné sérové hladiny merané validovanou metodikou LC-MS/MS),
- výsledok kognitívneho skríningu.

Kognitívne zhoršenie sa hodnotilo pomocou **Mini-Mental State Examination (MMSE)**, pričom za poškodenie sa považovalo **MMSE skóre $\leq 26/30$** .

Hlavné výsledky

V kohorte malo kognitívne zhoršenie **858 pacientov (35,9 %)**.

Najdôležitejší nález:

- **vyššie sérové hladiny indoxyl sulfátu** boli **nezávisle** spojené s vyššou pravdepodobnosťou kognitívneho poškodenia (upravené OR **1,11**, $P = 0,03$),
- v analýze citlivosti (porovnanie s najnižšou skupinou IS) bola skupina s najvyšším IS spojená s **viac než 40 % vyššou pravdepodobnosťou** $MMSE \leq 26/30$ (upravené OR **1,43**, $P = 0,02$).

Naopak:

- **kynurenín** a **indole-3-acetát** nepreukázali signifikantnú asociáciu s kognitívnym poškodením.

„Takeaway“ z článku

V rámci tryptofánových cirkulujúcich derivátov vychádza, že **IS** je ten, ktorý sa viaže ku kognitívnemu zhoršeniu pri CKD, zatiaľ čo **KYN** (kynurenín) a **IAA** (indole-3-acetát) nie.

Preklad do nefrologickej praxe: čo to môže znamenať

Ak je táto asociácia stabilná aj v prospektívnych štúdiách, IS by sa mohol stať praktickým biomarkerom „biologického rizika“ neurologických komplikácií pri CKD. Z praktického pohľadu to otvára dve roviny:

1. **Riziková stratifikácia.** Pacienti s vyšším IS môžu byť „viac ohrození“, čo môže byť užitočné pri plánovaní sledovania kognície alebo pri práci s rizikami, ktoré kogníciu zhoršujú (napr. vaskulárne faktory, zápal, anémia, urémia).
2. **Mechanistické prepojenie.** Keďže ide o uremický toxín, výsledok podporuje úvahu, že niektoré tryptofánové metabolity môžu byť súčasťou biologickej osi vedúcej k neurologickému poškodzovaniu pri CKD.

Zároveň však treba byť opatrný: ide o **prierezové dáta**, takže z toho nejde priamo vyvodiť kauzalitu ani to, že zníženie IS automaticky zlepší kogníciu.

Limity, ktoré sú dôležité na správnu interpretáciu

Medscape explicitne uvádza limity, ktoré si zaslúžia zdôraznenie:

- **prierezový dizajn** neumožňuje určiť príčinu a následok,
- **MMSE** nemusí optimálne zachytiť všetky domény kognície, najmä **exekutívne funkcie**, čo môže viesť k skresleniu merania,
- štúdia nezohľadnila vplyv **diétnych faktorov a výživy**.

Záver

V tejto francúzskej kohorte pacientov s CKD vyššie hladiny **indoxyl sulfátu** nezávisle súviseli s vyššou pravdepodobnosťou **kognitívneho poškodenia**, zatiaľ čo **kynurenín** a **indole-3-acetát** asociáciu nepreukázali. Pre klinickú prax je to zaujímavý signál, ale zatiaľ skôr podnet pre výskum biomarkerov a rizikovej stratifikácie než hotové terapeutické odporúčanie.

Zdroj: Gaye Hafez et al., „Tryptophan Metabolite Indoxyl Sulphate Levels Tied to Cognitive Impairment in CKD“, *Clinical Kidney Journal* (spracované v *Medscape Medical News*, 2026). [Link na zdroj](#).

Zdroj: <https://nefro.polasci.net/article.php?slug=indoxyl-sulfat-kognitivne-zhorsenie-ckd> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.