


Vyšetrenie hematurie v nefrologickej praxi: potvrdenie, urgentné stavy a určenie zdroja

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 03.10.2026



Poloschematická vizualizácia. Hematúria je laboratórny znak, nie diagnóza: rovnaký nález v moči môže vzniknúť v glomerule aj kdekoľvek v močových cestách.

Hematúria je častý nález, ale správny postup sa nezačína diagnózou. Začína sa potvrdením, že v moči sú skutočne erytrocyty, rozpoznaním stavov vyžadujúcich neodkladný zásah a až potom určením pravdepodobného zdroja krvácania. Pozitívny testovací prúžok, červený moč a mikroskopicky potvrdená hematúria nie sú synonymá.

Za mikrohematúriu sa podľa AUA/SUFU považuje nález ≥ 3 erytrocytov v jednom zornom poli pri veľkom zväčšení (RBC/HPF) v správne odobratej vzorke. Samotná pozitivita prúžka na krv diagnózu nestanovuje; musí viesť k mikroskopickému vyšetreniu sedimentu.

Najprv odlíšme tri rozdielne situácie

Nález	Mikroskopia	Najpravdepodobnejšie vysvetlenie
Pozitívny prúžok na krv	Erytrocyty prítomné	Hematúria
Pozitívny prúžok na krv	Erytrocyty chýbajú alebo ich je neprimerane málo	Hemoglobínúria alebo myoglobínúria; zohľadniť lýzu erytrocytov v zriedenom či alkalickom moči
Červený alebo hnedý moč	Prúžok na krv negatívny, erytrocyty chýbajú	Pigmentúria, napríklad po červenej repe, rifampicíne alebo fenazopyridíne

Prúžok deteguje peroxidázovú aktivitu hemu, nie samotný erytrocyt. Výsledok môžu ovplyvniť aj preanalytické okolnosti; napríklad vysoký príjem vitamínu C môže viesť k falošne negatívnej reakcii. Pri rozpore medzi farbou moču, prúžkom a mikroskopiou treba nález zopakovať v čerstvej, správne odobratej vzorke.

Kedy nečakať na ambulantný algoritmus

Urgentné alebo nemocničné vyšetrenie je potrebné najmä pri:

- makroskopickej hematúrii so zrazeninami, retenciou moču alebo obštrukciou,
- hemodynamickej nestabilite, symptomatickej anémii alebo zjavnom pokračujúcom krvácaní,
- oligúrii či anúrii, rýchlom vzostupe kreatinínu alebo podozrení na rýchlo progredujúcu glomerulonefritídu,
- horúčke alebo sepe pri súčasnej obštrukcii močových ciest,
- traume alebo jedinej funkčnej obličke s podozrením na obštrukciu.

Zrazeninová retencia môže vyžadovať okamžitú drenáž a urologickú intervenciu. Infikovaná obštrukcia horných močových ciest je urgentný stav; samotné antibiotikum bez spriechodnenia odtoku nemusí stačiť.

Potvrdenie nálezu a základné vyšetrenie

1. **Správny odber:** čistý stredný prúd moču, mimo menštruácie a bez zjavnej kontaminácie; pri pochybnostiach zvážiť katetrizovanú vzorku.
2. **Mikroskopia:** počet RBC/HPF, morfológia erytrocytov, valce, leukocyty a kryštály. Vzorka má byť vyšetrená včas.
3. **Anamnéza:** viditeľná krv, dysúria, koliková bolesť, infekcie, kamene, trauma, intenzívna fyzická záťaž, fajčenie, pracovné expozície, lieky, rodinná anamnéza ochorenia obličiek a uroteliálneho karcinómu.
4. **Objektívne a laboratórne vyšetrenie:** krvný tlak, kreatinín s eGFR, krvný obraz podľa kliniky, kvantifikácia albuminúrie alebo proteinúrie pomocou UACR alebo PCR a kultivácia moču pri podozrení na infekciu.

Ak sa hematúria pripísala infekcii močových ciest, treba po liečbe urobiť kontrolnú mikroskopiю. To isté platí po ústupe identifikovanej gynekologickej alebo inej nezhubnej príčiny. Pretrvávajúci nálezu spúšťa rizikovo stratifikované vyšetrenie.

Glomerulárny alebo neglomerulárny zdroj?

Znak	Skôr glomerulárny zdroj	Skôr neglomerulárny zdroj
Sediment	Akanthocyty, výrazne dysmorfne erytrocyty, erytrocytové valce	Prevažne izomorfné erytrocyty, zrazeniny
Sprievodný nále	Albuminúria/proteinúria, hypertenzia, edémy, pokles eGFR	Dysúria, kolika, retencia, urologické symptómy
Typické okruhy príčin	IgA nefropatia, ochorenia podocytov a bazálnej membrány, vaskulitída, lupusová nefritída	Nádor, urolitiáza, infekcia, trauma, ochorenie prostaty

Erytrocytové valce a akanthocyty sú silnými argumentmi pre glomerulárny pôvod, ale citlivosť morfológie erytrocytov závisí od spracovania vzorky a skúsenosti hodnotiteľa. Neprítomnosť dysmorfnych erytrocytov preto glomerulové ochorenie nevylučuje. Naopak, súčasná albuminúria, hypertenzia alebo znížená eGFR významne posúvajú pravdepodobnosť smerom k parenchýmovému ochoreniu obličiek.

Riziková stratifikácia mikrohematúrie podľa AUA/SUFU 2025

Po vylúčení prechodnej príčiny sa ďalší urologický postup odvíja od veku, pohlavia, intenzity hematúrie, fajčenia a ďalších rizikových faktorov uroteliálneho nádoru. Hranice nižšie sa vzťahujú na dospelých bez už známej vysvetľujúcej príčiny.

Kategória	Kritériá	Odporúčaný postup
-----------	----------	-------------------

Kategória	Kritériá	Odporúčaný postup
Nízke alebo zanedbateľné riziko	Musia byť splnené všetky: 3–10 RBC/HPF; žena < 60 rokov alebo muž < 40 rokov; nikdy nefajčil/a alebo < 10 balíčkorokov; bez ďalších rizikových faktorov	Kontrolná analýza moču do 6 mesiacov, nie okamžitá cystoskopia ani zobrazovanie
Stredné riziko	Aspoň jedno: 11–25 RBC/HPF; pretrvávajúce 3–25 RBC/HPF po pôvodne nízkom riziku; žena ≥ 60 rokov; muž 40–59 rokov; 10–30 balíčkorokov; ďalší rizikový faktor	Cystoskopia a ultrasonografia obličiek a močového mechúra
Vysoké riziko	Aspoň jeden vysoko rizikový znak: > 25 RBC/HPF, anamnéza makroskopickej hematurie, muž ≥ 60 rokov, > 30 balíčkorokov alebo vysoko riziková expozícia; žena sa nesmie zaradiť do vysokého rizika iba podľa veku	Cystoskopia a axiálne zobrazenie horných močových ciest

Pri vysokom riziku je preferovaná viacfázová CT urografia, ak nie je kontraindikovaná. Alternatívou je MR urografia; ak nemožno použiť ani jednu, možno kombinovať retrográdnú pyelografiu s neenhancovaným axiálnym zobrazením alebo ultrasonografiou. Voľba musí zohľadniť funkciu obličiek, predchádzajúcu reakciu na kontrastnú látku, radiačnú záťaž a lokálnu dostupnosť.

U informovaného pacienta so stredným rizikom, ktorý sa chce vyhnúť cystoskopii, aktualizácia z roku 2025 pripúšťa použitie cytológie alebo validovaného močového nádorového markeru ako pomôcky pri rozhodovaní o cystoskopii. Ultrasonografia sa však vykoná a pri pretrvávajúcej mikrohematurii sa cystoskopia doplní. Markery nie sú rutinnou náhradou cystoskopie vo vysokom riziku.

Nefrológia a urológia nie sú konkurenčné cesty

Proteinúria, dysmorfné erytrocyty, valce, hypertenzia alebo znížená funkcia obličiek sú dôvodom na nefrologické vyšetrenie. **Podozrenie na glomerulové ochorenie však automaticky neruší rizikovo primerané urologické vyšetrenie.** Parenchýmové ochorenie obličiek a urologická príčina môžu koexistovať.

Ďalší nefrologický postup sa riadi klinickým syndrómom: sérológia pri podozrení na systémové ochorenie, genetika pri dlhodobej glomerulárnej hematurii s rodinnou anamnézou, poruchou sluchu alebo zraku a biopsia, ak výsledok môže zmeniť diagnózu, prognózu alebo liečbu. Pojem „tenká glomerulová bazálna membrána“ nemožno automaticky zamieňať s neškodným stavom; spektrum ochorení COL4A3, COL4A4 a COL4A5 je klinicky širšie.

Časté pasce

- **Antikoagulantia a antiagregancia:** nemenia potrebu štandardného vyšetrenia. Môžu krvácanie zvýrazniť, ale nemajú sa prijať ako definitívne vysvetlenie.
- **Fyzická záťaž:** prechodná hematuria môže ustúpiť, no pretrvávajúci nález treba vyšetriť podľa rizika.
- **Kosáčikovitá črta:** môže súvisieť s hematuriou, ale diagnóza sa nesmie uzavrieť bez vylúčenia iných príčin. U mladého pacienta s nevysvetlenou hematuriou treba myslieť aj na zriedkavý, agresívny renálny medulárny karcinóm.
- **„Negatívna“ ultrasonografia:** neuzatvára vyšetrenie pacienta vo vysokom riziku a nenahrádza cystoskopiou.

Čo po negatívnom vyšetrení?

Po kompletne negatívnom rizikovo primeranom vyšetrení sa o ďalšej analýze moču rozhoduje spoločne s pacientom. Ak je kontrolná analýza negatívna, sledovanie možno ukončiť. Pri pretrvávajúcej alebo recidíve mikrohematurie sa zvažuje ďalšie vyšetrenie podľa celkového rizika. Nová makroskopická hematuria, nárast počtu erytrocytov alebo nové urologické symptómy sú dôvodom na opätovné vyšetrenie.

Praktický algoritmus v jednej vete

Prúžok → mikroskopia → urgentné príznaky → prechodná príčina → sediment, UACR/PCR a eGFR → paralelné nefrologické posúdenie a rizikovo stratifikované urologické vyšetrenie. Najväčšou chybou

nie je zvoliť „nesprávnu špecializáciu“, ale predčasne uzavrieť nález jediným vysvetlením.

Hlavný zdroj: Prochaska M, Reynolds LF, Zisman A. Approach to Hematuria: Core Curriculum 2026. *Am J Kidney Dis.* 2026;88(4):605–614. doi:10.1053/j.ajkd.2026.05.013.

Odporúčanie: American Urological Association, Society of Urodynamics, Female Pelvic Medicine & Urogenital Reconstruction. *Microhematuria: AUA/SUFU Guideline (2020, amended 2025)*.

Aktualizácia: Barocas DA, Lotan Y, Matulewicz RS, et al. Updates to Microhematuria: AUA/SUFU Guideline (2025). *J Urol.* 2025;213(5):547–557. doi:10.1097/JU.0000000000004490.

Text je odborným prehľadom pre zdravotníckych pracovníkov. Konkrétny postup treba prispôbiť klinickému stavu, dostupnosti vyšetrení a lokálnym odporúčaniam.

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=vysetrenie-hematurie-nefrologicka-prax-algoritmus> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.