


Sparsentan so SGLT2 inhibítorom pri IgA nefropatii: SPARTACUS a PROTECT OLE

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín



Poloschematická vizualizácia. Dva mechanizmy sa tu nenahrádzajú, ale vrstvia — otázkou pre prax je, koľko navyše prinesie druhá vrstva.

Sparsentan (duálny antagonista endotelínového a angiotenzínového receptora, DEARA) a **inhibítory sodíkovo-glukózového kotransportéra 2 (SGLT2i)** znižujú proteinúriu pri IgA nefropatii (IgAN). V *Nephrology Dialysis Transplantation* (2026) Ayoub a kol. zhrnuli účinnosť a bezpečnosť ich kombinácie v dvoch komplementárnych nastaveniach: v otvorenej štúdii fázy 2 **SPARTACUS** a v randomizovanej substúdii otvoreného predĺženia (OLE) štúdie **PROTECT**. Text vychádza z publikačného abstraktu a má sa čítať opatrne – najmä pri extrapolácii na tvrdé obličkové alebo kardiovaskulárne ukazovatele.

Najdôležitejšie odkazy

- V **SPARTACUS** (NCT05856760) sa u pacientov so stabilným SGLT2i vymenil inhibítor systému renín-angiotenzín (RASi) za sparsentan. Do 24. týždňa klesol pomer albumínu ku kreatinínu v moči (UACR) o LS mean **–56 %** (95 % interval spoľahlivosti [IS] –66 % až –3 %).
- V substúdii **PROTECT OLE** (NCT03762850) pridanie SGLT2i k stabilnému sparsentanu v 12. týždni prinieslo relatívne priaznivejšiu zmenu pomeru proteínu ku kreatinínu v moči (UPCR) oproti samotnému sparsentanu (pomer 0,75; 95 % IS 0,58–0,98; $P < 0,05$).
- Kombinácia bola podľa abstraktu **dobře tolerovaná**; závažné alebo vážne nežiaduce udalosti súvisiace s liečbou boli zriedkavé a neočakávané bezpečnostné signály sa nehlásili.
- Ide o **náhradné (surrogátne) ukazovatele** (UACR/UPCR) a relatívne krátke sledovanie. Samostatný dôkaz o spomalení poklesu eGFR, zlyhaní obličiek či kardiovaskulárnych príhodách z týchto dát nevyplýva.

Prečo má kombinácia DEARA + SGLT2i zmysel

Sparsentan blokuje endotelínový receptor typu A a receptor angiotenzínu II typu 1. SGLT2 inhibítory pôsobia cez tubuloglomerulárnu spätnú väzbu, znižujú intraglomerulárny tlak a majú ďalšie systémové účinky. Pri IgAN sa obe cesty používajú ako neimunosupresívna nefroprotektia; otázka **sekvencie a súčtu účinkov** (výmena RASi za sparsentan pri už užívanom SGLT2i vs. prídanie SGLT2i k sparsentanu) však ešte nebola dostatočne zodpovedaná v bežnej praxi.

SPARTACUS a PROTECT OLE odpovedajú práve na tieto dve praktické situácie – nie sú to však veľké štúdie tvrdej klinickej účinnosti ani priame porovnanie s inými modernými režimami (napr. cieľová imunomodulácia podľa KDIGO).

SPARTACUS: výmena RASi za sparsentan pri stabilnom SGLT2i

SPARTACUS bola **fáza 2, otvorená** štúdia. Pacienti mali RASi nahradený sparsentanom a pokračovali v stabilnej liečbe SGLT2i. Zaradených bolo **48** pacientov (priemerný vek 48,9 rokov, SD 13,9; 58 % mužov); liečbu dokončilo **39**.

Výmena RASi za sparsentan viedla k **rýchlemu a do 24. týždňa udržanému poklesu UACR**: LS mean -56% (95 % IS -66% až -3%). Interval spoľahlivosti je podľa publikačného abstraktu značne asymetrický; bodový odhad je však výrazný a smeruje k klinicky relevantnej redukcii albuminúrie.

Položka	Údaj (abstrakt)
Dizajn	Fáza 2, otvorená; NCT05856760
Intervencia	Výmena RASi → sparsentan pri pokračujúcom stabilnom SGLT2i
Počet	48 zaradených; 39 dokončilo liečbu
Demografia	Vek 48,9 (SD 13,9) rokov; 58 % mužov
Kľúčový výsledok	UACR do 24. týždňa: LS mean -56% (95 % IS -66% až -3%)

Metodický kontext: SPARTACUS nie je zaslepená randomizovaná komparatívna štúdia oproti pokračovaniu RASi. Pokles UACR preto silne podporuje hypotézu o prínose sparsentanu v prostredí SGLT2i, ale nedokazuje superioritu voči „optimálne titrovanému RASi + SGLT2i“ v rovnakom dizajne. Endpointom bola albuminúria (UACR), nie UPCR – pri citovaní treba rozlišovať od PROTECT OLE.

PROTECT OLE: prídanie SGLT2i k stabilnému sparsentanu

V substúdii otvoreného predĺženia PROTECT boli pacienti už liečení sparsentanom randomizovaní **1 : 1** na prídanie SGLT2i alebo pokračovanie samotným sparsentanom počas **12 týždňov**. Následne mohli všetci pokračovať v kombinácii sparsentan + SGLT2i ďalších až **24 týždňov**.

Do 12-týždňovej randomizovanej časti bolo zaradených **63** pacientov (všetci ju dokončili): sparsentan + SGLT2i **n = 32** (vek 51,4; SD 13,4; 81 % mužov) oproti samotnému sparsentanu **n = 31** (vek 50,6; SD 11,1; 68 % mužov). **24 týždňov** kombinácie dokončilo **54** pacientov.

V 12. týždni bol LS mean zmeny UPCR $-11,1\%$ (95 % IS $-26,3\%$ až $7,3\%$) pri kombinácii oproti $+17,7\%$ (95 % IS $-2,4\%$ až $42,1\%$) pri samotnom sparsentane. Relatívny pomer medzi skupinami bol **0,75** (95 % IS 0,58–0,98; $P < 0,05$).

Položka	Sparsentan + SGLT2i	Samotný sparsentan
Počet (12 týždňov)	32	31
Vek; podiel mužov	51,4 (13,4); 81 %	50,6 (11,1); 68 %
Zmena UPCR (LS mean, 12. týždeň)	$-11,1\%$ ($-26,3\%$ až $7,3\%$)	$+17,7\%$ ($-2,4\%$ až $42,1\%$)
Pomer medzi skupinami	0,75 (0,58–0,98); $P < 0,05$	
24 týždňov kombinácie	54 pacientov dokončilo	

Absolútne ide o **mierny** ďalší pokles proteinúrie pri pridaní SGLT2i, nie o efekt veľkosti SPARTACUS. Intervaly spoľahlivosti jednotlivých skupín sa prekrývajú s nulou, ale *kontrast medzi ramenami* dosiahol štatistickú významnosť. Pri interpretácii treba počítať s malým *n*, krátkym randomizovaným horizontom a tým, že neskôr mali všetci možnosť prejsť na kombináciu.

Bezpečnosť

Podľa abstraktu bolo málo nežiaducich udalostí súvisiacich s liečbou, ktoré by boli závažné, vážne alebo viedli k ukončeniu. Kombinácia bola hodnotená ako dobre tolerovaná, **bez neočakávaných bezpečnostných signálov**.

Aj tu platí opatrnosť: abstrakt neuvádza detailné frekvencie hyperkaliémie, poklesu eGFR, hepatotoxicity, retencie tekutín ani hypotenzie – teda oblasti, ktoré pri endotelínovej blokáde a SGLT2i treba v praxi sledovať. Krátke sledovanie nezachytí zriedkavé oneskorené riziká.

Čo výsledky podporujú a čo ešte nie

Podporujú	Nepodporujú / chýba	
Albuminúria / proteinúria	Výrazný pokles UACR po výmene RASi→sparsentan pri SGLT2i; mierny ďalší pokles UPCR po pridaní SGLT2i k sparsentanu	Dôkaz o spomalení sklonu eGFR, dialýze, transplantácii alebo úmrtí
Sekvenca liečby	Oba praktické scenáre (výmena RASi; pridanie SGLT2i) majú empirickú oporu	Optimálne poradie voči imunoterapii podľa rizika progresie (KDIGO)
Bezpečnosť	Krátkodobá tolerancia bez neočakávaných signálov v abstrakte	Dlhodobý bezpečnostný profil kombinácie v bežnej praxi

Pre ambulantnú prax je rozumný záver: **kombinácia sparsentanu so SGLT2i pri IgAN je v týchto dátach biologicky a klinicky zmysluplná cestou k ďalšiemu zníženiu proteinúrie**, najmä ak už pacient užíva jednu z týchto tried. Rozhodnutie však musí rešpektovať dostupnosť lieku, úhradu, kontraindikácie, monitorovanie a celkový rizikový profil pacienta – vrátane otázok, či je vhodnejšia cieľená imunomodulácia.

Zhrnutie

SPARTACUS ukázal výrazný a udržaný pokles **UACR** po výmene RASi za sparsentan pri stabilnom SGLT2i. Subštúdia PROTECT OLE ukázala, že pridanie SGLT2i k sparsentanu prináša oproti samotnému sparsentanu **relatívne priaznivejšiu zmenu UPCR** v 12. týždni (pomer 0,75). Kombinácia bola krátkodobo dobre tolerovaná. Ide o dôležité náhradné dôkazy proteinúrie pre kombinovanú nefroprotektiu pri IgAN, nie o finálny dôkaz tvrdého klinického prínosu.

Súvisiace články na portáli

- [Kompletná remisia proteinúrie v štúdiu PROTECT \(post hoc\)](#)
- [Algoritmus manažmentu IgA nefropatie podľa KDIGO 2025](#)
- [IgA nefropatia: KDIGO 2025 a komentár KDOQI](#)
- [Telitacicept pri IgA nefropatii \(TELIGAN\)](#)

Zdroj: Isabelle Ayoub, Gabriela Alperovich, Radko Komers, Laura Ann Kooienga, Alex Mercer, Stephanie Moody, Ingrid Prkačin, Brad H. Rovin, Hira Siktel, Sydney C. W. Tang. Sparsentan – SGLT2 inhibitor combination therapy in trials of IgA nephropathy. *Nephrol Dial Transplant*. 2026 Sep 11:gfg211. doi:10.1093/ndt/gfg211. [PubMed PMID 42726023](#); DOI; OUP ([advance article](#)).

Ďalšie overené odkazy:

1. ClinicalTrials.gov: [SPARTACUS \(NCT05856760\)](#); [PROTECT \(NCT03762850\)](#).

Bibliografické údaje a dostupnosť odkazov overené 14. septembra 2026 (PubMed/eutils, Crossref, ClinicalTrials.gov). OUP stránka môže byť chránená Cloudflare výzvou; primárny overený prístup k abstraktu je cez PubMed. Text je odborným informačným materiálom a nenahrádza

individuálne klinické rozhodnutie.

Zdroj: <https://nefro.polasci.net/article.php?slug=sparsentan-sglit2-inhibitor-iga-nefropatia-spartacus-protect> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.