Lieky proti bolesti a obličky: čo si overiť pred prvou tabletou

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 06.11.2026



Ilustračná scéna s modelom obličky. Nezobrazuje konkrétny liek ani poškodenie orgánu.

Ak máte chorobu obličiek, ibuprofén, diklofenak ani naproxén si na bolesť nenasadzujte bez porady s lekárom alebo lekárnikom. To, že sa liek predáva bez receptu, ešte neznamená, že je vhodný aj pre vás. Rozhoduje účinná látka, dávka, stav obličiek aj ostatné lieky. Bolesť však nemusíte znášať bez pomoci: vhodnú liečbu možno prispôsobiť jej príčine aj vášmu zdravotnému stavu. [1, 2]

Prečo si pri ibuproféne dať pozor

Ibuprofén, diklofenak a naproxén patria medzi **nesteroidné protizápalové lieky**, označované skratkou NSAID. Tlmia bolesť a zápal, ale môžu znížiť prietok krvi obličkami. Následkom môže byť náhle zhoršenie ich činnosti, teda akútne poškodenie obličiek. Riziko je vyššie pri už poškodenej funkcii obličiek. [2]

Pri chronickej chorobe obličiek nie je vhodné užívať tieto lieky pravidelne na vlastnú päsť. Neznamená to absolútny zákaz za každých okolností: nefrológ môže po zvážení prínosu a rizika zvoliť aj krátkodobú protizápalovú liečbu s kontrolami. Ani silnejší liek na predpis nie je automaticky bezpečnejšou náhradou. [1]

Najprv skontrolujte, čo už užívate

Osobitnú opatrnosť si vyžaduje pridanie protizápalového lieku k liečbe vysokého tlaku alebo srdcového zlyhávania. Týka sa to najmä ACE inhibítorov a sartanov, teda skupín liekov používaných aj na ochranu obličiek, a diuretík, liekov podporujúcich vylučovanie vody a soli močom. **Predpísanú liečbu svojvoľne nevysádzajte.** Pred kúpou lieku proti bolesti ukážte lekárnikovi celý zoznam svojich liekov. [2, 3]

Skontrolujte aj prípravky na prechladnutie. Môžu už obsahovať liečivo proti bolesti. Dva obaly s rôznymi obchodnými názvami môžu znamenať tú istú účinnú látku a nechcenú dvojnásobnú dávku. Ibuprofén nekombinujte s ďalším protizápalovým liekom bez pokynu lekára. [4]



Ilustračná konzultácia. Pri výbere lieku pomôže úplný zoznam liečby vrátane prípravkov bez receptu.

Paracetamol: často vhodná možnosť, ale so správnym dávkovaním

Pri bežnej bolesti alebo horúčke býva paracetamol pre človeka s chorobou obličiek vhodnejšou možnosťou než protizápalové tablety. Aj jeho použitie si však overte podľa svojho zdravotného stavu. [5] Pri zníženej funkcii obličiek môže byť potrebné **predĺžiť odstup medzi dávkami**. Slovenský súhrn charakteristických vlastností lieku PARALEN 500 to výslovne uvádza. Preto tu neuvádzame jednu dávkovaciu schému pre všetkých. [6]

Dodržte dávkovanie konkrétneho prípravku a pokyny lekára. Sčítajte paracetamol zo všetkých súčasne užívaných liekov. Predávkovanie môže vážne poškodiť pečeň; počas liečby nepite alkohol. Ak máte chorobu pečene alebo potrebujete paracetamol opakovane, poraďte sa s lekárom. [6]

Gél na kĺb nie je to isté ako tableta

Pri bolesti ohraničenej na jeden kĺb môže prichádzať do úvahy lokálna liečba. Z diklofenakového gélu sa do krvi dostáva menej liečiva než z tabliet, preto je riziko pre obličky nižšie. Neznamená to nulové riziko ani možnosť natierať veľké plochy či prekračovať odporúčané množstvo. Pri chorobe obličiek a po transplantácii si vhodnosť gélu overte u svojho zdravotníckeho tímu. [2, 5]



Ilustračná scéna lokálnej liečby. Množstvo gélu aj dĺžka používania sa riadia konkrétnym prípravkom.

Vraciate alebo máte hnačku? Nepokračujte v samoliečbe naslepo

Strata tekutín a nízky krvný tlak môžu vyvolať akútne poškodenie obličiek. Ak opakovane vraciate, máte hnačku alebo nedokážete prijímať tekutiny, spojte sa s lekárom, najmä ak už chorobu obličiek máte. Môže byť potrebné upraviť liečbu a skontrolovať krv. [7] O dočasnom prerušení predpísaných liekov sa dohodnite s lekárom vrátane toho, kedy ich znovu začať užívať. [1]

Ak chodíte na dialýzu alebo máte určené obmedzenie tekutín, riaďte sa individuálnym plánom. Nesnažte sa situáciu riešiť vypitím veľkého množstva vody; pri pokročilej chorobe obličiek môže byť potrebné príjem tekutín obmedzovať. [8]

Kedy vyhľadať pomoc bez odkladu

Výrazne menej moču než zvyčajne, nové opuchy, opakované vracanie, nezvyčajná ospalosť alebo zmätenosť si vyžadujú rýchle lekárske posúdenie. Náhle poškodenie obličiek však môže prebiehať aj bez nápadných príznakov; odhalí ho vyšetrenie krvi. [7]

Pri silnej dýchavici, bolesti na hrudníku alebo poruche vedomia volajte 155 alebo 112. Vracanie krvi či čierna dechtovitá stolica počas užívania protizápalového lieku tiež vyžadujú okamžitú pomoc. Pri podozrení na predávkovanie paracetamolom vyhľadajte pomoc ihneď, aj keď sa zatiaľ cítite dobre. [4, 6]

Čo povedať v lekárni

Stačí začať konkrétne: „Mám chorobu obličiek. Toto sú moje lieky. Čo môžem užiť na túto bolesť a ako dlho?“ Povedzte, kde a odkedy vás bolí, čo ste už užili a či chodíte na dialýzu alebo máte transplantovanú obličku. Ak máte aktuálnu lekársku správu, vezmite ju so sebou. Zoznam liekov udržiavajte aktuálny vrátane výživových doplnkov. [3]

Ak sa bolesť vracia alebo vám bráni v bežnom živote, objednajte sa na vyšetrenie. Cieľom je zistiť jej príčinu a dohodnúť liečbu, ktorá vám pomôže bez zbytočného rizika.

Článok je určený dospelým pacientom a verejnosti. Nenahrádza vyšetrenie ani individuálne odporúčanie lekára. Dávkovanie liekov u detí a v tehotenstve si vyžaduje osobitné posúdenie.

Zdroje a ďalšie čítanie

Odborné a jazykové spracovanie: MUDr. Ľubomír Polaščín. Zdroje overené 6. novembra 2026. Ide o pôvodný pacientsky prehľad vychádzajúci z nasledujúcich odporúčaní a liekových informácií.

1. *Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International. 2024;105(4S):S117 až S314. Kapitola 4. Plný text; DOI; PubMed.*
2. *National Kidney Foundation. Pain Medicines and Kidney Disease. Aktualizované 21. februára 2025.*
3. *National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK). Managing Chronic Kidney Disease. Časť o bezpečnom užívaní liekov.*
4. *MedlinePlus, U.S. National Library of Medicine. Ibuprofen. Informácie o liečive.*
5. *Kidney Care UK. Pain medication for people with chronic kidney disease.*
6. *PARALEN 500. Súhrn charakteristických vlastností lieku, verzia so zmenou 2025/00429-ZIB. Dokument zverejnený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Dokument ŠÚKL. Časti 4.2, 4.4 a 4.9.*
7. *National Health Service (NHS). Acute kidney injury (AKI). Odborná kontrola 11. marca 2026.*
8. *National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK). Healthy Eating for Adults with Chronic Kidney Disease. Časť o tekutinách.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=lieky-proti-bolesti-a-oblicky · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.