


Finerenón pri CKD a diabete 1. typu: čo skutočne znamená schválenie FDA

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 10.10.2026



© nefro.polascin.net

Ilustračná scéna. Schválenie otvára dvere – nehovorí však samo osebe, pre ktorého pacienta a s akým očakávaným prínosom cez ne prejsť.

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) rozšíril v septembri 2026 indikáciu finerenónu (Kerendia) na dospelých s chronickou chorobou obličiek (CKD) asociovanou s diabetes mellitus 1. typu. Presná formulácia je podstatná: liek je v USA indikovaný na **zníženie pomeru albumínu ku kreatinínu v moči (UACR), od ktorého sa očakáva zníženie rizika trvalého poklesu eGFR a terminálneho zlyhania obličiek**. Štúdia FINE-ONE priamo preukázala pokles albuminúrie, nie zníženie počtu prípadov zlyhania obličiek, kardiovaskulárnych príhod alebo úmrtí. [1–3]

Regulačné rozhodnutie nie je dôkazom všetkých klinických výsledkov

Aktuálny americký predpisový text odlišuje tri indikácie finerenónu. Pri CKD a diabete 2. typu uvádza zníženie rizika renálnych a kardiovaskulárnych príhod na základe výsledkov FIDELIO-DKD a FIGARO-DKD. Pri CKD a diabete 1. typu je indikácia postavená na znížení UACR a na očakávanom renálnom prínose odvodenom z celkového súboru dôkazov. FDA využila výsledky FINE-ONE spolu s klinickými údajmi pri diabete 2. typu, v ktorých bola zmena albuminúrie spojená s renálnymi výsledkami. [1]

Toto regulačné odvodenie je dôležité, nemožno ho však zamieňať s tvrdením, že FINE-ONE preukázala prevenciu terminálneho zlyhania obličiek. Štúdia trvala šesť mesiacov, mala 242 účastníkov a na takýto klinický výsledok nebola navrhnutá ani štatisticky dimenzovaná. UACR je prognosticky dôležitý biomarker a v tomto programe registračný preklenovací ukazovateľ; zostáva však náhradným ukazovateľom. [1–3]

Koho zahŕňala FINE-ONE

FINE-ONE bola multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia 3. fázy. Zaradila dospelých s diabetom 1. typu a CKD, ktorí mali eGFR 25 až menej ako 90 ml/min/1,73 m², UACR 200 až menej ako 5 000 mg/g a HbA1c pod 10 %. Účastníci dostávali inzulín a stabilnú dávku inhibítora ACE alebo

blokátora receptorov angiotenzínu II. Vstupná koncentrácia draslíka musela byť najviac 4,8 mmol/l. [1, 2]

Pacienti užívajúci inhibítora SGLT2 alebo agonistu receptora GLP-1 boli zo štúdie vylúčení. Výsledok preto neposkytuje priamy dôkaz o účinnosti ani bezpečnosti súbežnej liečby týmito liekmi pri diabete 1. typu a rozhodovanie nemožno prenášať zo situácie pri diabete 2. typu. [1]

Primárny výsledok: tri čísla, tri odlišné významy

Primárnym ukazovateľom bola zmena logaritmicke transformovaného UACR vyjadrená ako pomer k východiskovej hodnote a spriemerovaná z meraní v treťom a šiestom mesiaci. Priemerný účinok finerenónu oproti placebo predstavoval **o 25 % väčšie zníženie UACR** (pomer geometrických priemerov 0,75; 95 % interval spoľahlivosti 0,65 až 0,87; $p < 0,001$). [2]

- V ramene s finerenónom klesol UACR za šesť mesiacov o 34 % oproti východiskovej hodnote.
- V ramene s placebom klesol za rovnaký čas o 12 %.
- Placebom korigovaný rozdiel bol 25 %, pretože sa počítal ako pomer geometrických priemerov, nie jednoduchým odčítaním 34 mínus 12.

Americký predpisový text uvádza aj časové odhady: oproti placebo bol UACR nižší o 22 % v treťom a o 28 % v šiestom mesiaci. Tieto čísla nie sú v rozpore s primárnym výsledkom 25 %; opisujú jednotlivé návštevy, zatiaľ čo primárna analýza ich spriemerovala. [1]

eGFR: krátkodobý pokles bol po vysadení prevažne reverzibilný

Po šiestich mesiacoch sa eGFR zmenila o $-5,6 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ pri finerenóne a o $-2,7 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ pri placebe. Rozdiel bol $-2,9 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ (95 % interval spoľahlivosti $-5,1$ až $-0,7$). Počas vymývacieho obdobia sa hodnoty približovali k východiskovým, čo podporuje hemodynamickú zložku zmeny. [2]

Jednotlivý pokles eGFR preto nemožno automaticky označiť za progresiu CKD, no nemožno ho ani ignorovať. Treba posúdiť objemový stav, tlak, interkurentné ochorenie, súbežné lieky a dynamiku kreatinínu a draslíka. FINE-ONE neposkytuje dlhodobú krivku eGFR ani dôkaz spomalenia zlyhania obličiek počas rokov.

Hyperkaliémia je hlavné bezpečnostné riziko

Hyperkaliémia sa vyskytla u 10,1 % účastníkov s finerenónom a u 3,3 % s placebom. Dvaja účastníci liečeni finerenónom, teda 1,7 %, liečbu pre hyperkaliémiu natrvalo ukončili. Krátke trvanie a prísne vstupné kritériá znamenajú, že reálne riziko môže byť u pacientov s nižšou eGFR, vyšším východiskovým draslíkom alebo ďalšími liekmi zvyšujúcimi kaliémiu odlišné. [2]

Finerenón je substrát CYP3A4. Súbežné podávanie so silnými inhibítormi CYP3A4 je podľa amerického predpisového textu kontraindikované. Opatrnosť a prípadne častejšie kontroly si vyžadujú aj ďalšie lieky zvyšujúce koncentráciu finerenónu alebo sérový draslík. [1]

Americké dávkovanie pri CKD s diabetom 1. typu

Nasledujúce údaje opisujú **americký predpisový text**, nie európske alebo slovenské preskripčné pravidlá: [1]

- pred začatím sa meria eGFR a sérový draslík; liečba sa nezačína pri draslíku nad 5,0 mmol/l,
- pri eGFR najmenej 60 ml/min/1,73 m² je úvodná dávka 20 mg raz denne,
- pri eGFR 25 až menej ako 60 ml/min/1,73 m² je úvodná dávka 10 mg raz denne,
- pri eGFR pod 25 ml/min/1,73 m² sa začatie neodporúča,
- cieľová dávka pri CKD asociovanej s diabetom 1. alebo 2. typu je 20 mg raz denne,
- draslík sa kontroluje po štyroch týždňoch od začatia a po každej zmene dávky, potom periodicky podľa rizika.

Pri draslíku nad 5,5 mmol/l sa má liečba prerušiť a podľa hodnoty draslíka neskôr obnoviť v dávke 10 mg. Ak eGFR pri zvažovanej titracii klesla o viac ako 30 % oproti predchádzajúcemu meraniu, americký predpisový text odporúča ponechať 10 mg. Tieto pravidlá treba vždy overiť v aktuálnom dokumente platnom pre danú krajinu a konkrétnu indikáciu. [1]

Čo to znamená pre slovenskú a európsku prax

Schválenie FDA nie je automaticky schválením v Európskej únii ani na Slovensku. K 24. septembru 2026 Európska lieková agentúra uvádza renálnu indikáciu Kerendie pre dospelých s CKD, albuminúriou a diabetom 2. typu. Európska produktová informácia zatiaľ neuvádza CKD asociovanú s diabetom 1. typu. Použitie v tejto populácii je preto v EÚ mimo schválenej renálnej indikácie, pokiaľ sa regulačný stav nezmení. [4]

Americké rozhodnutie mení dôkazový a regulačný kontext, ale nemení potrebu potvrdiť CKD, kvantifikovať UACR, optimalizovať glykémiu a tlak, použiť tolerovanú blokádu renín-angiotenzínového systému a kontrolovať draslík. Pri rozhodovaní treba zohľadniť dostupnosť, úhradu, kontraindikácie a aktuálny slovenský súhrn charakteristických vlastností lieku.

Praktický záver

FINE-ONE priniesla presvedčivý krátkodobý dôkaz zníženia albuminúrie a definovala bezpečnostný profil finerenónu pri CKD a diabete 1. typu. FDA na tomto výsledku a na extrapolácii údajov z diabetu 2. typu založila novú americkú indikáciu. Pre klinickú komunikáciu je presné hovoriť, že finerenón **znižuje UACR a na tomto základe sa očakáva renálny prínos**. Dlhodobé zníženie rizika zlyhania obličiek alebo kardiovaskulárnych príhod pri diabete 1. typu zatiaľ priamo preukázané nebolo.

Rozsah overenia: výsledky a úplný autorský zoznam FINE-ONE boli overené v publikácii New England Journal of Medicine a bibliografických záznamoch PubMed. Indikácia, dávkovanie a monitorovanie boli overené v aktuálnom americkom predpisovom texte Kerendie; európsky regulačný stav v aktuálnej produktovej informácii EMA. Stav overenia: 24. september 2026.

Zdroje

1. U.S. Prescribing Information: Kerendia (finerenone), revised September 2026. [Aktuálny americký predpisový text](#).
2. Heerspink HJL, Birkenfeld AL, Cherney DZI, Colhoun HM, Groop PH, Ji L, Jongs N, Mathieu C, Pratley RE, Rosas SE, Rossing P, Skyler JS, Tuttle KR, Lawatscheck R, Brinker M, Scheerer MF, Russell J, Schloemer P, McGill JB; FINE-ONE Investigators. Finerenone in Type 1 Diabetes and Chronic Kidney Disease. *N Engl J Med*. 2026;394(10):947-957. [DOI](#); [PubMed](#).
3. Heerspink HJL, Birkenfeld AL, Cherney DZI, et al. Rationale and design of a randomised phase III registration trial investigating finerenone in participants with type 1 diabetes and chronic kidney disease: The FINE-ONE trial. *Diabetes Res Clin Pract*. 2023;204:110908. [PubMed](#).
4. European Medicines Agency. Kerendia: EPAR and product information. [Aktuálna európska indikácia](#).
5. Bayer. U.S. FDA approves finerenone for new indication in patients with chronic kidney disease associated with type 1 diabetes. 17 September 2026. [Oznámenie o schválení](#).

Zdroj: <https://nefro.polasci.net/article.php?slug=finerenon-dm1-ckd-fda-fine-one> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.