

Retatrutid pri diabete 2. typu: výrazný pokles HbA1c a telesnej hmotnosti, kardio-renálny prínos však zatiaľ nepoznáme

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 10.10.2026



Ilustračná scéna. Pokles glykémie aj hmotnosti je presvedčivý; o tom, čo to znamená pre srdce a obličky, zatiaľ dôkazy chýbajú.

Retatrutid dosiahol v prvej štúdií fázy 3 pri diabete 2. typu výrazné metabolické účinky. Výsledky sa však týkajú selektovanej populácie s včasným diabetom liečeným iba režimovými opatreniami, krátko 40-týždňového sledovania a porovnania s placebom, nie s aktívnou liečbou. Retatrutid zostáva skúšaným liekom bez preukázanej ochrany obličiek alebo kardiovaskulárneho systému.

Tento článok je podrobným kritickým rozborom štúdie TRANSCEND-T2D-1 so zameraním na nefrologické súvislosti. Prehľadové spracovanie oboch retatrutidových štúdií prezentovaných na kongrese ADA 2026 nájdete v článku [Retatrutid prináša výrazný úbytok hmotnosti aj metabolické benefity](#).

Čo je retatrutid

Retatrutid, pôvodne označovaný ako LY3437943, je podkožne podávaný peptid, ktorý súčasne aktivuje tri hormonálne receptory:

- **receptor GLP-1** – podporuje glukózo-dependentnú sekréciu inzulínu, znižuje neprimeranú sekréciu glukagónu pri hyperglykémii, spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka a tlmí príjem potravy;
- **receptor GIP** – ovplyvňuje inzulínovú odpoveď, energetický metabolizmus a funkciu tukového tkaniva;
- **glukagónový receptor** – môže podporovať mobilizáciu tukových zásob a energetický výdaj, ale súčasne môže stimulovať hepatálnu tvorbu glukózy a ovplyvňovať srdcovú frekvenciu.

Výsledný klinický účinok nie je jednoduchým súčtom účinkov troch hormónov. Závisí od relatívnej aktivity molekuly na jednotlivých receptoroch, od dávky, farmakokinetiky a fyziologickej odpovede pacienta.

Retatrutid nemožno zamieňať s agonistami receptora GLP-1, ako sú semaglutid alebo dulaglutid, ani s duálnym

agonistom GIP/GLP-1 tirzepatidom. Účinnosť, bezpečnosť ani orgánový prínos jednej molekuly nemožno automaticky preniesť na inú.

Ako bola štúdia TRANSCEND-T2D-1 postavená

Parameter	Údaj
Dizajn	randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia fázy 3
Trvanie	40 týždňov
Pracoviská	48 centier v USA, Mexiku a Indii
Zaraďovanie	10. apríl 2024 až 21. apríl 2025
Skríning a randomizácia	930 skrínovaných, 537 randomizovaných v pomere 1 : 1 : 1 : 1
Liečba	retatrutid 4 mg, 9 mg alebo 12 mg podkožne raz týždenne s postupnou titráciou, alebo placebo
Primárny ukazovateľ	zmena HbA1c od začiatku do 40. týždňa
Kľúčový sekundárny ukazovateľ	percentuálna zmena telesnej hmotnosti
Registrácia	ClinicalTrials.gov NCT06354660 (ukončená)
Financovanie	Eli Lilly and Company

Zaradení boli dospelí od 18 rokov s diabetom 2. typu nedostatočne kontrolovaným samotnou diétou a pohybom, s HbA1c od 7,0 do 9,5 % (53 až 80 mmol/mol) a s BMI najmenej 23 kg/m², ktorí neužívali inú glukózu znižujúcu farmakoterapiu.

Liečebná skupina	Počet pacientov
Retatrutid 4 mg	134
Retatrutid 9 mg	133
Retatrutid 12 mg	136
Placebo	134

Priemerný vek účastníkov bol 48,8 roka (smerodajná odchýlka 12,1), priemerné HbA1c 7,9 % (1,1), priemerný BMI 35,8 kg/m² (7,0) a priemerné trvanie diabetu iba 2,5 roka (4,4). Ženy tvorili 55 % súboru (296 z 537). Liečebné obdobie na pridelenej liečbe dokončilo 490 účastníkov (91 %) a celú štúdiu 504 účastníkov (94 %).

Výsledky glykemickej kontroly

Liečba	Priemerná zmena HbA1c (SE)	Rozdiel oproti placebu (95 % IS)
Retatrutid 4 mg	−1,69 p. b. (0,11)	−0,88 (−1,18 až −0,59)
Retatrutid 9 mg	−1,86 p. b. (0,10)	−1,04 (−1,32 až −0,76)
Retatrutid 12 mg	−1,94 p. b. (0,08)	−1,12 (−1,39 až −0,85)
Placebo	−0,81 p. b. (0,12)	referenčná skupina

Skratka „p. b.“ znamená percentuálny bod, SE je štandardná chyba priemeru. Všetky tri porovnania s placebom boli štatisticky významné s hodnotou P < 0,0001.

Prečo je dôležitý rozdiel oproti placebu

Pokles HbA1c v placebovej skupine o 0,81 percentuálneho bodu bol pomerne výrazný. Mohli k nemu prispieť:

- intenzívnejšie režimové opatrenia sprevádzajúce účasť v štúdiu,
- pravidelné sledovanie a edukácia,
- regresia k priemeru,
- krátke trvanie diabetu a zachovaná sekrécia inzulínu,
- zmeny stravovania a pohybovej aktivity,
- ukončenie liečby u časti účastníkov a spôsob štatistického spracovania chýbajúcich údajov.

Pre posúdenie farmakologického účinku je preto presnejší rozdiel medzi retatrutidom a placebom než samotná zmena oproti východiskovej hodnote.

Ani veľký pokles HbA1c neznamena vyliečenie diabetu. Štúdia nehodnotila dlhodobú remisiu po ukončení liečby a nepreukázala, že glykemický účinok pretrváva bez pokračujúceho podávania lieku.

Úbytok telesnej hmotnosti

Liečba	Priemerná zmena hmotnosti (SE)	Orientačný rozdiel oproti placebu
Retatrutid 4 mg	-11,5 % (0,7)	asi 8,9 p. b.
Retatrutid 9 mg	-13,9 % (0,8)	asi 11,3 p. b.
Retatrutid 12 mg	-15,3 % (0,8)	asi 12,7 p. b.
Placebo	-2,6 % (0,5)	referenčná skupina

Účinok bol jasne závislý od dávky. Rozdiely oproti placebu v poslednom stĺpci sú **vlastným odčítaním priemerov**, nie publikovanými odhadmi liečebného rozdielu – publikovaný abstrakt pri hmotnosti neuvádza ani bodové odhady rozdielu, ani intervaly spoľahlivosti. Treba ich preto brať ako orientačné.

Podľa tlačovej správy Americkej diabetologickej asociácie predstavoval priemerný úbytok pri najvyššej dávke približne 36,6 libry, teda asi 16,6 kg. Z toho vyplýva východisková hmotnosť približne 99 kg. Úbytok hmotnosti nedosiahol do 40. týždňa maximum, krivka teda ešte nedosiahla plató.

Pozor na rozdielne čísla: dva estimandy

Publikácia v *Lancete* aj tento článok uvádzajú výsledky podľa takzvaného **estimandu liečebného režimu**. Ten hodnotí všetkých randomizovaných účastníkov vrátane tých, ktorí liečbu prerušili alebo dostali záchrannú liečbu, a je preto konzervatívnejší.

Tlačová správa ADA k tej istej štúdiu uvádza „až 2 % zníženie HbA1c“ a zníženie hmotnosti o **16,8 %**. Rozdiel oproti hodnotám 1,94 % a 15,3 % s najväčšou pravdepodobnosťou vyplýva z použitia druhého, priaznivejšieho estimandu, ktorý hodnotí účinok pri pokračujúcej liečbe bez záchranej medikácie.

Ani jedno číslo nie je nesprávne – odpovedajú však na dve odlišné otázky. Pri porovnávaní liekov medzi štúdiami je preto nevyhnutné overiť, ktorý estimand je uvedený. Rovnaké upozornenie platí pri čítaní tlačových správ a konferenčného spravodajstva.

Priame porovnanie so semaglutidom alebo tirzepatidom nie je možné

TRANSCEND-T2D-1 neobsahovala aktívny komparátor. Z jej výsledkov preto nemožno tvrdiť, že retatrutid je účinnejší než semaglutid alebo tirzepatid.

Nepriame porovnanie samostatných štúdií je skreslené rozdielmi v:

- trvaní diabetu a predchádzajúcej liečbe,
- východiskovom HbA1c a BMI,
- dávkovaní a schéme titrácie,
- trvaní sledovania,
- zastúpení obezity a komorbidít,

- definícií výsledkov a použitom estimande,
- spôsobe spracovania prerušenej liečby a chýbajúcich údajov.

Na spoľahlivé porovnanie je potrebná priamo porovnávacia randomizovaná štúdia. Práve taká už prebieha – pozri nižšie.

Bezpečnosť a znášanlivosť

Najčastejšími nežiaducimi účinkami boli gastrointestinálne ťažkosti typické pre lieky s aktivitou na receptore GLP-1. Väčšinou boli mierne až stredne závažné a časom ustupovali. Patrili medzi ne najmä nauzea, hnačka, vracanie, zápcha, dyspeptické ťažkosti a znížená chuť do jedla.

Pre nežiaduce účinky prerušilo liečbu 2 až 5 % pacientov užívajúcich retatrutid oproti 0 % pri placebe.

V štúdii nebola zaznamenaná závažná hypoglykémia. Tento výsledok je priaznivý, ale týka sa **monoterapie** u pacientov, ktorí dovtedy neužívali žiadnu glukózu znižujúcu farmakoterapiu. Riziko môže byť odlišné pri kombinácii s inzulínom alebo derivátmi sulfonylurey.

Počas štúdie zomreli dvaja účastníci, obaja v skupine s dávkou 4 mg; podľa hodnotenia skúšajúcich úmrtia nesúviseli so skúšaným liekom. Takýto malý počet udalostí neumožňuje posúdiť vplyv retatrutidu na mortalitu.

Otvorené bezpečnostné otázky

Štyridsaťtýždňová štúdia s 537 účastníkmi nemôže spoľahlivo zachytiť zriedkavé alebo neskoré komplikácie. Ďalší výskum musí hodnotiť najmä:

- akútnu pankreatitídu,
- ochorenia žlčníka a žlčových ciest,
- dehydratáciu a akútne poškodenie obličiek,
- zmeny srdcovej frekvencie a arytmie,
- dôsledky veľmi rýchleho úbytku hmotnosti,
- stratu svalovej a kostnej hmoty,
- podvýživu a deficit mikronutrientov,
- bezpečnosť u starších a krehkých pacientov,
- používanie pri pokročilej chronickej chorobe obličiek,
- vývoj hmotnosti a metabolických parametrov po prerušení liečby.

Nefrologické súvislosti

Výrazný úbytok hmotnosti, zlepšenie glykémie, pokles krvného tlaku a priaznivé zmeny lipidov môžu teoreticky znižovať riziko vzniku alebo progresie diabetickej choroby obličiek. TRANSCEND-T2D-1 však nebola renálnou výsledkovou štúdiou.

Na základe dostupných výsledkov nemožno tvrdiť, že retatrutid:

- spomaľuje dlhodobý pokles eGFR,
- znižuje albuminúriu nezávisle od zmeny hmotnosti a glykémie,
- znižuje riziko terminálneho zlyhania obličiek,
- predchádza potrebe dialýzy alebo transplantácie,
- znižuje renálnu alebo kardiovaskulárnu mortalitu,
- poskytuje orgánovú ochranu porovnateľnú s inhibítormi SGLT2 alebo s liekmi, pri ktorých boli výsledky preukázané v osobitných kardioresálnych štúdiách.

Orgánový prínos nemožno odvodzovať iba z mechanizmu účinku ani prenášať z iných inkretínových liekov.

Riziko prerénálneho AKI

Nauzea, vracanie, hnačka a výrazné zníženie príjmu potravy a tekutín môžu viesť k hypovolémii a prerénálnemu akútnemu poškodeniu obličiek. Zvýšené riziko by mohli mať najmä pacienti:

- s chronickou chorobou obličiek,
- vo vyššom veku alebo s krehkosťou,
- liečení diuretikami,
- súbežne užívajúci inhibítor SGLT2,
- s nízkym krvným tlakom,
- so srdcovým zlyhávaním,
- počas akútnej infekcie alebo horúčky.

Pri významných gastrointestinálnych ťažkostiach je vhodné zhodnotiť hydratáciu, krvný tlak, kreatinín, sodík a draslík a individuálne upraviť lieky ovplyvňujúce objemový stav a hemodynamiku obličiek.

Kreatinín a úbytok svalovej hmoty

Veľký pokles telesnej hmotnosti môže zahŕňať aj stratu svalstva. Znížená tvorba kreatinínu potom môže viesť k **zdanlivému zvýšeniu kreatinínovej eGFR bez skutočného zlepšenia glomerulovej filtrácie**. Pri poklese hmotnosti o 15 % za necelý rok ide o klinicky reálny problém, nie o teoretickú výhodu.

V renálnych štúdiách retatrutidu by preto bolo vhodné hodnotiť:

- kreatinínovú aj cystatínovú eGFR,
- pomer albumínu ku kreatinínu v moči,
- telesné zloženie a svalovú silu,
- dlhodobý sklon eGFR,
- potvrdené klinické renálne príhody.

Čo prinesú ďalšie štúdie programu

Autori štúdie uvádzajú, že prebiehajú ďalšie štúdie fázy 3. Pre nefrológiu sú podstatné dve:

Štúdia	Populácia a porovnanie	Primárny ukazovateľ	Rozsah
TRANSCEND-T2D-2 (NCT06260722)	diabetes 2. typu; retatrutid oproti semaglutidu , 80 týždňov	glykemická kontrola	1 250 účastníkov
TRANSCEND-T2D-3 (NCT06297603)	diabetes 2. typu so stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie obličiek pri liečbe bazálnym inzulínom, prípadne s metformínom a/alebo inhibítorom SGLT2; retatrutid oproti placebo	zmena HbA1c v 52. týždni	320 účastníkov

Dôležitá nefrologická poznámka: ani štúdia u pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je renálnou výsledkovou štúdiou. Jej primárnym ukazovateľom je zmena HbA1c v 52. týždni; obličkové parametre sú hodnotené v rámci účinnosti a bezpečnosti, nie ako klinické renálne príhody. Prinesie teda cenné údaje o účinnosti a znášanlivosti pri zníženej funkcii obličiek, ale *neodpovie* na otázku, či retatrutid spomaľuje progresiu chronickej choroby obličiek.

Zo štúdie sú navyše vylúčení pacienti s rýchlo progredujúcim alebo nestabilným ochorením obličiek, so srdcovým zlyhávaním triedy NYHA III a IV a s nedávnou kardiovaskulárnou príhodou. Aj jej výsledky teda budú platiť pre relatívne stabilnú populáciu.

Populácia štúdie nereprezentuje väčšinu komplikovaných diabetikov

Priemerné trvanie diabetu bolo iba 2,5 roka a pacienti dovtedy neužívali glukózu znižujúcu farmakoterapiu. Výsledky preto nemožno bez ďalších dôkazov prenášať na pacientov:

- s dlhodobým diabetom,
- liečených inzulínom,
- s pokročilou chronickou chorobou obličiek,
- s prekonanými kardiovaskulárnymi príhodami,

- vo vyššom veku a s krehkosťou,
- s diabetickou gastroparézou,
- po transplantácii obličky,
- liečených dialýzou,
- s komplexnou polyfarmáciou.

U takýchto pacientov môže byť odlišná nielen účinnosť, ale aj tolerancia, bezpečnosť titrácie a riziko straty svalovej hmoty.

Metodologické zhodnotenie

Silné stránky

- randomizované a dvojito zaslepené usporiadanie s placebom,
- tri dávkové skupiny umožňujúce posúdiť závislosť od dávky,
- multicentrická a medzinárodná realizácia (48 centier v troch krajinách),
- vysoký podiel dokončeného sledovania (94 %) aj zotrvania na liečbe (91 %),
- vopred definovaný primárny ukazovateľ a registrácia štúdie,
- vykazovanie podľa estimandu liečebného režimu, teda konzervatívnejšieho prístupu,
- konzistentný účinok na HbA1c aj telesnú hmotnosť naprieč dávkami.

Hlavné obmedzenia

1. **Krátke sledovanie.** Štyridsať týždňov nestačí na posúdenie dlhodobej bezpečnosti, udržateľnosti hmotnosti ani orgánových výsledkov.
2. **Selektovaná populácia.** Išlo prevažne o pacientov s obezitou a včasným diabetom liečeným iba režimovými opatreniami.
3. **Chýbajúci aktívny komparátor.** Štúdia neumožňuje priame porovnanie so semaglutidom, tirzepatidom ani metformínom.
4. **Obmedzená štatistická sila pre zriedkavé riziká.** Bezpečnostný súbor bol príliš malý na vylúčenie neobvyklých komplikácií.
5. **Bez kardiorenálnych výsledkov.** Zmeny metabolických markerov nie sú náhradou za klinické príhody.
6. **Nejasná udržateľnosť po vysadení.** Štúdia neurčila rozsah opätovného nárastu hmotnosti a zhoršenia glykémie po ukončení liečby.
7. **Chýbajúce údaje o telesnom zložení.** Publikovaný abstrakt neuvádza podiel svalovej a tukovej hmoty na úbytku, čo je pri poklese o 15 % podstatné.
8. **Financovanie výrobcom.** Štúdiu financovala spoločnosť Eli Lilly and Company a časť autorského kolektívu tvoria jej zamestnanci.
9. **Placebom kontrolovaný dizajn môže zvýrazniť dojem účinnosti.** Pre klinické rozhodovanie bude potrebné priame porovnanie s najúčinnnejšími dostupnými liekmi.

Financovanie výrobcom neznamená, že výsledky sú nesprávne. Zvyšuje však význam úplného zverejnenia protokolu, štatistického plánu, individuálnych údajov, nezávislej replikácie a následných aktívne kontrolovaných štúdií.

Vecná kontrola hlavných tvrdení

Tvrdenie	Odborné hodnotenie
Retatrutid aktivuje receptory GIP, GLP-1 a glukagónu	Potvrdené
Pri dávke 12 mg znížil HbA1c o 1,94 percentuálneho bodu	Potvrdené ako zmena oproti východisku podľa estimandu liečebného režimu
Placebom korigovaný pokles HbA1c pri 12 mg bol 1,12 percentuálneho bodu	Potvrdené; 95 % IS –1,39 až –0,85
Pri dávke 12 mg znížil hmotnosť o 15,3 %	Potvrdené ako priemerná zmena oproti východisku
Rozdiel v hmotnosti oproti placebo bol 12,7 percentuálneho bodu	Vlastný orientačný prepočet; publikovaný odhad rozdielu ani interval spoľahlivosti abstrakt neuvádza
Tlačová správa a publikácia uvádzajú rovnaké čísla	Nie; 16,8 % oproti 15,3 % pre hmotnosť – pravdepodobne rozdiel estimandov
Retatrutid je účinnejší než semaglutid alebo tirzepatid	Nedokázané; chýba priame porovnanie (prebieha TRANSCEND-T2D-2)
Retatrutid môže navodiť trvalú remisiu diabetu	Nedokázané
Retatrutid nespôsobuje hypoglykémiu	Závažná hypoglykémia sa nevyskytla pri monoterapii; kombinovaná liečba nebola overená
Retatrutid má preukázanú kardiovaskulárnu ochranu	Nedokázané
Retatrutid chráni obličky	Nedokázané; ani prebiehajúca štúdia pri poruche funkcie obličiek nemá renálny primárny ukazovateľ
Zlepšenie HbA1c a hmotnosti dokazuje zníženie mortality	Nie
Bezpečnostný profil je definitívne známy	Nie; sledovanie bolo krátke a súbor relatívne malý
Výsledky možno preniesť na pacientov s pokročilou CKD alebo na dialýze	Nie
Retatrutid možno získavať ako „výskumný peptid“ na samoliečbu	Takéto produkty nemožno považovať za overené, bezpečné ani farmaceuticky rovnocenné skúšanému lieku

Praktický záver

Retatrutid v štúdiu TRANSCEND-T2D-1 priniesol výrazný pokles HbA1c a telesnej hmotnosti u dospelých s relatívne včasným diabetom 2. typu a prevažne prítomnou obezitou. Pri najvyššej dávke sa HbA1c za 40 týždňov znížil o 1,94 percentuálneho bodu a hmotnosť o 15,3 %.

Výsledky predstavujú významný dôkaz metabolickej účinnosti, nie však dôkaz celkového klinického prínosu. Zatiaľ nevieme, či retatrutid znižuje mortalitu, infarkt myokardu, cievnu mozgovú príhodu, hospitalizácie pre srdcové zlyhávajúce alebo progresiu chronickej choroby obličiek.

Pred určením jeho miesta v liečbe bude potrebné:

- priame porovnanie s aktívnou liečbou,
- dlhodobé bezpečnostné sledovanie,
- kardiovaskulárne a renálne výsledkové štúdie,
- údaje u starších a polymorbídnych pacientov,
- posúdenie vplyvu na svalovú a kostnú hmotu,
- údaje o následkoch ukončenia liečby,
- nezávislé potvrdenie výsledkov.

Retatrutid zostáva skúšanou molekulou. Nie je registrovaný a nemá sa používať prostredníctvom neoverených internetových prípravkov označovaných ako „research peptides“ – tejto téme sa venuje samostatný článok uvedený nižšie.

Súvisiace články

- [Retatrutid prináša výrazný úbytok hmotnosti aj metabolické benefity. Nové dáta však treba čítať opatrne](#)
 - [Retatrutid mimo schválenia: keď experimentálny liek predbehne reguláciu](#)
 - [Tirzepatid a obličkové výsledky v programe SURPASS: čo znamenajú pre nefrológiu](#)
 - [Semaglutid a riziko chronickej choroby obličiek pri diabete 2. typu: porovnanie agonistov receptora GLP-1 v reálnej praxi](#)
 - [Farmakologická liečba obezity u pacientov s pokročilým CKD a na dialýze: praktické dávkovanie, dialyzačné špecifiká a bezpečnosť](#)
-

Zdroje

1. **Bajaj HS, Welch M, Shah P, Luna E, Jaouimaa FZ, Liu B, Liu R, Chen Y, Patel H, Bartee A.** *Efficacy and safety of retatrutide, a GIP, GLP-1, and glucagon receptor agonist, in people with type 2 diabetes and inadequate glycaemic control with diet and exercise (TRANSCEND-T2D-1): a double-blind, randomised, phase 3 trial.* Lancet. 2026;407(10546):2402–2413. doi: 10.1016/S0140-6736(26)00967-0. [Primárna publikácia](#); [PubMed](#).
2. **Eli Lilly and Company.** *A Study of Retatrutide in Participants With Type 2 Diabetes Mellitus (TRANSCEND-T2D-1).* ClinicalTrials.gov, NCT06354660. Inštitucionálny registračný záznam. [Registračný záznam](#).
3. **American Diabetes Association.** *Breakthrough Studies Demonstrate Effectiveness of the First Triple-Hormone Therapy for Type 2 Diabetes and Obesity.* Tlačová správa k 86. Scientific Sessions, New Orleans, 6. júna 2026. Inštitucionálne autorstvo. [Tlačová správa ADA](#).
4. **Eli Lilly and Company.** *Effect of Retatrutide Compared With Semaglutide in Adult Participants With Type 2 Diabetes (TRANSCEND-T2D-2).* ClinicalTrials.gov, NCT06260722. [Registračný záznam](#).
5. **Eli Lilly and Company.** *Effect of Retatrutide Compared With Placebo in Participants With Type 2 Diabetes and Moderate or Severe Renal Impairment (TRANSCEND-T2D-3).* ClinicalTrials.gov, NCT06297603. Primárnym ukazovateľom je zmena HbA1c v 52. týždni. [Registračný záznam](#).
6. **Rosenstock J, Frias J, Jastreboff AM, Du Y, Lou J, Gurbuz S, Thomas MK, Hartman ML, Haupt A, Milicevic Z, Coskun T.** *Retatrutide, a GIP, GLP-1 and glucagon receptor agonist, for people with type 2 diabetes: a randomised, double-blind, placebo and active-controlled, parallel-group, phase 2 trial conducted in the USA.* Lancet. 2023;402(10401):529–544. doi: 10.1016/S0140-6736(23)01053-X. [Štúdiá fázy 2 pri diabete](#); [PubMed](#).
7. **Jastreboff AM, Kaplan LM, Frías JP, Wu Q, Du Y, Gurbuz S, Coskun T, Haupt A, Milicevic Z, Hartman ML.** *Triple-Hormone-Receptor Agonist Retatrutide for Obesity — A Phase 2 Trial.* N Engl J Med. 2023;389(6):514–526. doi: 10.1056/NEJMoa2301972. [Štúdiá fázy 2 pri obezite](#); [PubMed](#).
8. **Coskun T, Urva S, Roell WC, Qu H, Loghin C, Moyers JS, O'Farrell LS, Briere DA, Sloop KW, Thomas MK, a spol.** *LY3437943, a novel triple glucagon, GIP, and GLP-1 receptor agonist for glycemic control and weight loss: from discovery to clinical proof of concept.* Cell Metab. 2022;34(9):1234–1247.e9. doi: 10.1016/j.cmet.2022.07.013. Celkovo 20 autorov. [Farmakologická charakteristika molekuly](#); [PubMed](#).
9. **Medscape Medical News.** *Retatrutide Trims Weight and A1c in Diabetes.* Medscape, 2026. Sekundárny spravodajský zdroj (obsah za prihlásením); individuálny autor nie je v sprístupnenej verzii uvedený. [Spravodajské spracovanie](#).

Poznámka k spracovaniu: Všetky číselné údaje o dizajne, populácii, primárnom a kľúčovom sekundárnom ukazovateli, o rozdieloch oproti placebo vrátane intervalov spoľahlivosti, o prerušeníach liečby a o úmrtiach boli overené priamo proti abstraktu publikácie v časopise Lancet ([PubMed](#), PMID 42250575). Údaje o prebiehajúcich štúdiách TRANSCEND-T2D-2 a TRANSCEND-T2D-3 pochádzajú z registra ClinicalTrials.gov, absolútny úbytok hmotnosti a hodnota 16,8 % z tlačovej správy ADA. Rozdiely v telesnej hmotnosti oproti placebo vyjadrené v percentuálnych bodoch sú vlastným orientačným odčítaním priemerov – publikovaný abstrakt pri hmotnosti neuvádza odhad liečebného rozdielu ani interval spoľahlivosti. Autorstvo a bibliografické údaje všetkých citovaných prác boli overené cez PubMed; mená neboli dopĺňané odhadom.

Poznámka k interpretácii: Retatrutid nie je registrovaným liekom. Tento článok neslúži na odporúčanie liečby ani na porovnávanie s registrovanými prípravkami. Voľbu liečby diabetu 2. typu treba riadiť platnými odbornými odporúčaniami, súhrnom charakteristických vlastností konkrétneho lieku, funkciou obličiek a individuálnym rizikom pacienta.

Zdroj: <https://nefro.polasci.net/article.php?slug=retatrutid-transcend-t2d-1-hba1c-hmotnost-nefrologia> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.