

Sekvenčne, alebo naraz? Ako začať kombinovanú kardio-renálnu liečbu pri diabete 2. typu a chronickej chorobe obličiek

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščíň · Publikované: 28.08.2026

Pri diabete 2. typu s chronickou chorobou obličiek (CKD) dnes máme štyri triedy liekov s dokázaným kardio-renálnym prínosom: blokátor systému renín-angiotenzín, inhibítor SGLT2, nesteroidový antagonistu mineralokortikoidového receptora a agonistu receptora GLP-1. Otázka už nie je, či ich kombinovať, ale **ako začať** — postupne, s odstupom medzi jednotlivými liekmi, alebo viacerými naraz. Diskusia na kongrese ADA 2026 postavila proti sebe obidva prístupy. Pri kritickom čítaní argumentov je však potrebné rozlíšiť, ktoré z nich pochádzajú z priamych dôkazov a ktoré z analógie.

O čo v spore vlastne ide

Argumenty na obidve strany sú racionálne a navzájom sa nevylučujú:

Prístup	Čo hovorí v jeho prospech	Čo je jeho cenou
Sekvenčné začatie	Umožňuje priradiť odpoveď aj nežiaducu udalosť ku konkrétnemu lieku. Dovoľuje individualizovať výber podľa albuminúrie, eGFR, komorbidít a rizika. Zjednodušuje monitorovanie.	Oddaľuje nasadenie zvyšných liekov. Každý krok je príležitosť, aby sa liečba zastavila na polceste — v praxi častý dôvod, prečo pacient nikdy nedostane úplnú kombináciu.
Simultánne začatie	Skracuje čas do plnej nefroprotektie. Znižuje riziko terapeutickú zotrvačnosť. Umožňuje využiť aditívny účinok od začiatku.	Sťažuje priradenie nežiaducej udalosti ku konkrétnemu lieku. Zvyšuje liečebnú záťaž naraz. Vyžaduje dôslednejšie vstupné monitorovanie kália a funkcie obličiek.

Priamy dôkaz: CONFIDENCE

Zo štúdií citovaných v diskusii odpovedá na položenú otázku **priamo iba jedna**. Štúdia CONFIDENCE randomizovala účastníkov s CKD (eGFR 30 – 90 ml/min/1,73 m²), albuminúriou (pomer albumínu ku kreatinínu v moči 100 – 5 000 mg/g) a diabedom 2. typu, ktorí už užívali blokátor systému renín-angiotenzín, v pomere 1 : 1 : 1 na finerenón, empagliflozín alebo ich kombináciu. Primárnym ukazovateľom bola relatívna zmena pomeru albumínu ku kreatinínu v moči od začiatku do 180. dňa.

- Kombinácia znížila albuminúriu **o 29 % viac než samotný finerenón** (pomer najmenších štvorcov 0,71; 95 % IS 0,61 – 0,82; p < 0,001).
- Kombinácia znížila albuminúriu **o 32 % viac než samotný empagliflozín** (0,68; 95 % IS 0,59 – 0,79; p < 0,001).
- Symptomatická hypotenzia, akútne poškodenie obličiek a hyperkaliémia vedúca k ukončeniu liečby boli podľa autorov zriedkavé.

Vopred plánovaná analýza podľa kategórií rizika KDIGO priniesla dva prakticky užitočné doplnky. Prínos kombinácie bol konzistentný naprieč celým spektrom predpokladaného rizika progresie. Hyperkaliémia bola pri kombinácii **častejšia**, no **včasný pokles eGFR o viac než 30 % do 30 dní bol menej častý u pacientov s vyšším rizikom podľa KDIGO** než u pacientov s nižším rizikom. To je v protiklade s bežnou obavou, že práve najrizikovejší pacienti simultánne začatie „neunesú“.

Hranica dôkazu: CONFIDENCE je štúdia fázy 2 s trvaním 180 dní a s **náhradným ukazovateľom** — albuminúriou. Nepreukázala spomalenie progresie CKD, zníženie rizika zlyhania obličiek ani zníženie počtu kardiovaskulárnych príhod. Albuminúria je uznávaný prediktor, ale zníženie albuminúrie nie je totožné so zlepšením tvrdého obličkového ukazovateľa.

Argumenty prevzaté z diabetológie a ich hranice

Zvyšné tri argumenty, ktoré v diskusii zaznievajú v prospech simultánneho začatia, pochádzajú z liečby hyperglykémie, nie z nefroprotektie. To ich nerobí bezcennými, ale mení váhu, ktorú im možno priradiť.

VERIFY: o glykemickej trvácnosti, nie o obličkách

Štúdia VERIFY zaradila 2 001 pacientov s **novodiagnostikovaným** diabetom 2. typu a HbA1c 6,5 – 7,5 %. Porovnala včasnú kombináciu vildagliptínu s metformínom oproti postupnému začatiu metformínom. Výskyt počiatočného zlyhania liečby bol **43,6 % pri včasnej kombinácii oproti 62,1 % pri monoterapii** (pomer rizík 0,51; 95 % IS 0,45 – 0,58; $p < 0,0001$).

Pri prenose tohto výsledku treba byť presný v tom, čo znamená „zlyhanie liečby“: **HbA1c $\geq$ 7,0 % pri dvoch po sebe nasledujúcich návštevách**. Ide teda o stratu glykemickej kontroly, nie o intoleranciu, neadherenciu ani o obličkový ukazovateľ. VERIFY nie je štúdia u pacientov s CKD a netýka sa liekov, o ktorých rozhodujeme pri nefroprotekcii. Podporuje všeobecný princíp „skoršia kombinácia vydrží dlhšie“, nie konkrétne odporúčanie pre kardiorenálnu liečbu.

TRIPLE-AXEL: malá otvorená štúdia s dôležitou nástrahou v porovnávacom ramene

Štúdia TRIPLE-AXEL randomizovala **105 pacientov** s doteraz neliečeným diabetom 2. typu ($\text{HbA1c} \geq 8\%$ a $< 11\%$) na úvodnú trojkombináciu (metformín, dapagliflozín, saxagliptín) alebo na postupné pridávanie. Primárny ukazovateľ — dosiahnutie HbA1c pod 6,5 % bez hypoglykémie, bez vzostupu hmotnosti o $\geq 5\%$ a bez ukončenia liečby pre nežiaduci účinok v 104. týždni — dosiahlo **39,0 % oproti 17,1 %** (rozdiel rizika 22,0; 95 % IS 3,0 – 40,8; $p = 0,027$).

Pri čítaní tohto výsledku sú podstatné tri okolnosti. Po prvé, samotné zníženie HbA1c bolo v oboch ramenách **porovnateľné** ($-2,56\%$ oproti $-2,75\%$); rozdiel v zloženom ukazovateli teda nevznikol z lepšej glykemickej kontroly. Po druhé, v ramene s postupným pridávaním nasledoval po metformíne **glimepirid**, teda derivát sulfonylurey — trieda so známym rizikom hypoglykémie a vzostupu hmotnosti. Zložený ukazovateľ tak do značnej miery odráža voľbu porovnávacieho lieku, nie výhodu simultánneho začatia ako princípu. Po tretie, ide o otvorenú štúdiu so 105 účastníkmi a bez obličkových ukazovateľov.

Metabolická pamäť: koncept z DCCT/EDIC

Argument o „metabolickej pamäti“ vychádza z dlhodobého sledovania štúdie DCCT/EDIC pri diabete **1. typu**, kde sa prínos včasnej intenzívnej glykemickej kontroly prejavoval aj po rokoch, keď sa HbA1c medzi skupinami vyrovnal. Ide o dobre doložený koncept, no týka sa glykémie pri diabete 1. typu. Prenos na otázku, či začať finerenón a inhibítor SGLT2 naraz alebo s odstupom, je analógia, nie dôkaz.

Praktický rámec pre ambulanciu

Z dostupných dôkazov vyplýva rámec, ktorý nie je ani „vždy naraz“, ani „vždy postupne“:

1. **Zotrvačnosť je väčší nepriateľ než rýchlosť.** Pacient, ktorý po roku užíva len blokátor systému renín-angiotenzín, je bežnejší problém než pacient s nežiaducim účinkom kombinácie. Obidve strany diskusie sa zhodujú, že čakať bez dôvodu nemožno.
2. **Simultánne začatie je odôvodnené, keď je zvládnuté monitorovanie.** Predpokladom je vstupné kálium v bezpečnom pásme, známa hodnota eGFR a dohodnutá kontrola s odberom o dva až štyri týždne.
3. **Postupné začatie má zmysel tam, kde je priradenie nežiaducej udalosti kľúčové** — pri hraničnej kaliémii, nestabilnej komorbidite, výraznej polyfarmácii alebo pri pacientovi, u ktorého by jedna zle znášaná zmena ohrozila dôveru v celú liečbu.
4. **Včasný pokles eGFR treba očakávať a vopred vysvetliť.** Pri liekoch zasahujúcich do glomerulovej hemodynamiky ide o predvídateľnú adaptačnú zmenu, ktorá nie je dôvodom na ukončenie liečby. Rozhodujúce je, či sa hodnota stabilizuje — nie samotný fakt, že klesla. Prah, pri ktorom treba liečbu prehodnotiť, sa určuje individuálne, nie podľa jednej univerzálnej hranice.
5. **Poradie nie je ľubovoľné.** Ak sa volí postupný prístup, blokáda systému renín-angiotenzín a inhibítor SGLT2 sú najlepšie doložené a mali by byť prvé; nesteroidový antagonist mineralokortikoidového receptora sa pridáva pri pretrvávajúcej albuminúrii a bezpečnej kaliémii.

Čo zostáva nezodpovedané

Neexistuje randomizovaná štúdia, ktorá by porovnala **simultánne verzus postupné** začatie plnej kardio renálnej kombinácie s **tvrdými obličkovými ukazovateľmi**. CONFIDENCE preukázala väčší účinok kombinácie na albuminúriu, no neporovnávala postupnosť nasadenia v čase, a jej ukazovateľ je náhradný. Kým takáto štúdia nebude k dispozícii, ide o rozhodovanie na základe klinického úsudku podopretého náhradnými ukazovateľmi a analógiami — a to treba pacientovi aj kolegom vedieť takto pomenovať.

Záver

Spor o sekvenčné verzus simultánne začatie je v skutočnosti sporom o to, koľko istoty potrebujeme pred konaním. Priamy dôkaz existuje pre **súčasné nasadenie finerenónu a empagliflozínu**, a je priaznivý — ale ide o zníženie albuminúrie v štúdiu fázy 2. Argumenty prevzaté z diabetológie (VERIFY, TRIPLE-AXEL, DCCT/EDIC) hovoria o glykemickej kontrole a na obličkové ukazovatele sa prenášajú len ako analógia. Najlepšie podložené odporúčanie je preto skromnejšie, než by sa z diskusie mohlo zdať: nečakať zbytočne, začínať tak, ako to bezpečnostný profil konkrétneho pacienta dovoľuje, a monitorovať dôsledne bez ohľadu na zvolený postup.

Súvisiace články

- [Kombinačná liečba CKD: štyri piliere a hranice dôkazov](#)
- [Finerenón a empagliflozín v štúdiu CONFIDENCE: albuminúria a krvný tlak](#)
- [Optimalizácia blokády RAAS a MRA pri hyperkaliémii, CKD a srdcovom zlyhávaní](#)
- [Chronická choroba obličiek pri diabete: včasný skrining a vrstvená kardio renálna liečba](#)
- [Finerenón ako základná liečba pri CKD a glomerulových ochoreniach](#)

Odborné zdroje

1. Východiskový materiál: Medscape. *Sequential or Simultaneous Therapy in CKD — Which Approach Is Best? Diskusia z kongresu ADA 2026 Scientific Sessions*; menovaní diskutujúci Ian de Boer a Amy Mottl. Východiskový materiál; všetky odborné tvrdenia a číselné údaje boli overené podľa primárnych publikácií uvedených nižšie.

2. CONFIDENCE: Agarwal R, Green JB, Heerspink HJL, Mann JFE, McGill JB, Mottl AK, Rosenstock J, Rossing P, Vaduganathan M, Brinker M, Edfors R, Li N, Scheerer MF, Scott C, Nangaku M; CONFIDENCE Investigators. *Finerenone with Empagliflozin in Chronic Kidney Disease and Type 2 Diabetes*. *New England Journal of Medicine*. 2025;393(6):533–543. doi: [10.1056/NEJMoa2410659](#). PMID 40470996. [PubMed](#). Registrácia: [NCT05254002](#).

3. CONFIDENCE, analýza podľa rizika KDIGO: Vaduganathan M, Green JB, Heerspink HJL, Kim SG, Mann JFE, McGill JB, Mottl A, Nangaku M, Rosenstock J, Rossing P, Li L, Li N, Rohwedder K, Scott C, Agarwal R. *Simultaneous initiation of finerenone and empagliflozin across the spectrum of kidney risk in the CONFIDENCE trial*. *Nephrology Dialysis Transplantation*. 2026;41(1):161–170. doi: [10.1093/ndt/gfaf160](#). PMID 40886054. [Plný text](#).

4. VERIFY: Matthews DR, Paldanius PM, Proot P, Chiang Y, Stumvoll M, Del Prato S; VERIFY study group. *Glycaemic durability of an early combination therapy with vildagliptin and metformin versus sequential metformin monotherapy in newly diagnosed type 2 diabetes (VERIFY): a 5-year, multicentre, randomised, double-blind trial*. *Lancet*. 2019;394(10208):1519–1529. doi: [10.1016/S0140-6736\(19\)32131-2](#). PMID 31542292. [PubMed](#). Registrácia: [NCT01528254](#).

5. TRIPLE-AXEL: Kim NH, Moon JS, Lee YH, Cho HC, Kwak SH, Lim S, Moon MK, Kim DL, Kim TH, Ko E, Lee J, Kim SG. *Efficacy and tolerability of initial triple combination therapy with metformin, dapagliflozin and saxagliptin compared with stepwise add-on therapy in drug-naïve patients with type 2 diabetes (TRIPLE-AXEL study): A multicentre, randomized, 104-week, open-label, active-controlled trial*. *Diabetes, Obesity and Metabolism*. 2024;26(9):3642–3652. doi: [10.1111/dom.15705](#). PMID 38853720. [PubMed](#).

6. DCCT/EDIC: Nathan DM. *Realising the long-term promise of insulin therapy: the DCCT/EDIC study*. *Diabetologia*. 2021;64(5):1049–1058. doi: [10.1007/s00125-021-05397-4](#).

Poznámka k dôkazovému základu: Bibliografické údaje, autorské zoznamy, veľkosti súborov, definície ukazovateľov a všetky číselné výsledky boli overené 28. augusta 2026 cez PubMed a Crossref zo štruktúrovaných abstraktov primárnych publikácií. Zaradenie štúdií VERIFY, TRIPLE-AXEL a DCCT/EDIC medzi nepriame dôkazy, upozornenie na derivát sulfonylurey v porovnávacom ramene štúdie TRIPLE-AXEL a na náhradný charakter ukazovateľa štúdie CONFIDENCE nie sú prevzaté od diskutujúcich; ide o hodnotenie doplnené pri spracovaní.

Text má odborný informačný charakter a nenahrádza individuálne klinické rozhodovanie ani platné odporúčania. Pri začatí kombinovanej liečby treba rešpektovať kontraindikácie, sledovať koncentráciu draslíka a funkciu obličiek a postupovať podľa aktuálnej informácie o lieku.

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=sekvencna-simultanna-kombinovana-liecba-diabetes-ckd> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.