


Nitrofurantoín vs. fosfomycín: čo ukazuje nová španielska štúdia pri nekomplikovanej cystitíde u žien

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 27.05.2026



Poloschematická vizualizácia. Viacdňová liečba proti jednorazovej dávke — pohodlie stojí proti spoľahlivosti účinku.

Nekomplikované infekcie dolných močových ciest (UTI, typicky akútna cystitída) patria u žien medzi najčastejšie dôvody predpisovania antibiotík. Nová randomizovaná štúdia porovnala tri antibiotické stratégie a ukázala, že **5-dňový nitrofurantoín** dosahuje lepšie klinické výsledky než **jednorazový fosfomycín**. Rozdiely oproti alternatívam existujú, no celkovo boli všetky režimy účinné a bezpečné.

Dizajn štúdie a populácia

Štúdia bola realizovaná v podmienkach primárnej starostlivosti v Španielsku. Zaradených bolo **768 žien vo veku 34 až 63 rokov** (medián veku 48 rokov) z **34 praxí** medzi aprílom 2022 a novembrom 2024.

Všetky účastníčky mali typické príznaky UTI (pálenie pri močení, urgencia, časté močenie alebo bolesť nad lonovou kosťou) a pozitívny močový test na **nitrit alebo leukocytový esterázu**. Zároveň malo **57 %** pozitívnu kultiváciu moču.

Ženy boli randomizované do štyroch skupín:

1. **Jednorazový fosfomycín:** 1 × 3 g
2. **Fosfomycín v 2 dávkach:** 2 × 3 g s odstupom 24 hodín
3. **Nitrofurantoín:** 100 mg trikrát denne počas **5 dní**
4. **Pivmecillinam:** 400 mg trikrát denne počas **3 dní**

Autori zámerne nepoužili „širokospektrálne“ antibiotiká.

Primárny cieľ

Primárnym ukazovateľom bolo, aké percento pacientok dosiahlo **klinické vymiznutie príznakov do 7. dňa**.

Pre primárnu analýzu boli dostupné dáta od **720** z **768** účastníčok.

Výsledky účinnosti

Na 7. deň mala **najnižšiu účinnosť** skupina s jednorazovým fosfomycínom: symptomaticky bez ťažkostí bolo len **59 %** pacientok.

Najlepšie dopadol **nitrofurantoín**:

- **74 %** pacientok bez príznakov po 1 týždni

Nasledovali:

- **Pivmecillinam**: 70 %
- **Fosfomycín v 2 dávkach**: 67 %

Podobné trendy sa pozorovali aj pri hodnoteniach na **14. a 28. deň** a v podskupine s východiskovou pozitívnou kultiváciou moču.

Nežiaduce účinky a bezpečnosť

Nežiaduce udalosti sa vyskytli u pätiny až štvrtiny pacientok v závislosti od režimu:

- jednorazový fosfomycín: **19,9 %**
- fosfomycín v 2 dávkach: **26,3 %**
- nitrofurantoín: **26,8 %**
- pivmecillinam: **21,2 %**

Väčšina nežiaducich účinkov boli **mierne, samovoľne prechodné gastrointestinálne príznaky**.

Zaznamenali sa **4 závažné nežiaduce udalosti**, z ktorých len jedna sa javila ako súvisiaca s liečbou: **pyelonefritída** v skupine pivmecillinam.

Čo z toho vyplýva

Autori uzatvárajú, že výsledky podporujú predchádzajúce zistenia, podľa ktorých je **fosfomycín menej účinný v jednorazovom režime** než nitrofurantoín. V praktickom zmysle to znamená, že podľa tejto štúdie by sa mala uprednostniť **niekoľkodňová antibiotická liečba pred jednorazovým režimom fosfomycínu**, najmä ak sa sleduje klinické vymiznutie príznakov na 7. deň.

Medscape zároveň uvádza, že počet zaradených pacientok pravdepodobne nebol dostatočný na jemnejšie rozlíšenie menších rozdielov medzi všetkými režimami.

Zdroj: Medscape (príbeh o španielskej randomizovanej štúdii v *The Lancet*). [Kliknite sem](#).

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=nitrofurantoin-vs-fosfomycin-pri-nekomplikovanej-cystitide-u-zien> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.