

Urán a obličky: chemická nefrotoxicita, radiačné poškodenie a riziká environmentálnych kovov

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 15.08.2026

Súhrn

Urán je prirodzene sa vyskytujúci rádioaktívny aktinoid a zároveň toxický kov. Pri bežnej environmentálnej expozícii, najmä po dlhodobom príjme z kontaminovanej podzemnej alebo studničnej vody, predstavuje pre obličky spravidla väčší problém jeho chemická toxicita než rádioaktivita. Najcitlivejším miestom sú bunky proximálneho tubulu. Vysoká dávka rozpustných zlúčenín uránu môže vyvolať akútne tubulárne poškodenie až akútne poškodenie obličiek; pri dlhodobej nízkej expozícii sa opisujú jemné poruchy tubulárnej funkcie a zmeny biomarkerov. Dôkaz, že bežná nízka environmentálna expozícia sama osebe často vedie ku klinicky manifestnému zlyhaniu obličiek, však zostáva neúplný. Nové observačné štúdie z roku 2025 naznačili asociáciu aj pri koncentráciách pod súčasným limitom 30 µg/l, ale zatiaľ nedokazujú príčinnosť ani neurčujú novú bezpečnú hranicu.

Radiačná nefropatia je odlišný mechanizmus. Vzniká po podstatne vyššej absorbovanej dávke ionizujúceho žiarenia do obličiek, typicky pri rádioterapii, celotelovom ožiarení alebo niektorých rádionuklidových liečbach, nie pri obyčajnom dotyku s kusom prírodného či ochudobneného uránu. Rádium sa ukladá najmä do kostí a radón poškodzuje predovšetkým pľúca; ich úloha pri chronickej chorobe obličiek nie je presvedčivo preukázaná. Spomedzi nerádioaktívnych kovov majú najlepšie doloženú nefrotoxicitu kadmium, olovo a anorganická ortuť.

Dve toxicity toho istého prvku

Pri uráne treba od začiatku oddeliť dva druhy rizika:

1. **Chemická toxicita uranylového iónu a ďalších rozpustných foriem uránu.** Závisí najmä od hmotnostnej dávky, chemickej formy, rozpustnosti, cesty vstupu a rýchlosti vylučovania. Cieľovým orgánom sú obličky.
2. **Rádiologická toxicita.** Závisí od izotopového zloženia, aktivity v becquereloch, druhu žiarenia, biokinetiky a absorbovanej dávky v tkanive. Prirodzený aj ochudobnený urán sú prevažne alfa žiariče. Alfa častice majú veľmi malý dosah a neprechádzajú cez neporušenú kožu, po vdýchnutí, prehltnutí alebo zanesení do rany však môžu ožarovať tkanivo z bezprostrednej blízkosti.

Tieto veličiny nie sú zameniteľné. Údaj v µg/l vyjadruje hmotnostnú koncentráciu, kým Bq/l počet rádioaktívnych premien za sekundu v litri. Rovnaká hmotnosť rôznych izotopov preto nemusí mať rovnakú aktivitu. Naopak, chemická toxicita jednotlivých izotopov uránu je pri rovnakej chemickej forme v zásade podobná.

Ochudobnený urán má približne 60 % rádioaktivity prírodného uránu na jednotku hmotnosti, nie je však chemicky „zneškodnený“. Jeho toxicita ako kovu zostáva porovnateľná. Obohatený urán alebo zmesi s vyšším podielom izotopov s vyššou špecifickou aktivitou prinášajú väčšiu rádiologickú zložku rizika.

Ako sa urán dostáva do organizmu

Pitná voda a potrava

Najvýznamnejšou environmentálnou cestou je pitie vody zo zdroja, v ktorom sa urán uvoľňuje z horninového podlažia alebo z banských a priemyselných rezíduí. Riziko je typické najmä pre niektoré podzemné zdroje a súkromné studne; vzhľad, chuť ani zápach vody ho spoľahlivo neodhalia. WHO odhaduje priemernú gastrointestinálnu absorpciu uránu približne na 1 až 2 %, pričom závisí od rozpustnosti zlúčeniny a ďalších podmienok. Väčšina prehltnutého uránu teda odíde stolicou, no absorbovaná časť prechádza do krvi, kostí a obličiek.

Sprchovanie alebo kúpanie vo vode s uránom nie je porovnateľné s jej dlhodobým pitím. Preniknutie cez neporušenú kožu je malé. Výnimkou môže byť pracovný kontakt s koncentrovanými rozpustnými zlúčeninami, poškodená koža alebo kontaminovaná rana.

Vdýchnutie prachu a aerosólu

K expozícii dochádza v baniach, pri spracovaní rudy a paliva, pri brúsení alebo požiarí materiálu s obsahom uránu a po náraze munície z ochudobneného uránu. Rozpustné inhalované zlúčeniny sa môžu vstrebávať do krvi a zasiahnuť obličky. Málo rozpustné oxidy zostávajú dlhšie v pľúcach, preto sa pri nich zvyšuje význam lokálneho pľúcneho a rádiologického rizika.

Kontaminovaná rana a zadržané kovové fragmenty

Fragmenty ochudobneného uránu v mäkkých tkanivách vytvárajú neobvyklú dlhodobú vnútornú expozíciu. Urán sa z fragmentu môže pomaly uvoľňovať a roky sa objavovať v moči. Tridsaťročné sledovanie malej kohorty veteránov s vysokou expozíciou však preukázalo iba málo klinicky významných nálezov v typických cieľových orgánoch; pretrvávali skôr signály súvisiace s kostným metabolizmom. Tento výsledok je upokojujúci, ale pre malý a špecifický súbor sa nedá jednoducho preniesť na všetky expozičné situácie.

Vonkajší kontakt

Samotný krátky dotyk s kovovým uránom bez kontaminácie prachom, poranenia alebo požitia nie je pravdepodobnou príčinou zlyhania obličiek. Pri externom ožiarení sú dôležitejšie prenikavejšie beta a gama zložky a dcérske produkty rozpadového radu. Praktické posúdenie preto musí vychádzať z merania kontaminácie a dávky, nie iba zo slovného údaja, že človek bol „pri uráne“.

Prečo je proximálny tubulus najzraniteľnejší

Po vstupe do krvi sa rozpustný urán vyskytuje najmä v podobe komplexov uranylového iónu. Časť sa filtruje v glomeruloch a koncentruje v kôre obličky. Viaz sa na kefkový lem proximálnych tubulov a vstupuje do buniek okrem iného endocytózou a cez sodíkovo-fosfátový kotransportér NaPi-IIa.

Experimentálne údaje podporujú viacero vzájomne prepojených mechanizmov:

- poruchu mitochondriálneho prenosu elektrónov a pokles membránového potenciálu,
- tvorbu reaktívnych foriem kyslíka a oxidačný stres,
- poškodenie DNA a narušenie jej opravy,
- stres endoplazmatického retikula,
- aktiváciu dráh Nrf2 a NF- κ B, zápalovej odpovede, apoptózy a pri vyššej dávke nekrózy,
- poruchu transportu glukózy, fosfátu, aminokyselín a nízkomolekulových bielkovín.

Výsledkom býva najmä poškodenie segmentov S2 a S3 proximálneho tubulu. Pri ťažkej intoxikácii sa pridáva pokles glomerulovej filtrácie, akútna tubulárna nekróza, intersticiálny zápal a potenciálne nezvratná strata funkčných nefrónov. Pri nižšej dávke môže byť prvým prejavom iba zmena tubulárnych biomarkerov bez vzostupu kreatinínu.

Klinický obraz

Akútna vysoká expozícia

Akútna intoxikácia rozpustnou zlúčeninou uránu môže viesť k:

- proteinúrii, najmä tubulárneho typu,
- normoglykemickej glykozúrii, aminoacidúrii a fosfatúrii,
- strate bikarbonátu, urátu a ďalších solútov, teda k neúplnému alebo úplnému obrazu Fanconiho syndrómu,
- poruche koncentračnej schopnosti obličiek,
- vzostupu sérového kreatinínu a rozvoju AKI,
- poruchám vnútorného prostredia a v najťažších prípadoch k potrebe náhrady funkcie obličiek.

Tubulárne bunky majú určitú regeneračnú schopnosť. Po zastavení expozície môže dôjsť k čiastočnému alebo výraznému zotaveniu, najmä po ľahšom poškodení. Ťažká nekróza, opakovaná expozícia alebo súčasná hypovolémia, sepsa a ďalšie nefrotoxíny však zvyšujú riziko prechodu do chronickej choroby obličiek.

Chronická nízka alebo stredná expozícia

Chronická expozícia sa nemusí prejavíť príznakmi. Skôr než eGFR sa môžu meniť ukazovatele proximálneho tubulu, napríklad β 2-mikroglobulín v moči, retinol viažuci proteín, α 1-mikroglobulín, N-acetyl- β -D-glukozaminidáza, frakčná exkrécia fosfátu alebo vápnika. Tieto markery však nie sú špecifické pre urán a ich interpretáciu ovplyvňujú pH moču, koncentrácia moču, vek, hypertenzia, diabetes, iné kovy a preexistujúce ochorenie obličiek.

Preto platí dôležitá zásada: **zvýšený urán v moči dokazuje expozíciu, nie automaticky poškodenie obličiek; abnormálny tubulárny marker dokazuje poškodenie, nie automaticky jeho uránovú príčinu.**

Fanconiho syndróm a jeho vzťah k uránu

Fanconiho syndróm je generalizovaná porucha reabsorpcie v proximálnom tubule, nie Fanconiho anémia. Za **úplný obraz** sa považuje súčasná porucha viacerých transportných funkcií: normoglykemická glykozúria, generalizovaná aminoacidúria, fosfatúria s hypofosfatémiou, bikarbonatúria vedúca k proximálnej renálnej tubulárnej acidóze typu 2, urikozúria s hypourikémiou a nízkomolekulová proteinúria. Pridružiť sa môžu straty sodíka, draslíka, vápnika a horčíka, polyúria, polydipsia, dehydratácia, svalová slabosť a pri dlhšom trvaní rachitída u detí alebo osteomalácia a zlomeniny u dospelých. **Neúplný alebo parciálny Fanconiho obraz** znamená, že je prítomná iba časť porúch, napríklad izolovaná nízkomolekulová proteinúria s fosfatúriou, normoglykemická glykozúria alebo bikarbonátové straty, pričom eGFR môže byť ešte normálna. Univerzálny minimálny počet znakov pre „neúplný“ syndróm nie je ustálený. Uránom vyvolaná proximálna tubulopatia môže sama vytvoriť neúplný až úplný získaný Fanconiho fenotyp. Rovnaký obraz však spôsobujú aj tenofovir, ifosfamid, cisplatina, aminoglykozidy, monoklonové gamapatie, cystinóza a ďalšie dedičné choroby či iné toxické kovy. Fanconiho laboratórny obraz teda uránové poškodenie nielen napodobňuje, ale môže byť aj jeho priamym prejavom; bez preukázanej expozície a vylúčenia iných príčin neurčuje etiológiu. Pozri zdroje 37 a 38.

Čo ukazujú štúdie u ľudí

Epidemiologické údaje nie sú jednotné.

Staršie štúdie ľudí používajúcich vodu z vrtov s vyššou koncentráciou uránu našli slabé zmeny frakčnej exkrécie vápnika a fosfátu alebo nízkomolekulových bielkovín, často bez poklesu glomerulovej filtrácie. Následná fínska štúdia z roku 2006 nenašla presvedčivé cytotoxické poškodenie obličiek ani pri pomerne vysokej dlhodobej expozícii. Práve tieto údaje podporili súčasnú dočasnú smernú hodnotu WHO 30 μ g/l.

Systematický prehľad a metaanalýza z roku 2024 zahrnuli 36 štúdií. Nezistili zvýšenú mortalitu na nádory obličiek ani chronickú nefritídu alebo nefrózu v uránom exponovaných populáciách. Väčšinu súborov však tvorili pracovníci, takže výsledok mohol skresliť efekt zdravého pracovníka; analýza funkčných biomarkerov bola nepresná pre malý počet štúdií a účastníkov.

V roku 2025 pribudli dva dôležité, ale zatiaľ nie definitívne signály:

- V podskupine 461 účastníkov štúdie MESA bez diabetu, CKD a kardiovaskulárneho ochorenia bola vyššia koncentrácia uránu v moči spojená s vyššími hodnotami KIM-1 a MCP-1, nie však s eGFR, albuminúriou ani viacerými ďalšími tubulárnymi biomarkermi.
- V prospektívnej California Teachers Study so 88 185 ženami bola vyššia dlhodobá koncentrácia uránu vo verejnej pitnej vode spojená s vyšším rizikom hospitalizačne zachytenej stredne ťažkej až terminálnej CKD. Pri 10 až menej ako 15 μ g/l bolo relatívne riziko oproti koncentrácii pod 2 μ g/l vyššie približne o tretinu. Štúdia však nepoznala individuálnu spotrebu vody, mala obmedzenú prenosnosť na mužov a iné populácie a ako observačná štúdia nemôže sama dokázať príčinnosť.

Nové výsledky preto spochybňujú predstavu úplne bezrizikovej expozície pod 30 μ g/l, ale ešte neopravňujú tvrdenie, že voda s 10 až 30 μ g/l nevyhnutne poškodzuje obličky alebo že limit treba bez ďalšieho zmeniť. Potrebne sú replikácie, individuálna biomonitorácia, opakované meranie funkcie obličiek a lepšia kontrola súbežných kontaminantov.

Urán v pitnej vode: limit nie je biologický prah

WHO v aktuálnom vydaní smerníc naďalej uvádza dočasnú smernú hodnotu **30 μ g/l**, odvodenú pre chemickú,

nie rádiologickú toxicitu. Označenie „dočasná“ odráža neistotu toxikologických a epidemiologických údajov. WHO zároveň upozorňuje, že sa nepodarilo spoľahlivo určiť koncentráciu bez akéhokoľvek účinku.

Na Slovensku vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z. z. stanovuje pre urán chemickú najvyššiu medznú hodnotu **30 µg/l**. Od 13. januára 2026 sa skrining prítomnosti rádionuklidov vykonáva stanovením celkovej objemovej aktivity alfa; pri výsledku nad 0,1 Bq/l sa určujú jednotlivé rádionuklidy podľa predpisov radiačnej ochrany. Poznámka vyhlášky považuje za prekročenie aj výsledok U-238 nad 0,3 Bq/l, ktorý uvádza ako ekvivalent 24 µg/l. Hmotnostná koncentrácia a objemová aktivita však nie sú zameniteľné veličiny. Pri konkrétnom náleze preto treba zohľadniť laboratórnu metódu, izotopové zloženie a výklad príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Prekročenie limitu nie je dôkazom, že už vzniklo poškodenie obličiek, ale je dôvodom na potvrdenie výsledku, vyšetrenie zdroja a obmedzenie dlhodobej expozície. Rovnako koncentrácia tesne pod limitom nie je zárukou nulového individuálneho rizika. Pre dojčatá, tehotné osoby, pacientov s CKD alebo jedinou funkčnou obličkou alebo súbežnou expozíciou ďalším nefrotoxínom je rozumný opatrnejší prístup, hoci presný osobitný prah pre tieto skupiny nie je určený.

Varenie urán z vody neodstráni; odparenie ho môže koncentrovať. Účinná býva reverzná osmóza, aniónová výmena a niektoré centrálné úpravárenské postupy. Zariadenie musí byť určené na daný kontaminant, odborné prevádzkované a jeho účinnosť treba potvrdiť analýzou vody po úprave. Zachytený urán sa koncentruje vo filtri alebo regeneráte, preto sa musí bezpečne zneškodniť.

Urán a prirodzená rádioaktivita na území Slovenska a Česka

Ako správne čítať mapy

Geologická mapa výskytu uránu nie je mapou poškodenia obličiek. Medzi uránonosnou horninou a dávkou prijatou človekom stoja hydrogeológia, rozpustnosť konkrétnych zlúčenín, úprava vody, prašnosť, spôsob využitia územia, čas expozície a individuálne správanie. Na úrovni Slovenska ani Česka nie je k dispozícii validovaná mapa prípadov „uránovej nefropatie“. Nasledujúce mapy preto zobrazujú **geogénny expozičný potenciál**, historickú alebo súčasnú banskú a sanačnú záťaž a regionálne radiačné pozadie. Nezobrazujú individuálnu dávku, koncentráciu v konkrétnej studni ani zdravotný následok.

Slovensko

Uránové zrudnenia na Slovensku sú viazané na geologicky pestré prostredie Západných Karpát. Odborná literatúra historicky eviduje viac ako 40 ložísk a výskytov v siedmich oblastiach. Najvýraznejší pás leží vo východnej časti Slovenského rudohoria. Patrí sem **Novoveská Huta** pri Spišskej Novej Vsi, kde sa urán v minulosti dobýval, a **Kurišková**, označovaná aj podľa blízkej Jahodnej, približne 7 km severozápadne od Košíc. Kurišková je významné preskúmané, ale neťažené ložisko.

Ďalšie uránové alebo uránovo-molybdénové prejavy sú známe v oblasti **Kálnice v Považskom Inovci**, pri **Dúbrave v Nízkych Tatrách**, na **Vikartovskom chrbte** a lokálne v ďalších kryštalinických, sedimentárnych a vulkanických komplexoch. Environmentálny význam konkrétnej lokality sa nedá odvodiť iba z tonáže ložiska. Pre človeka môže byť dôležitejší menší, ale rozpustnejší zdroj napojený na používanú podzemnú vodu alebo staré banské dielo než veľké, mineralogicky pevne viazané ložisko bez expozičnej cesty.

Česko

České krajiny majú vzhľadom na rozsiahle granitoidné a metamorfované komplexy Českého masívu početnejšie uránové revíry a dlhšiu históriu ťažby. Medzi hlavné patria **Jáchymov**, **Horní Slavkov**, **Zadní Chodov**, **Příbram**, **Stráž pod Ralskem** a **Hamr na Jezeře**, **Rožná** a **Dolní Rožínka**, **Okrouhlá Radouň** a juhočeské spracovateľské a odkaliskové areály pri **Mydlovaroch**. **Brzkov** je preskúmané, no pri príprave tejto syntézy neťažené ložisko.

Komerčná ťažba uránu sa v Česku skončila 31. decembra 2016. Štátny podnik DIAMO však naďalej vykonáva likvidáciu a sanáciu starých baní, chemickej ťažby a odkalísk; urán sa môže získavať ako vedľajší produkt sanačných vôd v Stráži pod Ralskem a pri čistení banských vôd v oblastiach Příbrami a Rožnej. Ide o kontrolované priemyselné situácie, nie o dôkaz plošnej expozície obyvateľstva.

Český právny limit uránu v pitnej vode je **15 µg/l**, teda nižší než slovenských a WHO odporúčaných 30 µg/l.

Rozdiel medzi limitmi neznamená rozdielnu biologickú citlivosť obyvateľstva. Ide o odlišné národné regulačné rozhodnutie v oblasti neistoty a realizovateľnosti úpravy vody. Český Štátny ústav radiačnej ochrany upozorňuje, že pri podzemných vodách môže byť zvýšená celková alfa aktivita často spôsobená práve uránom. Verejné zdroje podliehajú kontrole; lokálne najväčšiu informačnú medzeru predstavujú individuálne studne bez pravidelnej analýzy.

Urán na území Slovenska a Česka

Hlavné ložiskové oblasti, historická ťažba a lokality so sanačnou alebo expozičnou relevanciou



Mapa nevysleduje výskyt ochorení. Zobrazuje potenciálne zdroje expozície a geologické prostredie; riziko vody alebo človeka sa musí merať.

Zdroje: ŠGÚDŠ, DIAMO, ČGS, SÚRO; regionálne geologické a bansko-sanačné podklady citované v článku.

Kartografická syntéza: OpenAI, 11. 7. 2026. Hranice štátov: Natural Earth, CC0.

© nefro.polascin.net

Výberová regionálna syntéza uránových oblastí, historickej ťažby a sanačných lokalít na Slovensku a v Česku. Mapa neurčuje koncentráciu v konkrétnej vode ani individuálne zdravotné riziko.

Radón: plošná mapa je iba prvý filter


Na Slovensku bola oficiálna mapa radónového rizika zostavená z 9 219 referenčných plôch. V použitej databáze bolo 36,7 % plôch zaradených do nízkeho, 63,0 % do stredného a 0,3 % do vysokého radónového rizika. Lokálne vysoké hodnoty sa vyskytujú napríklad pri uránonosných dolomitoch v okolí Brezovej pod Bradlom a Vrbového, v oblasti Kálnice, pri novobanských ryolitoch, v častiach Nízkych Tatier a najrozsiahlejšie v pásme Spišsko-gemerského rudohoria medzi Spišskou Novou Vsou, Rožňavou a Košicami. Bodové anomálie sú známe aj inde, preto farebná kategória regiónu nevylučuje problém na konkrétnej parcele.

V Česku je priemerná objemová aktivita radónu v obydliach približne **118 Bq/m³**, čo krajinu radí medzi štáty s vyššou priemernou vnútornou expozíciou. Zvýšený potenciál je rozšírený najmä v granitoidných a metamorfovaných oblastiach Českého masívu. Geologická prognóza však nevie nahradiť dlhodobé meranie v budove. Prienik radónu ovplyvňujú pukliny, priepustnosť podložia, základy, tlakové pomery, vetranie aj stavebné úpravy.

Z nefrologického hľadiska je podstatné, že tieto mapy nepredstavujú mapy rizika zlyhania obličiek. Radón je predovšetkým dokázaný pľúcny karcinogén. Súčasné epidemiologické údaje neposkytujú presvedčivý dôkaz, že by bežná domová expozícia radónu bola samostatnou príčinou CKD.

Radónový potenciál Slovenska a Česka

Regionálna syntéza geologického potenciálu a vybrané overené anomálne lokality



Mapa nenahrádza meranie radónu v budove ani radónový index konkrétneho pozemku. Stavebná konštrukcia a vetranie môžu výsledok zásadne zmeniť.

Zdroje: ŠGÚDŠ, Mapa prognózy radónového rizika SR; ČGS a Radónový program ČR. Kategórie sú harmonizované iba orientačne.

Kartografická syntéza: OpenAI, 11. 7. 2026. Hranice štátov: Natural Earth, CCG.

© nefro.polascin.net

Orientačná regionálna syntéza radónového potenciálu Slovenska a Česka. Nenahrádza dlhodobé meranie v budove ani radónový index konkrétneho pozemku.


Prirodzené gama pozadie a ďalšie rádionuklidy

Terestrické gama pozadie nevytvára iba urán. Významne k nemu prispievajú **draslík-40**, uránové a tóriové rozpadové rady a geochemické vlastnosti hornín a pôd. V Česku sa v celoštátnej rádiometrickej syntéze uvádza príkon absorbovanej dávky terestrického gama žiarenia vo vzduchu približne **6 až 245 nGy/h**, s priemerom **65,6 ± 19 nGy/h**; 90 % hodnôt ležalo medzi 31 a 88 nGy/h. Zvýšené hodnoty sú viazané napríklad na stredočeský plutón, Karlovarsko a Jáchymovsko, krkonošsko-jizerské granitoidy a niektoré masívy Vysočiny. Nízke hodnoty sa častejšie objavujú na pieskovcoch, kremencoch a niektorých bázických horninách.

Na Slovensku oficiálna rádiometrická mapa zvyrazňuje najmä kryštalinické a vulkanické komplexy, vrátane častí Nízkych Tatier, novobanských ryolitov a Spišsko-gemerského rudohoria. V použitých verejných podkladoch však nebola nájdená jednotná, metodicky porovnateľná celoštátna priemerná hodnota, preto mapa používa kvalitatívne triedy a nepredstiera presnosť, ktorú zdroje neposkytujú. Európsky atlas prirodzenej rádioaktivity je vhodný na regionálne porovnanie, nie na posúdenie domu, studne alebo pracoviska.

Prirodzené terestrické gama pozadie

Orientačná regionálna úroveň podmienená najmä 40K, uránovým a tóriovým rozpadovým radom



Farebné plochy sú regionálnou syntézou, nie odčítateľnou dozimetriou. Lokálnu dávku ovplyvňuje hornina, pôda, nadmorská výška, stavba a meracia metodika.

Zdroje: ŠGÚDŠ; ČGS radiometrická mapa 1 : 500 000; EC-JRC European Atlas of Natural Radiation. Český rozsah: 6–245 nGy/h, priemer 65,6 nGy/h.

Kartografická syntéza: OpenAI, 11. 7. 2026. Hranice štátov: Natural Earth, CC0.

© nefro.polascin.net

Orientačná regionálna syntéza prirodzeného terestrického gama pozadia. Farebné plochy nie sú odčítateľnou dozimetriou ani mapou poškodenia obličiek.

Urán, radón a prirodzená rádioaktivita v Európskej únii

Rozsah a obmedzenia európskych máp

Európsky atlas prirodzenej rádioaktivity, ktorý spravuje Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (EC-JRC), harmonizuje údaje s rozdielnym pôvodom a kvalitou. Mapa uránu v pôde používa sieť 10 × 10 km, mapa uránu v horninovom podloží priemery v geologických jednotkách a mapa radónu priemerné ročné koncentrácie namerané v prízemných miestnostiach, agregované do siete 10 × 10 km. Pôvodné merania zostávajú u národných poskytovateľov a európska mapa sa aktualizuje nepravidelne. Posledná uvedená aktualizácia mapy vnútorného radónu je z 11. novembra 2024.

Nasledujúce mapy zobrazujú európske územie 27 členských štátov EÚ. Najvzdialenejšie zámorské regióny nie sú zahrnuté do hlavného výrezu a malé ostrovné štáty majú obmedzenú kartografickú čitateľnosť. Farebné plochy sú odbornou regionálnou syntézou atlasových a národných údajov, nie reprodukciou odčítateľnej dátovej vrstvy. Neumožňujú určiť koncentráciu v studni, dávku obličiek ani počet ochorení.

Uránové oblasti a banské dedičstvo EÚ


Geogénne zvýšené koncentrácie uránu sa v EÚ viažu najmä na staré kryštalinické masívy, granitoidy, metamorfované komplexy, niektoré permské vulkanosedimentárne panvy a lokálne pieskovcové ložiská. Výraznejšie oblasti tvoria **Iberský masív** v Portugalsku a západnom Španielsku, **Armorický a Centrálny masív** vo Francúzsku, **Český masív a Krušné hory** na styku Česka, Nemecka, Poľska a Rakúska, **Fenoscandijský štít** vo Švédsku a Fínsku a karpatsko-balkánske komplexy Slovenska, Maďarska, Rumunska a Bulharska.

Mapa vyznačuje iba reprezentatívny výber významných oblastí. K najväčším historickým a sanačným komplexom patria Urgeiriça v Portugalsku, Saelices el Chico a Andújar v Španielsku, francúzske lokality v Limousine a ďalších oblastiach, nemecké komplexy Wismut v Sasku a Durínsku, české revíry, poľské Kowary, maďarský Mecsek, slovinský Žirovski vrh, rumunské oblasti Crucea, Băița a Banát a bulharské Buhovo. Vo Francúzsku Orano uvádza stovky bývalých lokalít pod environmentálnym dohľadom; v Nemecku pokračuje rozsiahla sanácia Wismut. V Česku sa urán získava už iba ako vedľajší produkt sanačných a banských vôd. Historická ťažba alebo existencia odkaliska automaticky neznamená súčasnú expozíciu obyvateľov, ale je

dôvodom na dlhodobý monitoring vôd, prachu, radónu a potravinového reťazca.

Urán v Európskej únii

Vybrané ložiskové oblasti, historická ťažba, spracovanie a dlhodobá sanácia



1 historická ťažba alebo sanácia	2 úpravňa alebo odkaliska	3 ťažba a neťažené ložisko v jednej oblasti	4 širšie uránonosné prostredie
1 Urgeirica a Nisa, Portugalsko	2 Saelices el Chico, Španielsko	3 Andújar, Španielsko, úpravňa	4 Limousin a Bernardan, Francúzsko
5 Vendée a západ Francúzska	6 Ronneburg a Seelingstädt, Nemecko	7 Aue a Schlema, Nemecko	8 Königstein, Nemecko
9 Jáchymov, Česko	10 Příbram, Stráž a Rožná, Česko	11 Kowary, Poľsko	12 Novoveská Huta a Kurišková, Slovensko
13 Mecsek, Maďarsko	14 Žirovski vrh, Slovinsko	15 Crucea a Băița, Rumunsko	16 Banát a Ciudanovița, Rumunsko
17 Buhovo, Bulharsko	18 Ranstad, Švédsko	19 Paukkajavaara, Fínsko	20 Sillamäe, Estónsko, spracovanie

Mapa je výberovou regionálnou syntézou. Nezobrazuje všetky výskyt ani zdravotné prípady a neumožňuje odhadnúť koncentráciu v konkrétnej vode alebo dávku človeka.

Zdroje: IAEA UDEPO; EC-JRC European Atlas of Natural Radiation; Wismut, Orano, DIAMO a národné bansko-sanačné podklady citované v článku.

Kartografická syntéza: OpenAI, 11. 7. 2026. Hranice štátov: Natural Earth, CC0. Zobrazené je európske územie 27 členských štátov EÚ; najvzdialenejšie regióny nie sú v hlavnom výreze.

© nefro.polascin.net

Výberová regionálna syntéza uránonosných oblastí, historickej ťažby, spracovania a sanácie v EÚ. Nezobrazuje všetky lokality ani individuálnu expozíciu.


Radón v EÚ

Vyššie priemerné vnútorné koncentrácie a geogénny potenciál sa vyskytujú mozaikovo v Iberskom masíve, Bretónsku a Centrálnom masíve, Ardenách, Schwarzwalde, Krušných horách a Českom masíve, v častiach Rakúska a Álp, vo Fénoskandii, v slovensko-rumunskom karpatskom oblúku, Slovinsku, Chorvátsku a lokálne na Balkáne. Aj v prevažne nízkorizikovom regióne môže jednotlivá budova dosiahnuť vysokú koncentráciu a naopak. Rozhodujúce je dlhodobé meranie v používanej miestnosti.

Smernica 2013/59/Euratom vyžaduje, aby členské štáty stanovili národnú referenčnú úroveň ročného priemeru radónu v budovách, ktorá nemá byť vyššia ako **300 Bq/m³**, prijali národné radónové akčné plány a identifikovali oblasti, kde sa očakáva prekročenie referenčnej úrovne vo významnom počte budov. Ide o referenčnú úroveň na riadenie a znižovanie expozície, nie o ostrú hranicu medzi bezpečnosťou a poškodením.

Radónový potenciál Európskej únie

Regionálna syntéza meraní v obydliach a geologického potenciálu podľa EC-JRC



■ nižší, neurčený alebo zmiešaný potenciál

■ stredný regionálny potenciál

■ vyšší regionálny potenciál alebo častejšie vysoké merania

Výraznejšie oblasti sa viažu najmä na granitoidy, metamorfované komplexy, uránonosné horniny a priepustné tektonické poruchy.

Výsledok v budove však zásadne menia základy, plynica, tesnosť prestupov, tlakové pomery a vetranie.

Farebné plochy nie sú odčítateľné v Bq/m³ a nesmú sa používať ako náhrada dlhodobého merania v konkrétnej miestnosti.

Hranice tried sú harmonizované iba orientačne. Mapa nevyjadruje riziko ochorenia obličiek; radón je predovšetkým dokázaný pľúcny karcinogén.

Zdroje: EC-JRC European Indoor Radon Map, aktualizácia 11. 11. 2024; European Atlas of Natural Radiation, kapitola 5; národné radónové mapy.

Kartografická syntéza: OpenAI, 11. 7. 2026. Hranice štátov: Natural Earth, CC0. Zobrazené je európske územie 27 členských štátov EÚ; najvzdialenejšie regióny nie sú v hlavnom výreze.

© nefro.polascin.net

Orientačná regionálna syntéza radónového potenciálu v EÚ podľa údajov EC-JRC. Koncentráciu v konkrétnej budove možno určiť iba meraním.


Prirodzené terestrické gama pozadie v EÚ

Terestrické gama žiarenie pochádza najmä z draslíka-40 a uránových a tóriových rozpadových radov. Zvýšené regionálne hodnoty sa častejšie viažu na granitoidy Iberského, Armorického, Centrálného a Českého masívu, Fenoskandijský štít, časti Álp, Karpát a Balkánu. Nižšie hodnoty bývajú v mladých sedimentárnych panvách a nížinách, napríklad v častiach severoeurópskej nížiny, Panónskej panvy a Pádskej nížiny. Tieto vzťahy majú početné lokálne výnimky.

Mapa terestrického gama pozadia nie je mapou celkovej ročnej efektívnej dávky. Nezahrňa automaticky radón v budove, kozmické žiarenie, medicínske vyšetrenia ani vnútorný príjem rádionuklidov. Európska vrstva navyše kombinuje údaje vyjadrené podľa štátu ako príkon absorbovanej dávky alebo okolitého dávkového ekvivalentu, pričom JRC upozorňuje na metodické rozdiely a potrebu harmonizácie.

Prirodzené terestrické gama pozadie v EÚ

Kvalitatívna regionálna syntéza príspevku 40K a uránových a tóriových rozpadových radov



■ nižšie pozadie: mladé sedimentárne panvy a nížiny ■ typické až stredné pozadie ■ zvýšené pozadie: granitoidy a U-Th-K bohaté komplexy

JRC kombinuje harmonizované údaje do siete 10 × 10 km, ale presnosť sa medzi štátmi líši podľa zdroja a kalibrácie meraní.

Terestrické gama pozadie nie je totožné s celkovou dávkou: nezahŕňa automaticky radón v budove, kozmické žiarenie ani medicínske expozície.

Na lokálne posúdenie treba použiť kalibrované meranie príkonu dávky a podľa otázky spektrometriu K, U a Th.

Farby sú regionálnou syntézou a nie odčítateľnou dozimetriou. Lokálnu hodnotu mení hornina, pôda, vlhkosť, nadmorská výška, stavba a meracia metodika.

Zdroje: EC-JRC European Atlas of Natural Radiation, Terrestrial Gamma Dose Rate, Uranium/Thorium/Potassium in soil and bedrock.

Kartografická syntéza: OpenAI, 11. 7. 2026. Hranice štátov: Natural Earth, CC0. Zobrazené je európske územie 27 členských štátov EÚ; najvzdialenejšie regióny nie sú v hlavnom výreze.

© nefro.polascin.net

Orientačná regionálna syntéza prirodzeného terestrického gama pozadia v EÚ. Nezahŕňa automaticky radón v budovách, kozmické žiarenie ani medicínske expozície.

Pitná voda a európske regulačné minimum

Smernica 2013/51/Euratom stanovuje pre rádioaktívne látky v pitnej vode parametrickú hodnotu **100 Bq/l pre radón, 100 Bq/l pre trícium a 0,10 mSv za rok pre indikatívnu dávku** z relevantných rádionuklidov.

Odporúčané skríningové úrovne sú 0,1 Bq/l pre celkovú alfa aktivitu a 1,0 Bq/l pre celkovú beta aktivitu; prekročenie vedie k stanoveniu konkrétnych rádionuklidov. Členské štáty môžu pre radón vo vode určiť národnú hodnotu vyššiu než 100 Bq/l, najviac však 1 000 Bq/l.

EÚ nemá jednotnú chemickú koncentráciu uránu v pitnej vode porovnateľnú so smernou hodnotou WHO 30 µg/l. Členské štáty preto používajú vlastné chemické limity alebo posudzujú urán prostredníctvom národných vodárenských a radiačno-hygienických pravidiel. To vysvetľuje, prečo sa česká hodnota 15 µg/l líši od slovenskej hodnoty 30 µg/l bez toho, aby išlo o rozdielnu biologickú citlivosť populácií.

Kedy poškodzuje obličky samotné ionizujúce žiarenie

Radiačná nefropatia je samostatná klinicko-patologická jednotka. Po dostatočnej dávke žiarenia vzniká poškodenie glomerulových a peritubulárnych endoteliálnych buniek, mikrovaskulárne zmeny, trombotická mikroangiopatia, glomeruloskleróza, tubulárna atrofia a intersticiálna fibróza. Klinicky sa po latencii mesiacov až rokov objavuje hypertenzia, proteinúria, pokles GFR a niekedy anémia.

ICRP uvádza približný prah klinicky významnej reakcie celej obličky okolo 7 až 8 Gy pri akútnej expozícii a približne 18 až 20 Gy pri dávke rozdelenej do 2-Gy frakcií. Tieto hodnoty vychádzajú najmä z rádioterapie a nemožno ich mechanicky prepočítať na nerovnomerné ožiarenie alfa časticami z vnútorného kontaminantu. Poskytujú však dôležitú mierku: absorbované dávky schopné vyvolať klasickú radiačnú nefropatiu sú spravidla rádovo vyššie než dávky obličiek z bežného príjmu prírodného uránu v životnom prostredí. Pri takejto

environmentálnej expozícii preto dominuje chemická nefrotoxicita.

Rádium, radón a ďalšie prírodné rádionuklidy

Rádium

Rádium vzniká v rozpadových radoch uránu a tória a môže sa nachádzať v horninách, banských odpadoch aj podzemnej vode. Chemicky sa podobá vápniku a po absorpcii sa ukladá najmä do kostí. Historicky jednoznačne doloženými následkami vysokej vnútornej expozície boli poškodenie kostí, osteosarkómy a nádory niektorých štruktúr hlavy. Oblička nie je jeho klasickým cieľovým orgánom a dostupné údaje nepodporujú rádium ako bežnú príčinu tubulopatie alebo CKD. Pri masívnej kontaminácii môže byť súčasťou celkovej radiačnej záťaže, no mechanizmus a distribúcia sa zásadne líšia od uránu.

Radón

Radón je rádioaktívny plyn vznikajúci najmä z rádia v zemskej kôre. Hlavnou cestou expozície je vdýchnutie radónu a jeho krátkožijúcich dcérskych produktov v budovách a baniach; najlepšie dokázaným následkom je karcinóm pľúc. Metaanalýza observačných štúdií nenašla jasnú asociáciu s karcinómom obličky a dôkazy o radóne ako príčine CKD alebo zlyhania obličiek chýbajú. Radón rozpustený vo vode sa pri sprchovaní a používaní vody uvoľňuje do vzduchu; po prehltnutí sa radiačná dávka týka skôr tráviaceho traktu než selektívne obličiek.

Ostatné rádionuklidy

Tórium, polónium, rádionuklidy cézia a stroncia či transurány majú odlišnú biokinetiku. Stroncium a rádium sú prevažne kostné depozitá, cézium sa distribuuje v mäkkých tkanivách a niektoré izotopy polónia alebo plutónia sa hromadia v pečeni, kostiach a ďalších orgánoch. Pri veľkej vnútornej kontaminácii alebo celotelovom ožiarení môže vzniknúť multiorgánové poškodenie vrátane AKI. To však nie je dôkaz, že nízka prirodzená koncentrácia týchto prvkov v prostredí je častou samostatnou príčinou chronického zlyhania obličiek.

Porovnanie s ďalšími nefrotoxickými kovmi

Kov alebo metaloid	Typický zdroj	Prevažujúci obličkový účinok	Poznámka
Kadmium	tabakový dym, hutníctvo, batérie, kontaminovaná potrava a voda	chronická proximálna tubulopatia, nízkomolekulová proteinúria, Fanconiho syndróm, pokles GFR	kumuluje sa veľmi dlho; tubulopatia zvyšuje straty vápnika a fosfátu a môže zhoršiť kostné ochorenie
Olovo	staré nátery a potrubia, batérie, priemysel, strelnice	akútna proximálna tubulopatia; chronická tubulointersticiálna nefritída, hypertenzia, hyperurikémia	vyššie riziko pri dlhodobej pracovnej expozícii a súbežných kardiovaskulárnych faktoroch
Anorganická ortuť	priemysel, niektoré tradičné prípravky a krémy, nehody	akútne tubulárne poškodenie až AKI; pri chronickej expozícii aj glomerulárne ochorenie, napríklad membranózna nefropatia	metylortuť je primárne neurotoxická; klinika závisí od chemickej formy
Arzén	kontaminovaná podzemná voda, hutníctvo, pesticídne rezíduá	pri vysokej dávke AKI; pri chronickej expozícii možná asociácia s albuminúriou a CKD	epidemiologické výsledky pri nízkej dávke sú heterogénne a často ich mätú ďalšie kontaminanty
Chrómov VI	galvanizácia, pigmenty, kožiarsky a kovospracujúci priemysel	pri akútnej vysokej expozícii akútna tubulárna nekróza a AKI	chróm III má inú biologickú úlohu a toxicitu; rozhoduje oxidačný stav

Kov alebo metaloid	Typický zdroj	Prevažujúci obličkový účinok	Poznámka
Urán	geologické podložie a studne, bane, jadrový cyklus, ochudobnený urán	proximálna tubulopatia; pri vysokej dávke AKI, pri chronickej expozícii možné skoré tubulárne zmeny a riziko CKD	pri bežnej environmentálnej expozícii je chemické riziko pre obličky významnejšie než radiačné

Zmesi kovov môžu pôsobiť aditívne, synergicky alebo niekedy menej než aditívne. Pri kontaminovanej vode preto nestačí vyšetriť iba urán; podľa geologického a priemyselného kontextu treba zvážiť arzén, kadmium, olovo, chróm, mangán, rádium a ďalšie látky.

Praktický návod pre klinického nefrológa

U ktorých pacientov treba cielene myslieť na environmentálnu alebo pracovnú nefrotoxicitu

Plošný skrining uránu alebo všetkých kovov u každého pacienta s CKD nie je odôvodnený. Cielené vyšetrenie má najvyššiu výťažnosť vtedy, keď sa spája **kompatibilný obličkový fenotyp s vierohodnou expozičnou cestou** a primeraným časovým vzťahom.

Klinická situácia	Prečo je podozrivá	Bezprostredný praktický krok
Nová normoglykemická glykozúria, hypofosfatémia, hypourikémia, hyperchloremická acidóza alebo nízkomolekulová proteinúria	typický proximálny tubulárny alebo Fanconiho fenotyp, ktorý môže vyvolať urán, kadmium, olovo, ortuť aj lieky	súčasne odobrať krv a moč na kreatinín, glukózu, fosfát, urát, bikarbonát a elektrolyty; vypočítať frakčné exkrécie a cielene doplniť expozičnú anamnézu
Celková proteinúria je zreteľne vyššia než albuminúria	bežný močový prúžok a ACR môžu prehliadnuť tubulárne nízkomolekulové bielkoviny	doplniť PCR, α 1- alebo β 2-mikroglobulín v moči, elektroforézu a pri dospelom aj vyšetrenie monoklonálnej gamapatie
Nevysvetlené AKI po pracovnej nehode, požiari, demolácii, brúsení, tavení, expozícii prachu, chemikáliám alebo kontaminovanej vode	môže ísť o akútnu vysokú expozíciu rozpustnému uránu, chrómu VI, anorganickej ortuti, kadmiumu, arzénu alebo zmesi látok	stabilizovať pacienta, kontaktovať toxikológa a pracovné lekárstvo, uchovať vhodné vzorky ešte pred dialýzou alebo veľkou infúznou liečbou, ak to neodkladá urgentnú starostlivosť
Nevysvetlená CKD alebo tubulointersticiálne ochorenie u pracovníka v rizikovitom odvetví	chronické expozície bývajú klinicky tiché a eGFR klesá neskoro	vypracovať pracovný časový profil, získať výsledky pracovného biomonitoringu a vybrať biomarker podľa konkrétneho kovu
CKD u používateľa individuálnej studne v uránonosnej, banskej alebo priemyselne zaťaženej oblasti	podzemná voda môže obsahovať urán, arzén, rádium, mangán alebo zmes kovov bez zmeny chuti a zápachu	analyzovať samotnú vodu v akreditovanom laboratóriu; miesto bydliska bez analýzy vody nie je dôkazom expozície
Hypertenzia, hyperurikémia alebo dna s chronickou tubulointersticiálnou nefritídou a expozíciou olova	klasická, hoci nešpecifická kombinácia pri chronickej olovinatej nefropatii	stanoviť olovo vo venóznej plnej krvi a pátrať po pracovnom, hobby alebo domácom zdroji
Tubulopatia s bolesťami kostí, osteomaláciou, zlomeninami alebo výraznou fosfatúriou	dlhodobé straty fosfátu sú typické pre Fanconiho fenotyp; kadmium súčasne poškodzuje tubuly a kostný metabolizmus	doplniť fosfátový metabolizmus, vitamín D, PTH, ALP, frakčnú exkréciu fosfátu a cieleň test kadmia
AKI alebo proteinúria spolu s tremorom, eretizmom, poruchou citlivosti, stomatitídou alebo expozíciou ortuti	anorganická ortuť môže poškodiť tubuly aj glomeruly; neurologické prejavy posilňujú expozičnú hypotézu	podľa formy expozície odobrať moč alebo plnú krv na ortuť a konzultovať toxikológa

Klinická situácia	Prečo je podozrivá	Bezprostredný praktický krok
AKI s gastrointestinálnymi ťažkosťami, neuropatiou, kožnými zmenami alebo epidemiologickou väzbou na vodu a arzén	vysoká expozícia arzénu môže spôsobiť multiorgánovú toxicitu; chronická expozícia má systémové prejavy	odobrať moč na celkový arzén a špeciáciu, zaznamenať konzumáciu morských živočíchov a vyšetriť vodu
Nová hypertenzia, proteinúria, anémia a pokles GFR po ožiarení oboch obličiek, celotelovom ožiarení alebo vybranej rádionuklidovej liečbe	kompatibilný obraz radiačnej nefropatie s latenciou mesiacov až rokov	vyžiadať rádioterapeutický plán a orgánovú dozimetriu, overiť dávku do každej obličky a vylúčiť trombotickú mikroangiopatiu a iné príčiny
Zadržaný kovový fragment po zásahu alebo výbuchu, najmä s podozrením na ochudobnený urán	fragment môže predstavovať dlhodobý vnútorný zdroj, hoci riziko závisí od zloženia, rozpustnosti a polohy	neodstraňovať automaticky; vykonať zobrazovanie, toxikologické a chirurgické posúdenie a organizovať močový urán s izotopovým pomerom
Viacerí podobne postihnutí ľudia zo spoločného pracoviska, domácnosti alebo vodného zdroja	zhluk zvyšuje pravdepodobnosť spoločnej environmentálnej príčiny	koordinovať verejné zdravotníctvo, pracovné lekárstvo, toxikológiu a akreditované environmentálne odbery

Samotné bývanie v oblasti označenej na mape ako uránonosná alebo radónová, nešpecifická únava, izolovane zvýšený kreatinín alebo pozitívny komerčný vlasový test predstavujú **nízkú predtestovú pravdepodobnosť**. Bez kompatibilného fenotypu a overenej expozičnej cesty môžu široké panely viesť k falošne pozitívnym výsledkom a nesprávnej chelatacii.

Expozičná anamnéza, ktorú sa oplatí viesť systematicky

Nefrológ má zaznamenať nielen názov povolania, ale konkrétnu činnosť, materiál, ochranné pomôcky, vetranie, dĺžku práce a čas od poslednej expozície. Dôležité sú najmä:

- baníctvo, razenie tunelov, geologický prieskum, drvenie rudy, sanácia baní a odkalísk, jadrový palivový cyklus a práca s fosfátmi;
- hutníctvo, zváranie, galvanizácia, chrómovanie, výroba pigmentov, skla, keramiky, batérií, elektroniky a recyklácia elektroodpadu;
- strelnice, odlievanie závaží a projektíl, brúsenie starých náterov, renovácie, vitráže, glazúry a hobby chémia;
- vojenská služba, zásahové miesta, požiare skladov, munícia, kovové fragmenty a prašné demolácie;
- zdroj pitnej vody, hĺbka a vek studne, sezónnosť, úprava vody, predchádzajúce rozbory a používanie vody na varenie;
- fajčenie a pasívne fajčenie, ktoré sú významným zdrojom kadmia a mätúcim faktorom pri jeho biomonitorovaní;
- ryby a morské plody, tradičné a ajurvédské prípravky, neoverené doplnky, bieliace krémy, keramické nádoby a domáca destilácia;
- lieky schopné vyvolať Fanconiho fenotyp, najmä tenofovir, ifosfamid, cisplatina, aminoglykozidy a niektoré staršie tetracyklíny;
- rádioterapia, celotelové ožiarenie pred transplantáciou, rádionuklidová liečba a dostupná orgánová dozimetria.

Časový údaj je rozhodujúci. Krvný marker môže odrážať posledné dni alebo týždne, močový marker buď nedávnu expozíciu, alebo pri niektorých kovoch telesnú nálož. Výsledok odobratý dlho po ukončení práce nemusí rekonštruovať historickú dávku.

Praktický postup pri prvej nefrologickej návšteve

1. **Najprv klasifikovať poškodenie.** Určiť AKI, AKD alebo CKD, tlak, objemový stav a urgentné komplikácie. Expozícia nesmie odvieť pozornosť od sepsy, obštrukcie, glomerulonefritídy, rabdomyolýzy alebo liekovej toxicity.

2. **Odobrat' základný párový profil krvi a moču.** Kreatinín, urea, glukóza, sodík, draslík, chloridy, bikarbonát alebo ABR, fosfát, horčík, vápnik a urát; v tom istom čase moč na chemické vyšetrenie, sediment, glukózu, kreatinín, albumín a celkovú bielkovinu.
3. **Vyhodnotiť proximálny tubulus.** ACR porovnať s PCR, vypočítať frakčné exkrécie fosfátu a urátu a podľa obrazu sodíka, draslíka a horčíka. Doplniť α 1- alebo správne odobratý β 2-mikroglobulín v moči. Pri nevysvetlenej fosfatúrii možno vypočítať tubulárnu reabsorpciu fosfátu alebo TmP/GFR.
4. **Vylúčiť bežnejšie napodobeniny.** HbA1c, lieky, sérová a močová imunofixácia a voľné ľahké reťazce podľa veku a obrazu, autoimunitná diagnostika podľa kliniky a ultrazvuk obličiek a močových ciest.
5. **Až potom vybrať toxikologický test.** Test sa volí podľa konkrétnej látky a času od expozície, nie ako univerzálny „panel ťažkých kovov“. Pred neobvyklým odberom treba telefonicky potvrdiť materiál, nádobu, konzerváciu, transport, akreditáciu metódy a referenčné medze.
6. **Zdroj vyšetrit' oddelene od pacienta.** Voda, pracovný prach, náter alebo doplnok výživy sú environmentálne vzorky. Výsledok zdroja podporuje expozičnú cestu, ale nenahrádza biomonitorovanie ani dôkaz poškodenia obličiek.
7. **Naplánovať dynamiku.** Opakovať kreatinín, elektrolyty, ACR/PCR a tubulárne ukazovatele po odstránení zdroja. Zlepšenie po deexpozícii podporuje kauzalitu, ale nie je samo osebe špecifické.

Cielený biomonitoring podľa podozrivej látky

Podozrivá látka	Preferovaný biologický test	Čo výsledok približne odráža	Najdôležitejšie úskalie
Urán	celkový urán v moči pomocou ICP-MS, podľa situácie 24-hodinový zber alebo bodová vzorka s kreatinínom; izotopový pomer	vnútornú, prevažne nedávnu alebo pokračujúcu expozíciu; izotopový pomer môže určiť typ uránu	bežné slovenské klinické laboratória test rutinne neponúkajú; metóda pre vodu nie je automaticky validovaná pre ľudský moč
Olovo	olovo vo venóznej plnej krvi	recentnú a pokračujúcu expozíciu, nie presnú celoživotnú kostnú nálož	kapilárny skrining sa môže kontaminovať; „provokovaný“ moč po chelátore nie je diagnostický test
Kadmium	kadmium v moči korigované na kreatinín a kadmium v plnej krvi	moč pri stabilnej funkcii obličiek skôr kumulatívnu telesnú nálož, krv recentnú expozíciu	fajčenie zvyšuje hodnoty; pokročilé tubulárne poškodenie a zmenená GFR komplikujú interpretáciu močového kadmia
Anorganická alebo elementárna ortuť	ortuť v moči, často 24-hodinovom alebo korigovanom na kreatinín	expozíciu anorganickej a elementárnej ortuti	vzorka a čas odberu sa majú dohodnúť pred liečbou; forma ortuti rozhoduje o vhodnom médiu
Metylortuť	ortuť v plnej krvi, podľa potreby špeciácia	nedávnu expozíciu organickej ortuti, najmä z potravy	celková ortuť bez špeciácie môže miešať potravinový a pracovný zdroj; vlas nie je vhodný univerzálny klinický test nefrotoxicity
Arzén	arzén v moči so špeciáciou, bodová vzorka s kreatinínom alebo 24-hodinový zber	nedávnu expozíciu a po špeciácii toxikologicky relevantné anorganické formy a metabolity	morské živočíchy môžu výrazne zvýšiť netoxické organické formy; treba zaznamenať stravu a podľa pokynu laboratória odber zopakovať po ich vynechaní
Chrómovi	chróm v moči, prípadne v krvi, pri jasnej nedávnej pracovnej udalosti	najmä recentnú expozíciu	neexistuje spoľahlivý biomarker dávnej nízkej expozície ani test, ktorý by sám dokázal renálnu kauzalitu
Radón	dlhodobé meranie objemovej aktivity v budove; pri pracovnej expozícii osobná alebo pracovisková dozimetria	expozíciu v priestore, nie „hladinu radónu v obličke“	krvný alebo močový test radónu nemá úlohu v bežnej nefrologickej diagnostike; súvis s CKD nie je preukázaný

Podozrivá látka	Preferovaný biologický test	Čo výsledok približne odráža	Najdôležitejšie úskalie
Vonkajšie ionizujúce žiarenie	rádioterapeutický plán, osobný dozimeter, rekonštrukcia orgánovej dávky	absorbovanú dávku do obličiek	všeobecný údaj o „ožiarení“ bez dávky, objemu obličky a frakcionácie nestačí na diagnózu radiačnej nefropatie

Ako formulovať záver o príčinnej súvislosti

Za **silnú klinickú podporu** uránovej alebo kovovej nefrotoxicity možno považovať kompatibilný tubulárny či glomerulový fenotyp, analyticky potvrdenú vnútornú expozíciu, jasný zdroj, vhodný časový vzťah, vyššiu expozíciu než v referenčnej populácii a neprítomnosť pravdepodobnejšej príčiny. **Možná súvislosť** znamená kompatibilný fenotyp a zdroj, ale chýbajúce alebo oneskorené biomonitorovanie. **Nepravdepodobná súvislosť** je vtedy, keď existuje iba geologická lokalita alebo nevalidovaný test bez expozičnej cesty a bez typického obličkového obrazu.

Negatívny močový urán mesiace po jednorazovej expozícii nemusí historickú udalosť vylúčiť. Naopak, merateľný urán v moči môže pochádzať z bežnej potravy a vody a sám nedokazuje poškodenie. Kauzálny záver sa preto nemá opierať o jeden výsledok.

Kedy konať urgentne

Urgentná toxikologická a nefrologická koordinácia je potrebná pri oligoanúrii, rýchlom vzostupe kreatinínu, ťažkej acidóze, hyperkaliémii, symptomatickej hypokalémii alebo hypofosfatémii, pľúcnom poškodení po inhalácii kovového dymu, neurologických príznakoch, hemolýze, šoku, masívnom požití alebo kontaminovanej rane. Dialýza sa indikuje podľa klinických komplikácií AKI; nemožno predpokladať, že spoľahlivo odstráni kov uložený v tkanivách. Chelátor alebo alkalizácia moču sa nemajú začínať empiricky bez identifikácie látky a toxikologickej konzultácie.

Laboratórne vyšetrenia a biomonitorovanie na Slovensku

Nasledujúci prehľad vychádza z verejne dostupných katalógov a laboratórnych príručiek slovenských nemocničných a súkromných pracovísk, skontrolovaných k 11. júlu 2026. Dostupnosť sa môže meniť podľa odberového miesta, indikujúcej odbornosti, zmluvy so zdravotnou poisťovňou a preanalytických podmienok. Uvedenie vyšetrenia v katalógu preto nie je zárukou, že ho možno vykonať bez žiadanky alebo v každom odberovom mieste.

Vyšetrenie alebo skupina markerov	Klinický význam	Reálna dostupnosť na Slovensku	Praktické obmedzenie
Kreatinín, eGFR, urea	glomerulová funkcia a závažnosť AKI alebo CKD	rutinne dostupné v nemocničných aj súkromných laboratóriách po celom Slovensku	normálny kreatinín nevylučuje skorú proximálnu tubulopatiu; eGFR nie je validovaná pri rýchlej zmene kreatinínu
Cystatín C, prípadne eGFR z cystatínu C	doplnenie odhadu GFR pri neistej interpretácii kreatinínu	stanovenie cystatínu C uvádzajú katalógy veľkých sietí Medirex, Unilabs a SYNLAB; automatický výpočet eGFR závisí od pracoviska	koncentráciu cystatínu C ovplyvňujú zápal, funkcia štítnej žľazy, kortikosteroidy a ďalšie faktory; nie je markerom špecifickým pre urán ani proximálny tubulus
Sodík, draslík, chloridy, fosfát, horčík, vápnik, urát, glukóza a kreatinín v sére a moči	dôkaz renálnych strát a výpočet frakčných exkrecií	široko dostupné; Medirex a Unilabs verejne uvádzajú aj viaceré vypočítané frakčné exkrecie	krv a moč sa majú odobrať časovo čo najbližšie; výsledok menia infúzie, diuretiká, výživa a aktuálna GFR

Vyšetrenie alebo skupina markerov	Klinický význam	Reálna dostupnosť na Slovensku	Praktické obmedzenie
Bikarbonát alebo acidobázická rovnováha	proximálna tubulárna acidóza, hyperchloremická metabolická acidóza s normálnym aniónovým rozdielom	rutinne dostupné najmä v nemocničných a väčších biochemických laboratóriách	vzorka na ABR vyžaduje anaeróbny odber a rýchle spracovanie; oneskorenie môže výsledok znehodnotiť
Moč chemicky, sediment, glukóza v moči, celková bielkovina, kreatinín, ACR a podľa pracoviska pomer proteín/kreatinín (PCR)	glykozúria pri normálnej glykémii, albuminúria, tubulárna alebo zmiešaná proteinúria	rutinná celoštátna dostupnosť; ACR a základný močový profil uvádzajú Medirex aj Unilabs	bežný prúžok reaguje najmä na albumín a môže podhodnotiť nízkomolekulovú tubulárnu proteinúriu
α1-mikroglobulín v moči	stabilnejší marker nízkomolekulevej tubulárnej proteinúrie	je uvedený vo verejnom katalógu Medirexu; dostupnosť treba potvrdiť pre konkrétne odberové miesto	nie je špecifický pre urán; interpretuje sa vo vzťahu ku kreatinínu v moči a celému klinickému obrazu
β2-mikroglobulín v moči	citlivý marker poruchy proximálnej reabsorpcie nízkomolekulových bielkovín	aktuálny cenník SYNLAB platný od 1. januára 2026 ho uvádza pre moč; uvádzal ho aj verejný katalóg Unilabs. Vykonanie a podmienky odberu treba vopred overiť	v kyslom moči je nestabilný; laboratórium musí určiť vhodnú nádobu, úpravu pH, teplotu a čas transportu. Sérový β 2-mikroglobulín nemožno zamieňať s močovým tubulárnym markerom
Retinol viažuci proteín a N-acetyl-β-D-glukozaminidáza v moči	doplnkové markery proximálnej tubulopatie	v preskúmaných verejných katalógoch neboli potvrdené ako všeobecne rutinné; možné je individuálne referenčné alebo zahraničné vyšetrenie	pred odberom treba dohodnúť laboratórium, metódu, stabilitu vzorky a referenčné medze
Aminokyseliny v moči	generalizovaná aminoacidúria pri úplnom Fanconiho syndróme	dostupné skôr ako špecializovaný metabolický profil na vybraných pediatrických, genetických alebo akademických pracoviskách	nejde o bežný skriningový močový test; indikáciu a odber má koordinovať nefrológ alebo lekár pre metabolické choroby
KIM-1, MCP-1 a močový NGAL	experimentálne alebo kontextovo používané markery tubulárneho poškodenia a zápalu	v preskúmaných verejných katalógoch neboli doložené ako štandardný klinický panel pre uránovú expozíciu; môžu byť dostupné vo výskumnom alebo individuálnom režime	pre uránovú intoxikáciu nemajú validované diagnostické prahy; pozitívny výsledok nie je dôkazom uránovej príčiny
Urán v moči metódou ICP-MS a izotopový pomer	dôkaz vnútornej expozície a rozlíšenie prírodného, ochudobneného alebo obohateného uránu	vo verejných slovenských klinických katalógoch sa nenašlo rutinne objedateľné vyšetrenie; musí sa vopred koordinovať s klinickým toxikológom, pracovným lekárstvom a pracoviskom radiačnej ochrany, prípadne odoslať do zahraničného referenčného laboratória	laboratórium musí mať validovanú metódu pre ľudský moč , nie iba pre vodu alebo pôdu; treba dohodnúť typ zberu, korekciu na kreatinín, medzu stanoviteľnosti, kontrolu kontaminácie a interpretáciu času od expozície

Analýza uránu v pitnej vode je na Slovensku dostupnejšia prostredníctvom akreditovaných environmentálnych

laboratórií, ale výsledok vody nemožno zameniť za biomonitorovanie človeka. Voda dokladá možný zdroj a koncentráciu v čase odberu; moč dokladá vnútornú expozíciu ovplyvnenú príjmom, absorpciou, časom a funkciou obličiek. Pri klinickom podozrení je preto praktické najprv zabezpečiť rutinný nefrologický a proximálny tubulárny profil, uchovať vhodnú vzorku podľa pokynov toxikológa a až potom organizovať špecializované stanovenie uránu.

Biomonitorovanie uránu

Urán v moči, ideálne stanovený metódou ICP-MS, je najpraktickejší marker vnútornej expozície. Pri akútnej expozícii má zmysel časovaný alebo 24-hodinový zber po konzultácii s toxikológom. Izotopový pomer môže odlíšiť prírodný, ochudobnený a obohatený urán. Interpretácia musí zohľadniť čas od expozície, koncentráciu moču a funkciu obličiek. Bežné nemocničné laboratória vyšetrenie spravidla nevykonávajú.

Meranie uránu vo vlasoch bez validovaného odberu, kontroly externej kontaminácie a toxikologickej interpretácie nie je vhodné na diagnostiku nefrotoxicity. Rovnako nevhodné je robiť záver z nešpecifického komerčného „panelu ťažkých kovov“ bez overenia konkrétnej expozičnej hypotézy.

Diferenciálna diagnostika

Diabetes, hypertenzia, monoklonálna gamapatia, liekové tubulopatie, Sjögrenov syndróm, tenofovir, ifosfamid, aminoglykozidy, obštrukcia, sepsa, rhabdomyolýza a ďalšie kovy môžu vytvárať podobný obraz. Kauzálny záver si preto vyžaduje časovú väzbu, dôkaz expozície, biologickú vierohodnosť a vylúčenie pravdepodobnejších príčin.

Liečba a prevencia

Najdôležitejším opatrením je okamžité prerušenie expozície a dekontaminácia. Pri akútnej významnej udalosti treba kontaktovať klinického toxikológa a pracovisko radiačnej ochrany. Kontaminovaná koža sa šetrne umyje, rana sa odborne vyčistí a zadržané fragmenty sa posudzujú individuálne podľa anatomického rizika ich odstránenia.

Liečba AKI je podporná: optimalizácia cirkulujúceho objemu bez preťaženia tekutinami, korekcia elektrolytov a acidobázickej poruchy, vysadenie ďalších nefrotoxínov a náhrada funkcie obličiek pri štandardných indikáciách. Dialýza rieši urémiu, hyperkaliémiu, acidózu alebo preťaženie, nie je však spoľahlivou metódou odstránenia uránu uloženého v tkanivách.

Staršie odporúčania a materiály pre radiačné nehody uvádzajú skorú hydratáciu a alkalizáciu moču hydrogénuhličitanom sodným, ktorá má stabilizovať uranylovo-karbonátové komplexy. Klinický dôkaz je prevažne historický a experimentálny; takýto postup patrí do rúk toxikológa, pretože neprimerané podávanie tekutín alebo bikarbonátu môže spôsobiť objemové preťaženie, alkalózu, hypernatriémiu či hypokaliémiu. Rutinná „nútená diuréza“ nie je bezpečná univerzálna rada.

Pre urán neexistuje všeobecne schválené a klinicky overené chelatačné antidotum. Viaceré chelátory znižovali tkanivovú nálož v experimentoch, no Ca-DTPA, EDTA ani iné prípravky sa nemajú empiricky podávať mimo špecializovaného rozhodnutia; niektoré komplexy môžu zhoršiť renálnu alebo kostnú distribúciu kovu.

Záver

Urán môže poškodiť obličky, ale mechanizmus a pravdepodobnosť závisia od chemickej formy, rozpustnosti, dávky, cesty vstupu a trvania expozície. Pri prírodnom a ochudobnenom uráne je pri väčšine environmentálnych scenárov rozhodujúca chemická toxicita pre proximálny tubulus. Akútna vysoká dávka môže vyvolať AKI až zlyhanie obličiek. Pri dlhodobej nízkej expozícii sú biologicky vierohodné a v niektorých štúdiách doložené skoré tubulárne zmeny; rozsah, v akom vedú ku klinicky významnej CKD v bežnej populácii, sa ešte len spresňuje.

Rádioaktivita uránu nesmie byť ignorovaná, no klasická radiačná nefropatia vyžaduje podstatne vyššiu dávku do obličiek, než akú prináša bežná kontaminácia vody prírodným uránom. Rádium je primárne kostný rádionuklid a radón predovšetkým pľúcny karcinogén; ani jeden sa dnes nepovažuje za dobre doloženú bežnú príčinu CKD. Pri environmentálnom vyšetrowaní treba myslieť na zmesi kontaminantov a najmä na kadmium, olovo, anorganickú ortuť, arzén a chróm VI.

Praktický postup má stáť na troch pilieroch: potvrdiť a odstrániť zdroj, objektivizovať expozíciu validovanou analýzou a cielene vyšetriť glomerulovú aj proximálnu tubulárnu funkciu. Ani samotný nález uránu v moči, ani

izolovaný nešpecifický biomarker nestačí na kauzálnu diagnózu.

Relevantné zdroje

1. World Health Organization. *Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first, second and third addenda. Chemical fact sheets: Uranium*. 2026. cdn.who.int
2. World Health Organization. *Uranium in Drinking-water: Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality*. 2012. cdn.who.int
3. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. *Toxicological Profile for Uranium*. 2013. atsdr.cdc.gov
4. Guéguen Y, Frerejacques M. Review of Knowledge of Uranium-Induced Kidney Toxicity for the Development of an Adverse Outcome Pathway to Renal Impairment. *Int J Mol Sci*. 2022;23(8):4397. DOI: [10.3390/ijms23084397](https://doi.org/10.3390/ijms23084397)
5. Horvit AM, Molony DA. A systematic review and meta-analysis of mortality and kidney function in uranium-exposed individuals. *Environmental Research*. 2024;248:118224. DOI: [10.1016/j.envres.2024.118224](https://doi.org/10.1016/j.envres.2024.118224)
6. Anderson WA, et al. Uranium exposure and kidney tubule biomarkers in the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). *Environmental Research*. 2025. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
7. Medgyesi DN, et al. Long-Term Exposure to Uranium and Arsenic in Community Drinking Water and CKD Risk Among California Women. *American Journal of Kidney Diseases*. 2025. DOI: [10.1053/j.ajkd.2025.04.008](https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2025.04.008)
8. Kurttio P, et al. Renal effects of uranium in drinking water. *Environmental Health Perspectives*. 2002;110(4):337-342. pmc.ncbi.nlm.nih.gov
9. Kurttio P, et al. Kidney toxicity of ingested uranium from drinking water. *American Journal of Kidney Diseases*. 2006;47(6):972-982. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
10. Vicente-Vicente L, Quiros Y, Pérez-Barriocanal F, López-Novoa JM, López-Hernández FJ, Morales AI. Nephrotoxicity of Uranium: Pathophysiological, Diagnostic and Therapeutic Perspectives. *Toxicological Sciences*. 2010;118(2):324-347. DOI: [10.1093/toxsci/kfq178](https://doi.org/10.1093/toxsci/kfq178)
11. McDiarmid MA, et al. Thirty years of surveillance of depleted uranium-exposed Gulf War veterans demonstrate continued effects to bone health. *J Toxicol Environ Health A*. 2025;88(5):209-225. DOI: [10.1080/15287394.2024.2432021](https://doi.org/10.1080/15287394.2024.2432021)
12. World Health Organization. *Depleted uranium: sources, exposure and health effects*. 2001. who.int
13. International Commission on Radiological Protection. *ICRP Publication 118: ICRP Statement on Tissue Reactions and Early and Late Effects of Radiation in Normal Tissues and Organs*. 2012. icrp.org
14. Klaus R, Niyazi M, Lange-Sperandio B. Radiation-induced kidney toxicity: molecular and cellular pathogenesis. *Radiation Oncology*. 2021;16:43. pmc.ncbi.nlm.nih.gov
15. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. *Toxicological Profile for Radium*. ncbi.nlm.nih.gov
16. Chen B, et al. Exposure to Radon and Kidney Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis of Observational Epidemiological Studies. *Biomedical and Environmental Sciences*. 2018;31(11):805-815. DOI: [10.3967/bes2018.108](https://doi.org/10.3967/bes2018.108)
17. Reddy A, et al. Residential radon exposure and cancer. *Oncology Reviews*. 2022. pmc.ncbi.nlm.nih.gov
18. Balali-Mood M, Naseri K, Tahergorabi Z, Khazdair MR, Sadeghi M. Toxic Mechanisms of Five Heavy Metals: Mercury, Lead, Chromium, Cadmium, and Arsenic. *Front Pharmacol*. 2021;12:643972. DOI: [10.3389/fphar.2021.643972](https://doi.org/10.3389/fphar.2021.643972)
19. Moody EC, Coca SG, Sanders AP. Toxic Metals and Chronic Kidney Disease: a Systematic Review of Recent Literature. *Curr Environ Health Rep*. 2018;5:453-463. DOI: [10.1007/s40572-018-0212-1](https://doi.org/10.1007/s40572-018-0212-1)
20. Kidney Disease: Improving Global Outcomes. Preventing chronic kidney disease and maintaining kidney health: conclusions from a KDIGO Controversies Conference. *Kidney International*. 2025;108:555-571. kdigo.org
21. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Vyhláška č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody. slov-lex.sk

22. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. *Uranium Toxicity: Clinical Assessment and Treatment*. archive.cdc.gov a archive.cdc.gov
23. Dahlkamp FJ. Slovak Republic. In: *Uranium Deposits of the World: Europe*. Springer; 2016:551-567. link.springer.com
24. Kohút M, Trubač J, Novotný L, et al. Geology and Re-Os molybdenite geochronology of the Kurišková U-Mo deposit (Western Carpathians, Slovakia). *Journal of Geosciences*. 2013;58:271-282. DOI: [10.3190/jgeosci.150](https://doi.org/10.3190/jgeosci.150)
25. Michaeli E, Solár V, Ivanová M, Fazekašová D. Current status the bearings of uranium ores in the Slovak Republic. *Journal of International Scientific Publications: Ecology and Safety*. 2014;8:304-310. scientific-publications.net
26. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. *Prírodná rádioaktivita: radónové riziko a rádiometria Slovenskej republiky*. apl.geology.sk a apl.geology.sk
27. DIAMO, státní podnik. *Těžba uranu a Spravované lokality*. diamo.cz a diamo.cz
28. Státní ústav radiační ochrany. *Radioactivity in water and possible remedial measures*. suro.cz
29. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb. v účinném znění, příloha č. 1, ukazatel uran 15 µg/l. zakonyprolidi.cz
30. Radonový program České republiky. *Radon v ČR* a interaktivní mapa radónového indexu České geologické služby. radonovyprogram.cz a mapy.geology.cz
31. Matolín M. Verification of the radiometric map of the Czech Republic. *Journal of Environmental Radioactivity*. 2017;166:289-295. DOI: [10.1016/j.jenvrad.2016.04.013](https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2016.04.013)
32. European Commission, Joint Research Centre. *European Atlas of Natural Radiation: Terrestrial gamma dose rate*. data.jrc.ec.europa.eu
33. Medirex, a. s. *Cenník laboratórnych vyšetrení*, verejný katalóg klinickej biochémie: cystatín C, sérové a močové elektrolyty, frakčné exkrécie, ACR a α1-mikroglobulín v moči. static.medirex.sk
34. Unilabs Slovensko. *Výsledky do 24 hodín* a verejný katalóg vyšetrení: základný močový profil, ACR, sérové a močové elektrolyty, frakčné exkrécie, cystatín C a β2-mikroglobulín. unilabs.sk a unilabs.sk
35. SYNLAB Slovakia. *Cenník laboratórnych vyšetrení, biochémia*, platný od 1. januára 2026. synlab.sk
36. Univerzitná nemocnica Martin. *Ústav klinickej biochémie: diagnostika*. unm.sk
37. Matarneh AS, Matarneh B, Rout P, et al. Fanconi Syndrome. *StatPearls*. Aktualizované 2025. ncbi.nlm.nih.gov
38. Merck Manual Professional Edition. *Fanconi Syndrome*. Revidované 2024. merckmanuals.com
39. European Commission, Joint Research Centre. *Digital Atlas of Natural Radiation: indoor radon, uranium, thorium and potassium in soil and bedrock, terrestrial gamma dose and geogenic radon*. remon.jrc.ec.europa.eu
40. International Atomic Energy Agency. *World Distribution of Uranium Deposits (UDEPO) with Uranium Deposit Classification*. IAEA-TECDOC-1629. www-pub.iaea.org
41. Rada Európskej únie. Smernica Rady 2013/59/Euratom, základné bezpečnostné normy ochrany pred ionizujúcim žiarením, najmä články 54, 74 a 103. eur-lex.europa.eu
42. Rada Európskej únie. Smernica Rady 2013/51/Euratom o ochrane zdravia obyvateľstva pred rádioaktívnymi látkami vo vode určenej na ľudskú spotrebu. eur-lex.europa.eu
43. Wismut GmbH. *Mining remediation: taking responsibility, shaping the future*. 2023. wismut.de
44. Orano Mining. *Annual Activity Report 2024* a informácie o sanácii a monitorovaní bývalých uránových lokalít vo Francúzsku. orano.group
45. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. *Toxicological Profile for Lead*. atsdr.cdc.gov
46. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. *Toxicological Profile for Cadmium*. atsdr.cdc.gov
47. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. *Toxicological Profile for Mercury*. atsdr.cdc.gov
48. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. *Toxicological Profile for Arsenic*. atsdr.cdc.gov
49. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. *Toxicological Profile for Chromium*. atsdr.cdc.gov

Odborná poznámka: Text je syntézou toxikologických, epidemiologických a nefrologických údajov dostupných k 11. júlu 2026. Nie je náhradou individuálneho toxikologického, nefrologického ani radiačno-hygienického posúdenia konkrétnej expozície.

Zdroj: <https://nefro.polasci.net/article.php?slug=uran-a-oblicky-nefrotoxicita-radiacne-poskodenie-kovy> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.